

中国古籍整理丛书

方书 32

国家中医药管理局

中医药古籍保护与利用能力建设项目

辨症良方

清·蒋杏桥 辑
米 鹏 刘巨海 校注



中国古籍整理丛书

辨症良方

清·蒋杏桥 辑

米 鹂 刘巨海 校注

中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

辨症良方/(清)蒋杏桥辑;米鹏,刘巨海校注. —北京:中国中医药出版社,2017.4

(中国古医籍整理丛书)

ISBN 978-7-5132-3481-8

I. ①辨… II. ①蒋… ②米… ③刘… III. ①方书-中国-清代 IV. ①R289.349

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 139192 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

保定市中画美凯印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

*

开本 710×1000 1/16 印张 24 字数 182 千字

2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5132-3481-8

*

定价 96.00 元

网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

微信服务号 zgzyycbs

书店网址 csln.net/qksd/

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

淘宝天猫网址 <http://zgzyycbs.tmall.com>

国家中医药管理局
中医药古籍保护与利用能力建设项目
组织工作委员会

主任委员 王国强

副主任委员 王志勇 李大宁

执行主任委员 曹洪欣 苏钢强 王国辰 欧阳兵

执行副主任委员 李 昱 武 东 李秀明 张成博

委 员

各省市项目组分管领导和主要专家

(山东省) 武继彪 欧阳兵 张成博 贾青顺

(江苏省) 吴勉华 周仲瑛 段金廛 胡 烈

(上海市) 张怀琼 季 光 严世芸 段逸山

(福建省) 阮诗玮 陈立典 李灿东 纪立金

(浙江省) 徐伟伟 范永升 柴可群 盛增秀

(陕西省) 黄立勋 呼 燕 魏少阳 苏荣彪

(河南省) 夏祖昌 刘文第 韩新峰 许敬生

(辽宁省) 杨关林 康廷国 石 岩 李德新

(四川省) 杨殿兴 梁繁荣 余曙光 张 毅

各项目组负责人

王振国 (山东省) 王旭东 (江苏省) 张如青 (上海市)

李灿东 (福建省) 陈勇毅 (浙江省) 焦振廉 (陕西省)

蔡永敏 (河南省) 鞠宝兆 (辽宁省) 和中浚 (四川省)

项目专家组

顾问	马继兴	张灿珥	李经纬		
组长	余瀛鳌				
成员	李致忠	钱超尘	段逸山	严世芸	鲁兆麟
	郑金生	林端宜	欧阳兵	高文柱	柳长华
	王振国	王旭东	崔 蒙	严季澜	黄龙祥
	陈勇毅	张志清			

项目办公室（组织工作委员会办公室）

主任	王振国	王思成			
副主任	王振宇	刘群峰	陈榕虎	杨振宁	朱毓梅
	刘更生	华中健			
成员	陈丽娜	邱 岳	王 庆	王 鹏	王春燕
	郭瑞华	宋咏梅	周 扬	范 磊	张永泰
	罗海鹰	王 爽	王 捷	贺晓路	熊智波
秘书	张丰聪				

前言

中医药古籍是传承中华优秀传统文化的重要载体，也是中医学传承数千年的知识宝库，凝聚着中华民族特有的精神价值、思维方法、生命理论和医疗经验，不仅对于传承中医学术具有重要的历史价值，更是现代中医药科技创新和学术进步的源头和根基。保护和利用好中医药古籍，是弘扬中国传统文化、传承中医学术的必由之路，事关中医药事业发展全局。

1949年以来，在政府的大力支持和推动下，开展了系统的中医药古籍整理研究。1958年，国务院科学规划委员会古籍整理出版规划小组在北京成立，负责指导全国的古籍整理出版工作。1982年，国务院古籍整理出版规划小组召开全国古籍整理出版规划会议，制定了《古籍整理出版规划（1982—1990）》，卫生部先后下达了两批200余种中医古籍整理任务，掀起了中医古籍整理研究的新高潮，对中医文化与学术的弘扬、传承和发展，发挥了极其重要的作用，产生了不可估量的深远影响。

2007年《国务院办公厅关于进一步加强古籍保护工作的意见》明确提出进一步加强古籍整理、出版和研究利用，以及

“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针。2009年《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》指出，要“开展中医药古籍普查登记，建立综合信息数据库和珍贵古籍名录，加强整理、出版、研究和利用”。《中医药创新发展规划纲要（2006—2020）》强调继承与创新并重，推动中医药传承与创新发展。

2003~2010年，国家财政多次立项支持中国中医科学院开展针对性中医药古籍抢救保护工作，在中国中医科学院图书馆设立全国唯一的行业古籍保护中心，影印抢救濒危珍本、孤本中医古籍1640余种；整理发布《中国中医古籍总目》；遴选351种孤本收入《中医古籍孤本大全》影印出版；开展了海外中医古籍目录调研和孤本回归工作，收集了11个国家和2个地区137个图书馆的240余种书目，基本摸清流失海外的中医古籍现状，确定国内失传的中医药古籍共有220种，复制出版海外所藏中医药古籍133种。2010年，国家财政部、国家中医药管理局设立“中医药古籍保护与利用能力建设项目”，资助整理400余种中医药古籍，并着眼于加强中医药古籍保护和研究机构建设，培养中医古籍整理研究的后备人才，全面提高中医药古籍保护与利用能力。

在此，国家中医药管理局成立了中医药古籍保护和利用专家组和项目办公室，专家组负责项目指导、咨询、质量把关，项目办公室负责实施过程的统筹协调。专家组成员对古籍整理研究具有丰富的经验，有的专家从事古籍整理研究长达70余年，深知中医药古籍整理研究的重要性、艰巨性与复杂性，履行职责认真务实。专家组从书目确定、版本选择、点校、注释等各方面，为项目实施提供了强有力的专业指导。老一辈专家

的学术水平和智慧，是项目成功的重要保证。项目承担单位山东中医药大学、南京中医药大学、上海中医药大学、福建中医药大学、浙江省中医药研究院、陕西省中医药研究院、河南省中医药研究院、辽宁中医药大学、成都中医药大学及所在省市中医药管理部门精心组织，充分发挥区域间互补协作的优势，并得到承担项目出版工作的中国中医药出版社大力配合，全面推进中医药古籍保护与利用网络体系的构建和人才队伍建设，使一批有志于中医学术传承与古籍整理工作的人才凝聚在一起，研究队伍日益壮大，研究水平不断提高。

本着“抢救、保护、发掘、利用”的理念，该项目重点选择近60年未曾出版的重要古医籍，综合考虑所选古籍的保护价值、学术价值和实用价值。400余种中医药古籍涵盖了医经、基础理论、诊法、伤寒金匱、温病、本草、方书、内科、外科、女科、儿科、伤科、眼科、咽喉口齿、针灸推拿、养生、医案医话医论、医史、临证综合等门类，跨越唐、宋、金元、明以迄清末。全部古籍均按照项目办公室组织完成的行业标准《中医古籍整理规范》及《中医药古籍整理细则》进行整理校注，绝大多数中医药古籍是第一次校注出版，一批孤本、稿本、抄本更是首次整理面世。对一些重要学术问题的研究成果，则集中收录于各书的“校注说明”或“校注后记”中。

“既出书又出人”是本项目追求的目标。近年来，中医药古籍整理工作形势严峻，老一辈逐渐退出，新一代普遍存在整理研究古籍的经验不足、专业思想不坚定等问题，使中医古籍整理面临人才流失严重、青黄不接的局面。通过本项目实施，搭建平台，完善机制，培养队伍，提升能力，经过近5年的建设，锻炼了一批优秀人才，老中青三代齐聚一堂，有效地稳定

了研究队伍，为中医药古籍整理工作的开展和中医文化与学术的传承提供必备的知识和人才储备。

本项目的实施与《中国古医籍整理丛书》的出版，对于加强中医药古籍文献研究队伍建设、建立古籍研究平台，提高古籍整理水平均具有积极的推动作用，对弘扬我国优秀传统文化，推进中医药继承创新，进一步发挥中医药服务民众的养生保健与防病治病作用将产生深远影响。

第九届、第十届全国人大常委会副委员长许嘉璐先生，国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长、中华中医药学会会长王国强先生，我国著名医史文献专家、中国中医科学院马继兴先生在百忙之中为丛书作序，我们深表敬意和感谢。

由于参与校注整理工作的人员较多，水平不一，诸多方面尚未臻完善，希望专家、读者不吝赐教。

国家中医药管理局中医药古籍保护与利用能力建设项目办公室

二〇一四年十二月

许序

“中医”之名立，迄今不逾百年，所以冠以“中”字者，以别于“洋”与“西”也。慎思之，明辨之，斯名之出，无奈耳，或亦时人不甘泯没而特标其犹在之举也。

前此，祖传医术（今世方称为“学”）绵延数千载，救民无数；华夏屡遭时疫，皆仰之以度困厄。中华民族之未如印第安遭染殖民者所携疾病而族灭者，中医之功也。

医兴则国兴，国强则医强。百年运衰，岂但国土肢解，五千年文明亦不得全，非遭泯灭，即蒙冤扭曲。西方医学以其捷便速效，始则为传教之利器，继则以“科学”之冕畅行于中华。中医虽为内外所夹击，斥之为蒙昧，为伪医，然四亿同胞衣食不保，得获西医之益者甚寡，中医犹为人民之所赖。虽然，中国医学日益陵替，乃不可免，势使之然也。呜呼！覆巢之下安有完卵？

嗣后，国家新生，中医旋即得以重振，与西医并举，探寻结合之路。今也，中华诸多文化，自民俗、礼仪、工艺、戏曲、历史、文学，以至伦理、信仰，皆渐复起，中国医学之兴乃属必然。

迄今中医犹为国家医疗系统之辅，城市尤甚。何哉？盖一
则西医赖声、光、电技术而于20世纪发展较速，中医则难见其
进。二则国人惊羡西医之“立竿见影”，遂以为其事非并于中
医。然西医已自觉将入绝境：其若士医法正负效应相若，甚或
负远逾于正；研究医理者，渐知人乃一整体，心、身非如中世
纪所认定为二对立物，且人体亦非宇宙之中心，仅为其一小单
位，与宇宙万象万物息息相关。认识至此，其已向中国医学之
理念“靠拢”矣，虽彼未必知中国医学何如也。唯其不知中国
医理何如，纯由其实践而有所悟，益以证中国之认识人体不为
伪，亦不为玄虚。然国人知此趋向者，几人？

国医欲再现宋明清高峰，成国中主流医学，则一须继承、
一须创新。继承则必深研原典，徵清法源，复吸纳西医及我藏、
蒙、维、回、苗、彝诸民族医术之精华；创新之道，在于今之
科技，既用其器，亦参照其道，反思己之医理，申西之，笃行
之，深化之，普及之，于普及中认知人体及环境古今之异，以
建成当代国医理论。欲达于新境，或需百年欤？予恐西医既已
醒悟，若加力吸收中医精粹，促中医西医深度结合，形成21世
纪之新医学，届时“制高点”将在何方？国人士此转折之机，
能不忧虑而奋力乎？

予所谓深研之原典，一指一二习见之书、千古权威之作；
就医界整体言之，所传所承者应为医籍之全部。盖后世名医所
著，乃其秉诸前人所述，总结终生行医用药经验所得，自当已
成今世、后世之要籍。

盛世修典，信然。盖典籍得修，方可言传言承。虽前此50
余载已启医籍整理、出版之役，惜旋即中辍。迨20载再兴整
理、出版之潮，世所罕见之要籍千余部陆续问世，洋洋大观

今复有“中医药古籍保护与利用能力建设”之工程，集九省市专家，历经五载，董理出版自唐迄清医籍，都 400 余种，凡中医之其理医理、伤寒、温病及各种诊治、医案医话、推拿本草，俱涵盖之。

噫！璐既知此，能不胜其悦乎！汇集刻印医籍，自古有之，然孰与今世之盛且精也！自今而言，中国医家及患者，得览斯典，当于前人益敬而畏之矣！中华民族之屡经灾难而益蕃，乃今未来之永续，端赖之也，自今以往岂可不后出转精乎！典籍既蜂出矣，余则有望于来者。

谨序。

第九届、十届全国人大常委会副委员长

许嘉璐

二〇一四年冬

王序

中医学是中华民族在长期生产生活中实践中，在与疾病作斗争中逐步形成并不断丰富发展的医学科学，是中国古代科学的瑰宝，为中华民族的繁衍昌盛作出了巨大贡献，对世界文明进步产生了积极影响。时至今日，中医学作为我国医学的特色和重要医药卫生资源，与西医学相互补充、相互促进、协调发展，共同担负着维护和促进人民健康的任务，已成为我国医药卫生事业的重要特征和显著优势。

中医药古籍在存世的中华古籍中占有相当重要的比重，不仅是中医学术传承数千年最为重要的知识载体，也是中华为中华民族繁衍昌盛发挥重要作用的历史见证。中医药典籍不仅承载着中医药学术精华，而且蕴含着中华民族优秀的思想文化，凝聚着中华民族的聪明智慧，是祖先留给我们的宝贵物质财富和精神财富。加强对中医药古籍的保护与利用，既是中医学发展的需要，也是传承中华文化的迫切要求，更是历史赋予我们的责任。

2010年，国家中医药管理局启动了中医药古籍保护与利用

能力建设项目。这既是传承中医药的重要工程，也是弘扬优秀传统文化的重要举措，不仅能够全面推进中医药的有效传承和创新发展，为维护人民健康做出贡献，也能够彰显中华民族的璀璨文化，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出贡献。

相信这项工作一定能造福当今、嘉惠后世、福泽绵长。

国家卫生和计划生育委员会副主任

国家中医药管理局局长

中华中医药学会会长

王陇德

二〇一四年十二月

马序

新中国成立以来，党和国家高度重视中医药事业发展，重视古籍的保护、整理和研究工作。自1958年始，国务院先后成立了一届古籍整理出版规划小组，分别由齐燕铭、李一氓、田汉明担任组长，主持制订了《整理和出版古籍十年规划（1962—1972）》《古籍整理出版规划（1982—1990）》《中国古籍整理出版十年规划和“八五”计划（1991—2000）》等，而第一次规划中医药古籍整理即纳入其中。1982年9月，卫生部下发《1982—1990年中医古籍整理出版规划》，1983年1月，中医古籍整理出版办公室正式成立，保证了中医古籍整理出版规划的实施。2002年2月，《国家古籍整理出版“十五”（2001—2005）重点规划》经新闻出版署和全国古籍整理出版规划领导小组批准，颁布实施。其后，又陆续制定了国家古籍整理出版“十五”和“十一五”重点规划。国家财政多次立项支持中国中医科学院开展针对性中医药古籍抢救保护工作，文化部在中国中医科学院图书馆专门设立全国唯一的行业古籍保护中心，国家先后投入中医药古籍保护专项经费超过3000万

元，影印抢救濒危珍、善、孤本中医古籍 1640 余种，开展了海外中医古籍目录调研和孤本回归工作。2010 年，国家财政部、国家中医药管理局安排国家公共卫生专项资金，设立了“中医古籍保护与利用能力建设项目”，这是继 1982~1986 年第一批、第二批重要中医古籍整理之后的又一次大规模古籍整理工程，重点整理新中国成立后未曾出版的重要古籍，目标是形成并普及规范的通行本、传世本。

为保证项目的顺利实施，项目组特别成立了专家组，承担咨询和技术指导，以及古籍出版之前的审定工作。专家组中的许多成员虽命古稀之年，但老当益壮，孜孜不倦，不仅对项目进行宏观指导和质量把关，更重要的是通过古籍整理，以老带新，言传身教，培养一批中医古籍整理研究的后备人才，促进了中医古籍保护和研究机构建设，全面提升了我国中医古籍保护与利用能力。

作为项目组顾问之一，我深感中医古籍保护、抢救与整理工作的重要性和紧迫性，也深知传承中医古籍整理经责任重而道远。令人欣慰的是，在项目实施过程中，我看到了老中青一代的紧密衔接，看到了大家的坚持和努力，看到了年轻一代的成长。相信中医古籍整理工作的未来会越来越好，中医药学的发展会越来越好。

欣喜之余，以是为序。

中国中医科学院研究员

马继兴

二〇一四年十二月

校注说明

《解毒良方》，清代蒋杏桥辑，成书于清咸丰八年（1858），刊行于咸丰十年（1860）。

蒋杏桥，字锡荣，江苏常州人，生卒年月不详。初习举业，旁涉医书。他认为“方不贵于繁多，病必先于辨证。治失其指，则千方不效；言得其旨，则一药有余”，自《证治准绳》诸书，卷帙浩繁，不便查阅，因取古方简要者抄录之，编成《解毒良方》四卷。王如王景澄序中称言：“以名世行学，享誉艺林。丁酉科试举于乡，文章经术，推重一时，生平尤以济人利物为务，惜名场稍滞，未得尽展其用。”

本书在《列便易方》、《急救方》、《列诸病方》、《外科方》、《诸色方》；卷一《列血证》、《杂饮》、《咳嗽》、《吐急》及妇人、小儿等方；卷四《列疔毒》、《麻疹》、《水痘》、《痘后诸方》及《良方》。主要一书所载大多为《列便易方》，少数为《急救方》，内容简要，切合临床实用。

本次整理以清咸丰十年（1860）刻本为底本，以光绪辛卯年（1891）北京杨和甫刻本（简称“光绪本”）、清咸丰八年戊午（1858）合清刻本（名曰《我本医书五种》，简称“稿本”）为对校本。由于书中引用文献较多，大多出于《幼幼新书》、《证治准绳》、《串雅》、《医学入门》、《医宗必读》、《石室秘录》、《医学心悟》、《世医得效方》、《证类本草》、《本草纲目》等，故整理中选用上述文献中相关内容进行他校。他校诸书均采用通行本。

具体校注方法如下：

1. 采用简体横排形式，对原文加新式标点。底本中的方位词“左”“右”统一改为“下”“上”，不出校记。

2. 凡底本中的繁体字、俗字、异体字、日本版本中的当用汉字、手写体，予以径改，不出注；繁体字若涉及词语，则保留。底本中的通假字，于首见处出注说明；古今字以今字律齐，不出注。底本中的避讳字，不影响文义者不改，影响文义者改为原字，并出校说明。疑难字同、生僻字同加以注释。

3. 凡底本中文字属一般笔画之误，如属巳己、己巳、裏裏、煨煨、炙炙、杉笔混淆不分者，予以径改，不出校。

4. 凡底本中有误脱颠倒之处，信而有征者，予以改正，并出校说明；无确切证据者，出校存疑。

5. 凡底本与校本文字有异，又皆可读者，原文不改，出校说明；而校本明显有误者，不再说明。

6. 凡底本遇有回鹘符“□”，一般回行另起，不出校。底本中模糊不清、难以辨认的文字，以虚圆号“○”按所脱字数补入。

7. 药名不规范者，一律径改为规范名，如寸香—檀香，白芨—白及，蚰退—蝉蜕；异名则保留不改，如瓜蒌、勾果。药物异名非常生僻，需出注者，只注明正名，不作词述。处方中的药物剂量及炮制方法一律改用小字，不出注。

8. 底本每卷题下原有“常州将杏桥锡荣集”七署，今一并删去，不出注。

9. 底本目录与正文不符，且编排凌乱，今据校定后的正文重新编排目录。底本标题原注另体小字，不上目录。

10. 底本正文因版面或补刻等因素而作小字刻校者，今据文义回改正文字体，不出校。

11. 原文中的典故，出注说明其出处，较为生疏者简注其义

12. 底本中凡顶格的语句，其义同标题则按标题加粗处理，不出注。

序^①

余曩^②习举业，暇时旁览医书，见人^③灵枢、素问，奥博难稽已^④。此外名医代出，如仲景、河间之类，皆有成书流传当世。然卷帙浩繁，乡村僻壤，未易购觅，求其简便易行，适于时用者，殆不多得。

蒋杏桥先生以名儒宿学，望著艺林。丁酉科副举于乡，文章经术^⑤兼重。一时，生平尤以济人利物为务，偶名场稍滞，未得尽展其用。

先生素多材^⑥艺，博览群籍，旁及岐黄，曾有一^⑦神效良方。书^⑧今存，昔^⑨鹿邑县参军出以见示。余观其书，割举百张，条分缕晰，荟萃古人之精义，而又审于考校，使阅者一望了然，如车之指南，不迷方向；如衡之称物，不^⑩累系。间出己意，别具新裁，皆本前人之准绳，神明而变通之。

先生本不以医名，而于医道又无不精。其材艺之博，于此可见一斑，余尤嘉^⑪。

先生济世之心，功德更居无量，使^⑫乡^⑬天札^⑭，悉化祥和。

1. 序：原无，为与后面的“叙”与“小叙”相区分而加。

2. 曩（náng 攘）：以往，从前，过去的。《说文·日部》：“曩，向也。从日，襄声。”《尔雅·释诂下》：“曩，久也。”

3. 已：语气词，用于句尾，表示肯定语气。如《尚书·洛诰》：“公定，予任。”《史记·太史公序》：“皆失其本已。”

4. 材：才能，才艺。《尚书·咸有一德》：“任官惟贤才，左右惟其人。”

5. 兼（jiān 殄）：兼气，灾祸。《广韵·霰韵》：“殄，妖气。”

6. 天札：遭疫辄而早死。夭：短命，早死。未成年而死，札：疫病，也指遭瘟疫死亡。

同善之怀，其有裨于封用，岂浅鲜哉！指麾湘帆参军，官丁旆，有贤声，行见循良，报最有日矣于乎。

先生令绪益光而大之，垂裕无穷，更是为先生人也，爰归其书而并志其缘起如此。

咸丰十年暮春^②之初萍川王景澄撰并书

① 于：语气词，相当于“乎”。清·朱骏声《说文通训定声·豫部》：“于，假借为乎。”

② 暮春：即四月。

岁戊午春夏间，余督军括州，永嘉绅士孟璜从余襄防军事，时外卒兵丁多不习水土，动辄遽病伤亡，相继求治无从。璜甚悯之，屡告余曰：闻向军门出师，每选良医随行，立方施治，全活甚多。今仓猝无济人术，深悔岐黄之未习也。凯旋后数月，适署参军翁仙帆出其尊人杏桥字博所辑《瘡症良方》见贻，展阅之下，见简而赅，精而当，无方不备，无症不详。症以辨而甚明，即方以良而受益。诚方世之全月，回生之要本已。此书一出，非第从军者疾痛有拯，即穷乡僻壤，苦无医药之处，皆得按患投剂，起朽振枯，使随疾悉余，再生有从。愚当日同师军中，未必克有如是书之广收者。因忆往事，以示孟君。君虑其书之不能遍及也，即慷慨解囊，捐貲重刻于东瓯，请叙于余。余嘉其意富好生，本是意以充之，岂使人下后世永无夭札之患；既不负翁君作书之苦心，而孟君乐善无已之隐愿，不亦从可验哉！为书数语于卷首。

赐进士出身

浙江嘉兴府嘉善县知县 兵部主事 金树文书于晚城，官今

- ① 仙帆：与前序中“湘帆”指同一人。疑为其字号。
- ② 症：原作“正”，据本书书名改。
- ③ 廨（bù 部）屋：草席盖顶之屋，泛指贫家幽暗简陋之屋。
- ④ 克：能，如克勤克俭。《诗经·大雅·荡》：“靡不有初，鲜克有

晚城：浙江省临海市别称

重刻《辨症良方》小叙

吾杏桥先生所辑《辨症良方》一书，其济世之功诚非浅鲜。予虑其湮没勿传，因命梓人以镌之，广为流传。庶几僻壤中，无处延医，获此书以考订之，不啻至津宝筏，即先生之苦心将与此书以垂诸不朽焉。

时咸丰庚申秋七月东嘉峰山孟璜

自叙

荣忆幼岁习举业暇，旁参天竺千奇^①，思之皆无益于人也。后得王宇泰^②先生，证治准绳^③，读之，退思在帙浩繁，惟世医能习之；名药昂贵，惟富家能得之。若夫荒村僻壤何处求医？夜半更深何方觅药？因取古方之简要者，手自抄之；更即良药之便用者，劝人种之。又思方不贵于繁多，苟必先于症，治失其指，则千方不效；治得其正，则一药有余。慨自单方杂出，习染者乱莫辨其所温犯宜各殊，凶暴者更不详其事实。妇人固不知药，爰孩又不能言，得一方而畏之，虽乖睽^④亦奉为至宝；求一药以疗之，辄殒命不啻重生。种种模糊，实堪怜悯。方方能对应，似乎治易为功。然或目之不以其道，服之不得其宜，药虽不善，气已无功；水冰停焉，冰难行矣。下焦则分为宜重，上焦则气味宜轻。饥服饱服，自有其时；酒炒盐炒，各分其用。此固人所易知，然亦医所当言。爰取昔年手录诸书，删成一帙，订必辨其疑似，庶不误用补而温凉；药必取其易求，更可使大贫穷困苦。方除愚烈，而虫亦自跂跂；医戈杀生，蚊蚁咸知指命。药能全焉，何必议参之补阳补阴；水非西神，不假门医之

① 千奇：“六壬”和“奇门”的并称。清·周亮工《朱静一诗序》：“上自流沙乾竺之学，中而吐纳黄白之术，下至壬奇医策之微，无不洞其源流。”

② 王宇泰：即王肯堂（1552—1638），字字泰，一字损仲，号损庵，自号念西居士，江苏金坛人。

③ 乖睽：背离，宋·王安石《即事》诗之一：“如何有乖睽，不得同苦辛！”清·薛福成《书汉阳叶相广州之变》：“上下乖睽，互相牵累，未有不复败者。”

是南是北 类分八种，方易便于人查；医贵十全，功不由于己出 编短不译其所自，方论尽出于内经 挖痒呵号，且备 时急用；康强逢吉^①，惟愿寿域同登。

时咸丰八年岁在戊午八月望日

常州蒋杏桥锡荣记于愿闻吾过之斋

^① 康强逢吉：康强，安乐强健；逢吉：犹言大吉利。语本《尚书·洪范》：“身其康强，子孙其逢，吉。”

目 录

卷 一

便易方	· · · · ·	·
治病八要	· · · · ·	·
制药法	· · · · ·	·
煎药法	· · · · ·	·
服药法	· · · · ·	·
服药禁忌	· · · · ·	·
忌食药	· · · · ·	四
忌服药	· · · · ·	四
乡村简便方	· · · · ·	四
论挑惊挑黄之谬	· · · · ·	五
无病治法	· · · · ·	五
叩齿	· · · · ·	五
刷牙	· · · · ·	六
浴身	· · · · ·	六
鸣天鼓	· · · · ·	六
“运气”方	· · · · ·	六
左右开弓	· · · · ·	六
点眼	· · · · ·	六
防眼病	· · · · ·	六
牙疳	· · · · ·	六
时禁	· · · · ·	六

口不可补	· · · · ·	七
勿伤胃气	· · · · ·	七
食与治病	· · · · ·	七
吐衄	· · · · ·	七
伤风之证初起	· · · · ·	七
伤湿之证初起	· · · · ·	七
伤燥之证	· · · · ·	八
火证初起	· · · · ·	八
伤食之证	· · · · ·	八
伤暑之证	· · · · ·	八
葱盐运法	· · · · ·	八
跌打损伤	· · · · ·	八
倪岳川先生治痢方	· · · · ·	九
治痢初起方	· · · · ·	九
加味方	· · · · ·	九
补脾方	· · · · ·	九
治痢禁忌	· · · · ·	九
泻	· · · · ·	九
升阳除湿汤	· · · · ·	一〇
益元散	· · · · ·	一〇
白术芍药汤	· · · · ·	一〇
大藿香散	· · · · ·	一〇
止泻秘方	· · · · ·	一一

大小便不通	一一	痰病久不愈	一六
大便不通	一	痔虫	八
取仁丸	一	疳疔	八
芳麻粥	一	大顶出汗	八
小通气散	一	心惊	七
调经丸	一	心惊与不寐	七
小便不通	一	卧不安眠	七
止渴散	一	梦遗	七
气滞除痰汤	一	梦遗	七
口滑石散	一	脱精	七
葱白汤	一	祖父寒脱精	七
葱白法	一	欲通之药	七
独蒜除肝方	一	通之方	八
大泻	一	通之治	八
满泻	一	通之治	八
水泻	四	通之治	八
寒泻	四	通之方	八
火泻	四	通之	八
下血	四	通之	八
通	四	通之	八
疟疾变痢	一四	倪涵初先生治疟三方	
大吐	一五	第一方	一九
吐血鼻血	一五	第二方	九
反胃初起	一五	第三方	九
关脉	一五	心嘈	一〇
中风不语	一五	咽食	一〇

嗜睡	二
小便色	二
小便不利有	二
癰疽宜吐	二
阴阳製法	二
小便不禁能令人早死	三
赤白痢	三
尿如米泔色	二三
洩出白液小腹痛	二三
解諸積	三
冷瀉	三
暑痢	三
泄痢	四
寒瀉	四
濕熱	二四
濕瀉	四
泄痢多身重暑痢无身重	四
口乾	四
齒	五
舌	五
辟邪夢	五
渴	五
喉	五

小兒骨蒸潮熱食減瘦弱	九
風狂多是火病	二五
瘧後	二六
傷寒十功	二七
痰水	二〇
中風宜分虛實閉脫	三一
眼中翳肉	三二
鵝掌風癬	三二
眼內起星	三二
小腸疝氣	三
諸疝初起	三
淫瀉白痢	三
大腸大出	三四
大腹上麻痺不仁	三四
膈氣不通飲食开关秘方	三四
眼目赤腫	三四
无名脚毒	三
春溫瘟疫	三
一切奇方費效疾類	三
吐瀉散	二六
解脈	二六
脈部經	二六
下利輕重	二七

呼吸辨寒热脏腑之病	一七	灼药	四八
滑涩二脉	一七	霍乱后转筋	四八
虚实辨脉	一七	灸法	四八
胃气为本	一七	针法	四八
诊脉法	一七	灸法	四八
黄疽腹胀	一九	禁灸法	四八
相舌辨症法	二九	针灸各穴	四九
论气色	四	中恶谷中者	四九
劝仲祖说	四	鬼击鬼打鬼	五〇
疔瘰方	四一	还魂方	五〇
疔母瘰块	四一	鬼魔	五一
万道膏末药方	四一	起胃药	五一
童子惊神方	四一	卒死	五一
喉蛾方	四二	脱阳症	五一
牙痛灸法	四二	救冻死	五五
治九道出血方	四二	救饿死	五五
断乳奇法	四二	入井家卒死	五五
四物汤	四二	人咬伤	五五
用药须知所忌	四四	犬伤人	五五
伤寒辨	四五	狂犬伤出毒法	五六
类伤寒四症	四六	禁忌	五六
外感内伤辨	四六	马骡咬踢伤	五七
急救方	四七	牛伤	五七
干霍乱	四七	猫咬伤	五七
湿霍乱	四八	鼠咬伤	五七
		蛇咬伤	五七

蝎子咬	五七	救诸中毒方	六
蜈蚣咬	五八	解毒丸	六
蛭蛭伤	五八	砒霜毒	六
蚯蚓伤	五八	盐卤毒	六
蜘蛛咬	五八	水银毒	六
螳螂伤	五八	花椒毒	六
蜂叮人	五八	紫芦毒	六
蚕咬伤	五八	巴豆毒	六
蜗牛伤	五八	草乌附子毒	六
螻蛄伤	五九	金銀銅錫鉄毒	六
壁钱伤	五九	斑蝥元青毒	六
杂色虫	五九	硫黄毒	六
蛇鼠蜘蛛咬	五九	雄黄毒	六四
灸法	五九	水银毒	六四
毒蛇咬	五九	生艾毒	六四
凡蛇虫伤毒	五九	诸兽肉毒	六四
咒法	六	诸鱼毒	六四
蛇犬及狂狗咬	六	蟹毒	六四
毒蛇咬	六二	食艾中毒	六四
蛇入人窍中	六	食瓜毒或吃瓜果过多	
狗咬伤	六二	腹胀	六四
印毒	六一	蝎酒毒	六四
禁忌	六	轻粉毒	六四
菌毒	六一	附子毒	六四
河豚	六一	钩吻毒	六四
闭口川椒毒	六二	六四

木鬘子毒	六四
铅粉毒	六四
半夏毒	六四
烧酒醉死	六五
吞铁物	六五
小儿误吞针	六五
吞金器	六五

卷 二

诸痛方	六七
大痛	六七
偏大风	六八
雷大风	六八
大人毒	六八
眉棱骨痛	六八
大风骨	六八
头重	六九
大项强痛	六九
治八般头痛	六九
风热上攻去毒不可忍	六九
治偏正头痛	六九
治头痛不忍者	六九
头痛连睛痛	六九
目痛	七〇
治睛疼难忍者	七〇

与打花荣汤	七〇
决明丸	七〇
白眼丸	七〇
天行赤热者	七一
暴风客中症	七一
大脉大赤症	七一
羞明怕风症	七一
眦硬睛疼症	七一
痛如针刺症	七一
洗肝散	七一
桑白皮散	七一
朱砂散	七一
洗眼汤	七一
治睛痛难忍者	七一
治眼睛痛	七一
眼涩痛不能视物	七二
治眦硬睛疼去翳	七二
痛如针刺咽喉亦痛	七二
目痒极难忍	七二
飞砂入目	七二
尘物入目赤目	七四
砂芒眯目	七四
麦芒入目	七四
竹木入眼	七四
眯目生翳	七四
风热目睛涩痛	七四

眼目赤烂	七四	口舌生疮菌	八〇
拳毛倒睫	七四	舌忽肿大	八一
眼睛火出一二丁	七五	舌上生疮或白胎如雪	八一
赤眼冲睛	七五	舌胎所症	八一
赤翳攀睛	七五	口疮	八一
目为物所伤	七五	齿疳	八一
通治目疾驱风退翳明目 神方	七五	急咽喉	八一
咽喉闭	七五	锁喉风闭	八一
缠喉风症	七五	喉风	八一
蛾眼症	七五	预防喉患	八一
喉疳症	七五	皮法病不可以手按	八一
玉钩匙	七六	耳中卒痛	八一
玉屑无忧散	七六	耳内出水成疮	八一
碧玉散	七六	耳内外恶疮及头疮肥疮	八一
备急如圣散	七六	耳内出臭脓	八一
咽喉备急丹	七七	耳内脓汁	八四
治喉中悬痛垂长咽中 妨闷	七七	百虫入耳	八四
诸物梗喉	七九	蜈蚣入耳	八四
误吞	七九	蚁入耳	八四
口舌生疮	八〇	蛆入耳	八四
口疮烂	八〇	蝎蝎入耳	八四
口糜烂	八〇	水银入耳	八四
口舌生疮初起	八〇	水入耳中	八四
口舌疮连年不愈	八〇	耳中有物不出	八四

耳中有物	八五
头耳诸疮	八五
冻耳成疮	八五
耳足冻疮	八五
心胃挂分白	八五
治九种心痛	八六
心腹冷痛	八六
心腹并痛	八六
腹痛	八七
寒热内实	八七
诸有呕吐	八七
诸般腹痛 一服正上	八七
腰痛有上	八七
挂内腰痛	八七
痛风	八八
肩臂痛	八八
脚气	八八
脚气药	八九
小脚气	八九
狐疝劫药能劫如止痛	
	八九
狐疝痛不可忍者服之	
神效	八九
治诸疝及外肾肿胀痛一	
服立应	九〇
禁忌	九〇

阴内如菌突出	九〇
妇人儿门内诸暗疾	九一
产门内生虫	九一
产门外生疮久不效者	
	九
决	九
诸症通治	九
妇人产后诸症通治神方	
	九四
小兒胎毒成疾	九四
茎中痒痛	九四
茎中痛不可忍	九四
大	九四
常大便	九五
目赤	九六
喉痛及上	九六
心	九七
心	九七
心	九七
臂痛肩痛	九八
外科方	〇
决发顶疽之	
煎法	〇
煎法	〇
治法大略	〇
仙方活命饮	〇

飞龙夺命丹 梅花点

舌丹	一〇
替针丸	一〇三
涌泉膏	一〇三
排脓生肌法	一〇四
疮口深大方	一〇四
去恶肉方	一〇四
洗法	一〇四
解毒汤	一〇五
洗毒汤	一〇五
掺贴法	一〇五
贴膏药法	一〇五
鲫鱼膏	一〇六
乳香膏	一〇六
疔疮	一〇六
红丝疔	一〇七
金銀酒	一〇七
兜便人叶	一〇七
茨菇	一〇七
脂麻油	一〇七
甜瓜子	一〇八
蜀葵花	一〇八
六根叶	一〇八
醋	一〇八
赤小豆	一〇八
荆芥	一〇八

舌菌初起	一〇八
乳疔	一〇
疔疮	一〇
鱼脐疔	一一二
脱疽疔	一一二
瘰癧方	一一二
洗法治杨梅疮烂	一一三
瘰癧	一一四
结核在臂	一一四
痰核瘰气久不消	一一四
瘰癧	一一四
小儿癰头及身上诸疮	一一五
面上生疮	一一七
熏漏疮方	一二一
治下疳湿疮	一二二
下疳妬精疮诸方通治	一二四
下疳	一二四
瘰癧	一二四
蛇蝎毒	一二四
通治诸疮遍身出脓血	一二五
瘰癧方	一二五
杀虫方	一二五
生肌膏蜡膏	一二五
火丹巧珍	一二六

脚肿烂疮	一六
疥疮	一七
脉窠疮	一七
黄水疮	一七
背癰疽	一七
脚背头疮	一八
喉痹乳蛾	一八
唇口四围生疮	一八
口舌糜口	一八
舌	一八
乳内有块防成乳岩	一二九
乳痛乳岩	一二九
嵌甲疮五指俱烂	...	一三〇
阴囊湿痒妙方	一三〇
肛门痒痛	一三〇
足趾脱疽	一三〇
消毒神方	一三〇
悬痈	一三〇
又治悬痈流注	一三〇
天行斑疮	一三二
湿疮浸淫	一三二
担肩疽疔	一三二
拔疔秘方	一三二
痔漏疮痛	一三三
痔疮将成漏管	一三三

疥疮	一三三
坐板疮痒	一三三
肛门不可忍	一三四
痔瘡	一三四
痔肿痛	一三四
肠风脱肛红肿	一三四
先痔漏神效	一三四
黑地黄丸	一三五
仙治胸背头面手足一切诸症	一三五
外痔	一三六
打药方	一三六
醫脚氣風	一三七
脚气	一三七
湿气脚指烂	一三七
打泡神方	一三八
代针提毒丹	一三八
诸般疥癬	一三八
诸伤方	一三八
止血散口方	一三九
伤重欲死	一三九
刀枪伤腹裂肠出者	一三九
血瘀凝积欲死	一三九
跌仆断伤	一四〇
伤破血流不止	一四〇

跌打伤手足断折 …	一四〇
伤损痛不可忍 ……	一四一
陈王丹止血定痛 …	一四一
治箭或针折在肉中	
… ……	一四二
治竹木刺入肉针入肉	
… ……	一四二
针刺入肉 ……	一四三
跌打损伤至重者 …	一四三
跌打刀伤即骨碎亦	
可治 ……	一四三
为火灼 ……	四四
火灼破坏 ……	四四
赤白热痢 ……	四四

卷 三

血症 ……	一四六
血 ……	一四六
呕血吐血 ……	一四六
治咳血嗽血唾血咯血	
… ……	一四七
便血 ……	一四七
血从齿根出 ……	一四七
血药 ……	一四七
三黄泻心汤 ……	一四八
人参救肺散 ……	一四八

茯苓补心汤 ……	四八
龙脑鸡苏丸 ……	一四八
六君子汤 ……	一四九
加味逍遥 ……	一四九
山梔地黄汤 ……	一四九
伤损口鼻出血 ……	一五〇
治咯血吐血虚劳嗽	
神效 ……	一五〇
妇人尿血 ……	一五一
小儿尿血 ……	一五一
远年下血 ……	一五一
便血及诸下血 ……	一五一
齿缝出血不止 ……	一五一
宣牙出血 ……	一五一
牙根出血 ……	一五一
牙宣出血 ……	一五一
满口齿出血 ……	一五一
黑药皆能止血 ……	一五二
十灰散 ……	一五二
痰饮 ……	一五二
痰饮 ……	一五二
痰块 ……	一五三
二陈汤 ……	一五四
鹤顶丹 ……	一五四
咳嗽 ……	一五五
诸般嗽 ……	一五六

久患气嗽圣药	一五八	欲产候	六六
劳嗽吐红者	一五九	催生药	六七
喘急	一五九	黑神散	六七
喘症有八	一五九	治产难	六七
喘嗽宜辨寒热	一六〇	难产必效方白皮汤	
喘咳宜分虚实	一六〇	六八
治嗽劫药	一六一	通乳丸	六八
诸喘劫药	一六一	催生片	六八
禁忌宜知	一六一	难产	六九
治少气而喘	一六一	外贴如神丹	一六九
咳嗽喘急	一六一	如圣膏	一六九
妇人方	一六二	金胎生死	七〇
月候形色	一六二	夺命丸	一七〇
血闭 月事不来 ...	一六三	死胎着脊不出气欲死	
血崩 血漏	一六四	一七〇
妊娠忌阻	一六四	胞衣不下	一七〇
忌食诸物	一六四	五色带羸瘦者	一七三
易产方	一六四	赤白带	一七三
妊娠将理法	一六五	白带因七情所伤脉	
胎漏胎动	一六五	七
胎动腹痛不可忍 ...	一六五	胎前白带	一七八
佛手散	一六五	子痛	七八
半产	一六五	子烦	七八
苓朮汤	一六六	产后血晕	一七七
和痛汤	一六六	血晕如神前苓散 ...	一七七
保产法	一六六	附里法	一七七

醋破血晕法	一七七
治血晕闷绝	一七七
产后血崩不止	一七七
产后血前	一七八
产后喘急	一七九
补土宁喘丹	一七九
产后感冒咳嗽痰盛	一七九
产后气喘不得卧 ...	一八〇
产后咳逆不止	一八〇
产后不语	一八〇
产后发热有五	一八〇
生肠不收	一八
产后风	一八一
产后头痛	一八一
产后心腹腰胁痛 ...	一八二
产后胸腹胀闷呕吐	一八二
产后淋痛	一八三
产后淋痢泄泻	一八三
大便小便不通	一八三
产后浮肿喘急尿涩	一八四
产妇一身发黄	一八五
胎上冲心	一八五
难产候生	一八五

产后门肿	一八五
产后中气	一八五
女子转胞	一八五
转胞尿闭	一八六
千金方 治恶阻呕 吐	一八七
胎动叫呼口喎唇寒 下痢	一八七
妊娠心痛	一八七
妊娠腹痛	一八七
腹中满痛入心不得 饮食	一八七
产难三日不出方 ...	一八七
产难	一八七
产后寒热恶露不尽	一八八
产后三七日余血未尽 绞痛	一八八
产后无乳汁方	一八八
鲫鱼汤	一八八
达生篇举要	一八九
临产要法	一八九
试痛	一九一
华佗愈风散	一九三
急救	一九三
死胎办法见前	一九四

胎衣不下	九四	予赤散	一〇
论难产之故	九五	钱氏安神丸	一〇
妊娠用药	九五	夜啼方	一〇
保儿养要	九六	养子十法	一〇四
断脐法	九六	脉	一〇五
胞衣	九七	五脏	一〇五
谷儿	九七	面上证	一〇五
开乳	九七	目内证	一〇五
小儿	九八	泻青丸	一〇五
口中有虫	九九	泻黄散	一〇五
撮口薯蓣脐风	一〇〇	口唇证	一〇五
口疳	一〇〇	金蝎散	一〇六
辰砂膏	一〇〇	贴肉一法	一〇六
龙胆汤	一〇〇	抱龙丸	一〇七
脐风	一〇	利深丸	一〇七
宣风散	一〇	嗽字散	一〇七
脐肿	一〇	钓藤饮	一〇八
通心散	一〇	乳香丸	一〇八
柏墨散	一〇	余项膏	一〇九
五通膏	一〇	黄芪汤又名保元汤	九
脐实	一〇	白术散	一〇九
白芍汤	一〇	追黄散	一〇
外消散	一〇	辨证	一〇
脐湿	一〇	逐寒荡饮汤	一〇
夜啼有四	一〇	加味理中地黄汤	二
六神散	一〇		

发热	二
汗证	二
痰块	二
胎毒瞽眼	二
发热	二
天乙丹	二
通治小儿脾胃弱病	四
歧天吊传儿科秘法	四
治小儿发热者神效	五
长沙张真人传小兒	五
寒胃風散方	五
腹痛	五
調中丸	六
五香散	七
消食散	七
消积丸	七
腹由由脾胃气虚攻	七
作也	七
小兒	七
水冲	八
加減腎氣丸	八
身面皆腫多分	八
腫脚散方	八

心痛	九
芍药散	九
金铃散	九
虫自	九
蛔厥心痛	九
不乳食	〇
异功散	〇
秘旨安神丸	一
人参安胃散	一
宿食伤脾胃食决肠方	一
吐瀉	一
和中散	一
玉露散	一
大青膏	一
吐瀉禁忌	四
吐瀉	四
吐	四
冷吐	四
热吐	四
积吐	四
香薷散	五
小兒吐瀉	五
瀉瀉	五
熱瀉	六

冷瀉	二二六	使君子丸	·
冲和飲	二二六	小兒口疳流涎口爛	
水瀉	二二六	神方	二三四
傷食瀉	二二六	諸疳通治藥肥兒丸	
積瀉	二二七	·	四
疳瀉	二二七	五疳消食丸	四
風瀉	二二七	瀉	四
疳疔	二二七	煩躁	五
疳積散瀉	二二七	黃連	五
龍骨湯	二二八	茵陳湯	五
痢疾	二二八	小兒一身尽黃	五
赤痢	二二九	黃連	五
黃連阿膠丸	二二九	小便不通有門口二証	
香薷散	二二九	·	八
瀉痢兼瀉証	二二九	大連散	八
當歸散	二二九	冬葵子散	八
鷄子飴	二二九	大小便不通	八
通治小兒疳積神方		大連湯	八
·	·	瀉白散	七
食積痢	·	瀉腹散	七
通治小兒疳積方	·	黃芩散	七
積	·	咳嗽	七
四神丸	·	葶藶丸	七
疳疔	·	清肺飲	八
走馬疳	·	小兒疳湯	二九
內全散	·	五物湯	九

王烂疮	二五
天泡	二五
胎毒奶毒天泡等疮	二五
天蛇毒	二五
时毒	二五
葛根牛蒡汤	二五
升毒	二五
火丹	二五二
葛根白术散	二五二
漏芦汤	二五
丹入腹及下至卵不	二五
治方	二五
走马胎赤肿走入眼	二五
不救	二五
腮项	二五
清咽利膈汤	二五
肺病证	二五
疔毒	二五
隔蒜灸法	二五
葱熨法	二五四

卷 四

痘疹	二五五
辨痘	二五五
看耳筋法	二五五

治法	二五五
日数	二五六
发热三朝	二五六
发热吉凶	二五七
照痘法	二五七
见点	二五七
报痘	二五七
出痘三朝	二五八
出痘时吉凶	二五九
部位吉凶	二五九
红色	二五九
托痘秘方	二六〇
保护咽喉	二六〇
保护眼目	二六一
神应膏	二六一
脉	二六一
起胀三朝	二六一
起胀吉凶	二六二
贯脓三朝	二六三
贯脓吉凶	二六三
收靥三朝	二六四
收靥吉凶	二六四
落痂	二六五
痘科方	二六五
升麻葛根汤	二六五
发热流涎子汤	二六五

解毒防风汤	二六五
导赤散	二六五
四苓散	二六五
消毒饮	二六六
四圣散	二六六
加味败毒散	二六六
神解汤	二六六
四物解肌汤	二六六
化毒汤	二六六
犀角消毒饮	二六六
猪尾膏	二六六
透肌方	二六七
加味四圣散	二六七
决痈散	二六七
紫草饮	二六七
丝瓜汤	二六七
连翘升麻汤	二六七
鼠粘子汤 消毒饮	
四圣散	二六七
保托汤	二六七
四苓散 化毒汤	二六八
胡荽酒	二六八
起胀固真汤	二六八
内托散	二六八
紫草膏	二六八
痘不起胀肥纹	二六九

四齿散	二六九
独圣散	二六九
活血散	二六九
十全大补汤	二六九
快癰汤	二六九
夺命丹	二六九
定中汤	二六九
猪心龙脑膏	二七〇
并功散	二七〇
宣风散	二七〇
甘露回天饮	二七〇
浴法	二七〇
洗肝明目散	二七一
通治	二七一
保元汤加减法	二七一
解毒	二七一
痘症吉凶	二七一
不须服药	二七一
七不治	二七一
痘之轻者	二七二
重者	二七二
轻变为重	二七三
重变轻	二七三
轻者	二七三
重者	二七四
险症	二七四

羌活汤	三	杂记	五
人参败毒散		饮食	八
藿香正气散	三	火	六
汗法			
不可汗		校注后记	九
病宜早治说	三一四		
小儿变蒸切忌推拿说			
.....	三一四		

总 书 目

医 经

内经博议
内经提要
内经精要
内经津渡
素灵微蕴
难经直解
内经评文灵枢
内经评文素问
内经素问校证
灵素节要浅注
素问灵枢类纂约注
清儒《内经》校记五种
勿听子俗解八十一难经
黄帝内经素问详注直讲全集

基础理论

运气商
运气易览
医学寻源
医学阶梯
医学辨正
病机纂要
脏腑性鉴
校注病机赋
内经运气病释

松菊堂医学溯源
脏腑证治图说人镜经
脏腑图书症治要言合

伤寒金匱

伤寒考
伤寒大白
伤寒分经
伤寒正宗
伤寒寻源
伤寒折衷
伤寒经注
伤寒指归
伤寒指掌
伤寒选录
伤寒绪论
伤寒源流
伤寒撮要
伤寒续论
医宗承启
桑韩笔语
伤寒正医录
伤寒全生集
伤寒论证辨
伤寒论纲目
伤寒论直解

伤寒论类方
伤寒论特解
伤寒论集注（徐赤）
伤寒论集注（熊寿试）
伤寒微旨论
伤寒溯源集
订正医圣全集
伤寒启蒙集稿
伤寒尚论辨似
伤寒兼证析义
张卿子伤寒论
金匱要略正义
金匱要略直解
高注金匱要略
伤寒论大方图解
伤寒论辨证广注
伤寒活人指掌图
张仲景金匱要略
伤寒六书纂要辨疑
伤寒六经辨证治法
伤寒类书活人总括
张仲景伤寒原文点精
伤寒活人指掌补注辨疑

诊 法

脉微
玉函经
外诊法
舌鉴辨正
医学辑要

脉义简摩
脉诀汇辨
脉学辑要
脉经直指
脉理正义
脉理存真
脉理宗经
脉镜须知
察病指南
崔真人脉诀
四诊脉鉴大全
删注脉诀规正
图注脉诀辨真
脉诀刊误集解
重订诊家直诀
人元脉影归指图说
脉诀指掌病式图说
脉学注释汇参证治

针灸推拿

针灸节要
针灸全生
针灸逢源
备急灸法
神灸经纶
传悟灵济录
小儿推拿广意
小儿推拿秘诀
太乙神针心法
杨敬斋针灸全书

本草

本草

本草

本草

本草汇

本草使

法古录

食品集

上医本草

山居本草

长沙药解

本经经释

本经疏证

本草分经

本草正义

本草汇笺

本草汇纂

本草发明

本草发挥

本草约言

本草求原

本草明览

本草详节

本草洞论

本草真论

本草通玄

本草集要

本草辑要

本草纂要

识病捷法

药性提要

药征续编

药性纂要

药品化义

药理近考

食物本草

食鉴本草

炮炙全书

分类草药性

本经序疏要

本经续疏证

本草经解要

青囊药性赋

分部本草妙用

本草二十四品

本草经疏辑要

本草乘雅半偈

生草药性备要

苗园臆草题药

类经证治本草

神农本草经赞

神农本经会通

神农本经校注

药性分类主治

艺林汇考饮食篇

本草纲目易知录

汤液本草经雅正

新刊药性要略大全

淑景堂改订注释寒热温平药性赋

方 书

医便

卫生编

袖珍方

仁术便览

古方汇精

圣济总录

众妙仙方

李氏医鉴

医方丛话

医方约说

医方便览

乾坤生意

袖便方

救急易方

程氏释方

集古良方

摄生总论

摄生秘剖

辨症良方

活人心法（朱权）

卫生家宝方

见心斋药录

寿世简便集

医方大成论

医方考绳愆

鸡峰普济方

饲鹤亭集方

临症经验方

思济堂方书

济世碎金方

摘摩有得集

喉斋急应奇方

乾坤生意秘樞

简易普济良方

内外验方秘传

名方类证医书大全

新编南北经验医方大成

临证综合

医级

医悟

丹台玉案

玉机辨症

古今医诗

本草权度

弄丸心法

医林绳墨

医学碎金

医学粹精

医宗备要

医宗宝镜

医宗撮精

医经小学

医垒元戎

证治要义

松崖医径

扁鹊心书

素仙简要

慎斋遗书

折肱漫录

济众新编

丹溪心法附余

方氏脉症正宗

世医通变要法

医林绳墨大全

医林纂要探源

普济内外全书

医方一盘珠全集

医林口谱六治秘书

温 病

伤寒论

温证指归

瘟疫发源

医寄伏阴论

温病论笺正

温病指南集

寒瘟条辨摘要

内 科

医镜

内科摘录

证因通考

解围元数

燥气总论

医法征验录

医略十三篇

琅嬛青囊要

医林类证集要

林氏活人录汇编

罗太九口授三法

芷园素社核症论疏

女 科

广生编

仁寿镜

树蕙编

女科指掌

女科撮要

广嗣全诀

广嗣要语

广嗣须知

华有玄机

妇科玉尺

妇科百辨

妇科良方

妇科备考

妇科宝案

妇科指归

求嗣指源

坤元是保

坤中之要

祈嗣真詮

种子心法

济阴近编

济阴宝筏

秘传女科

秘珍济阴
黄氏女科
女科万金方
彤圃妇人科
女科百效全书
叶氏女科证治
妇科秘兰全书
宋氏女科撮要
朱氏女科秘方
节斋公胎产医案
秘传内府经验女科

儿 科

婴儿论
幼科折衷
幼科指归
全幼心鉴
保婴全方
保婴撮要
活幼口议
活幼心书
小儿病源方论
幼科医学指南
痘疹活幼心法
新刻幼科百效全书
补要袖珍小儿方论
儿科推拿摘要辨症指南

外 科

大河外科

外科真詮
枕藏外科
外科明隐集
外科集验方
外证医案汇编
外科百效全书
外科活人定本
外科秘授著要
疮疡经验全书
外科心法真验指掌
片石居疡科治法辑要

伤 科

正骨范
接骨全书
跌打大全
全身骨图考正
伤科方书六种

眼 科

目经大成
目科捷径
眼科启明
眼科要旨
眼科阐微
眼科集成
眼科纂要
银海指南
明目神验方
银海精微补

医理折衷目科
证治准绳眼科
鸿飞集论眼科
眼科开光易简秘本
眼科正宗原机启微

咽喉口齿

咽喉论
咽喉秘集
喉科心法
喉科钩指
喉科枕秘
喉科秘钥
咽喉经验秘传

养 生

易筋经
白居四要
寿世新编
养生训纂
修龄要指
香食润色
养生四要
养生类纂
仲仙服饵
尊生要旨
黄庭内景五脏六腑补泻图

医案医话医论

纪恩录
胃气论

北行日记
李翁医记
两都医案
医案梦记
医源经旨
沈氏医案
易氏医按
高氏医案
温氏医案
鲁峰医案
柳氏脉案
磨山医案
旧德堂医案
医论三十篇
医学穷源集
吴门治验录
沈芊绿医案
诊余举隅录
得心集医案
程原仲医案
心太平轩医案
尔泉草堂医案
冰壑老人医案
芷园臆草存案
陆氏二世医验
罗谦甫治验案
临证医案笔记
1 授堂先生医案
张梦庐先生医案

养性轩临证医案
养新堂医论读本
祝茹穹先生医印
谦益斋外科医案
太医局诸科程文格
古今医家经论汇编
莲斋医意立斋案疏

医史

医学读书志
医学读书附志

综合

元汇医镜
平法偶言
寿芝医略
杏苑生存
医林正印
医法青篇
医学五则
医学汇函
医学集成

医学辨告
医经允中
医钞类编
证治合参
宝命真詮
活人心法（刘以仁）
家藏蒙竿
心印绀珠经
雪潭居医约
嵩崖尊生书
医书汇参辑成
罗氏会约医镜
罗浩医书二种
景岳全书发挥
新刊医学集成
寿身小补家藏
胡文焕医书三种
铁如意轩医书四种
脉药联珠药性食物考
汉阳叶氏从刻医集二种

便易方

治病八要 病有八要，不知其要，病将安去？谓表、里、寒、热、虚、实、邪、正而已。又须辨清气、血、痰、火，庶几无误。

制药法 凡病在头面、手指、皮肤者，酒炒；病在咽下、脐上者，酒洗；在下者，生用。凡火炮、汤泡¹、煨炒者，制其毒也；醋浸、姜制、酥炙者，行经络也。蜜²制入肺，姜入脾，盐入肾，醋入肝，童便入心也。治血以酒煮，痰以姜，虚以童便，积以醋浸水煮也。

不去心，则令人烦；不去皮，则令人痞也；桃、杏仁，去双仁及皮尖，则不生疔毒也。凡炒药不可焦，焦则无力也；诸香并忌见火，丁香尤甚；槟榔、茵陈、桑寄生并忌见火，不如勿用。

煎药法 凡煎药须用河水，或新汲出井水。若停水、污浊水、油腻水，皆不可用。瓦罐洗涤极净，方可盛药，

¹ 泡：原作“炮”，据《医学入门》卷二《本草总括》“炮炙制度毋误”。

² 蜜：原作“密”，据《医学入门》卷二《本草总括》“炮炙制度毋逞巧”改。

煮时不可犯铜、铁器。用水少则药味不出，多则药味太薄。人约药剂一两，用水二茶碗，微火煎至一碗。煎时勿可揭盖泄气，煎好绞去药渣。凡药倾出，急须以纸盖好，勿令泄气乃效。

表汗通利之药，煎至八分；滋补药，煎至六分。药渣两剂合一剂，加水煎竭，亦可抵一剂新药。

汤内用酒，则临熟加入。凡阿胶、芦薈、饴糖，皆须待汤好去渣，纳净汁中溶化服之，否则可惜。

凡砂仁、丁香、钩藤等，皆须舂细，迟后入药，煎一沸即起，不可久煎。麝香、犀角、羚羊角^①、生黄、熟黄、朱砂先研细末如粉，临服纳入汤中，搅匀服之。

凡大枣、莲子等，皆劈半破；茅根、切沙打^②、陈艾，切碎；香附，研碎；入煎方得出味，余可例推。

服药法 病在胸膈以上者，先食，停半时服药；病在心腹以下者，空心服药，而后进食；病在四肢血脉者，宜清晨服；病在骨髓者，宜饱食而夜服药；在足者，立而服。不依此，少效。

凡服发汗利汤，欲得清早。如一服不解，中可相去如步行十里之久，再吃一服。大约皆分二服，初次多，渐渐少，则安穩。如前药未消，后汤来冲，必有吐逆。药久的味散，则又无功。

① 角：原脱，据《古今医统大全》卷九十七《煎药则例》补。

② 沙：《古今医统大全》卷九十七《煎药则例》作“擘”，义胜。

凡服脚气痛药，须立服。

凡服治风汤，第一服厚覆取汁，若得汁则须薄覆，勿可令大汗，中间须间食粥。不然者，令人虚而无力。

凡服补药，昼二服，夜一服，中间须间食，则易得药力。服药后须左右仰覆卧各半时，则药力能遍行腹中。卧后又于室中行一百步许，一日勿可出外，乃有效。服药后，忌汤，忌酒。

凡丸药如梧桐子大者，初服十丸，渐加至四十丸，一日三度。

凡细末者，不循经络，止^①去膈上病及脏腑之积，治嗽尤宜。气味厚者，白汤调下；气味薄者，煎之和酒服。

补肾药必须五更初、未言语前，服之乃效。

服药禁忌 忌油腻、腥臊、鱼肉、生蒜、果实、滑物、滯物，又忌见死尸及产妇淹秽之物。制药、煎药皆忌之。

茯苓、人参，忌醋及酸物。乳石，忌参、木。制芥、小豆，忌鱼肉。白术、苍术，忌鱼、葱、桃、李、青鱼、蟹，忌白及葱、葛根。葱、韭，忌蜜、杀人。枣，忌葱、白。桔梗、黄连，忌猪肉。半夏、菖蒲，忌饴糖、羊肉、栗，患风人及小儿忌之。桐子，忌肉、饴糖、芥菜、猪肉、马、麦冬、丹皮，忌葱。绿豆，忌鲤鱼。甘草，忌猪

① 止：副词，相当于“仅”“只”，如“止此一家”“不止一回”。杨树达《词诠》卷五：“止，副词，仅也。”

肉、松菜，犯则病不除。桂，忌葱。厚朴，忌豆。凡用切角，最忌盐。黄鲠鱼、鲑鱼，反荆芥，能杀人。牛乳，反酸物，令人结癖。

忌铁器 地黄、黄柏、桑皮、桑枝、菖蒲、益母草、木瓜、香附、茜根、丹皮、杜仲、知母、麦冬、人冬、金银花、草龙胆、骨碎补、地骨皮、猪苓，皆忌铁，玄参尤甚。

忌铜器 地黄、何首乌、玄参、肉豆蔻、柴胡、没石子。

乡村简便方

凡人外感风寒，头疼发热，恶风恶寒，有方治之。用紫苏二钱，荆芥二钱，薄荷一钱，冬桑叶一钱，砂仁五分，同冲，生姜一片，木香一文，煎汤，加沙糖饮之，无不愈者。春令，加川芎一钱；夏令，加薄荷一钱、六一散一钱、香薷一钱、藿香一钱；冬令，加连根葱白一个、生姜一片。重者，加豆豉一钱以发汗。有积，加炒福曲^①一钱。肉积，加山楂一钱，二剂愈矣。如咳嗽，加桔梗一钱；咽喉，加牛蒡子一钱，研、甘草一钱、桔梗一钱；头痛，加川芎一钱；两身骨头痛，加羌活、防风各一钱。

① 玄：原作“元”，系避清·康熙帝玄烨名讳，回改。

② 福曲：别名赤曲、丹曲、红米、红大米、红糟，为曲霉科真菌红曲霉的菌丝体寄生在粳米上而成的红曲米。

小儿凡有身热恶风寒者，用薄荷一钱、荆芥一钱、竹叶一钱、生姜一钱、焦麦芽一钱、紫苏一钱，煎服。咳嗽，橘红三分、桔梗五分。

肚痛者，清晨吃使君子砂，一岁一粒，只一次便好，二次全愈。

凡伤食食积，即以其物烧灰存性，放土地盖住，冷研末，加砂仁一分，沙糖调服，最妙。砂仁须研末，去皮用。

凡有小块红肿，似欲生疮者，于初起时，半夜用津唾搽之，清晨又搽之，一日三四五次，二日即愈。

凡有病，用白茅根鲜鲜者，掘出拣净，切碎打烂，浓煎，取其汤煮新米稠粥，与食之，大妙。此钱凤古先生法也。

论挑惊挑黄之谬 世有恶妇，创为挑惊之说。又有云口中挑黄者，以大针刺儿口中，幅幅有声，愚人信之，以为病可已也。不知儿病而加之以大痛，是不配矣，是何心哉？惊者，肝之病也，岂能以针刺肌肤而愈乎？且问其所刺果何穴乎？愚人不知，奉为神明，活活将儿病死，岂不哀哉！世有仁人见此等恶妇，必大加擯逐，庶泄婴孩难白之冤。若刺重腮、重舌等法，古有明文。惟挑惊挑黄之说，实未有也。

无病治法

叩齿 夜叩一百二次，日叩一百一次，永无齿患。

咽津 以舌抵上腭，久则津生满口，咽下咽然有声，以多妙。

浴面 将两手自相摩热，擦面十次，则面不白。

鸣天鼓 将两手掌掩两耳，先以第二指压中指，弹脑后骨上，左右各三十六次，能去头脑诸疾。

运膏肓 此穴在背上第四脊下两旁各一寸，将两肩扭转十四次，治一身诸疾。

左右开弓 将左手伸直，右手作弯弓状，以两目看右手，左右各三次，去臂腋风邪。

摩腹 午后、夜间、清晨，以手摩腹各一百，治腹中诸病。

防眼病 正坐运睛，旋环八十一数。闭目集神，再运，永除目患。又法以大指背热摩手心劳宫穴，熨两眼，每二十七次，明目去风。凡眼疾，忌鸡、鱼、酒、面、元米^③、咸酸、热油、诸毒物。

牙齿 早起以盐漱口吐出，洗眼则眼光明，而永无齿痛。

口腹不节，致病之因；心虑不正，杀身之本。四语当日日诵之。

时禁 春宜凉，夏宜寒，秋宜温，冬宜热药。

① 咽（guō 郭）：象声词，食物下咽的声音。

② 弯：《寿世青编·十二段动功》作“攀”。

③ 元米：即糯米、江米。

四不可补 谓痰疾、狂疾、水气、脚气也。

勿伤胃气 病邪轻，药力重，则伤胃气。气弱者，当去苦寒之剂。

食疗治病 医者，先晓病源，知其所犯，以食治之。食疗不愈，然后用药。

凡有病人吃菜，祇^①宜陈海蜃、离橘皮、腐乳等；饮汤，祇宜藕汤、莲子等，余物尚宜斟酌。即如痢病，青菜、豆子等滑物，亦不可吃也，余可类推。

辨 症

气证饮水，血证不饮水。热在上焦，气分则渴，热在下焦，血分则不渴。血之外证，常以汤水漱口。气病则麻，血病则痛。

一切血证，日轻夜重；一切痰证，食少，肌色如故；一切火证，性急躁盛；一切水证，肋硬，心下怔忡。无阳则咳，无阴则嗽。阳虚则外寒，阴虚则内热。阳盛则外热，阴盛则内寒。

伤风之证初起 头痛、身疼、咳嗽多是也。用防风、荆芥、柴胡、甘草、黄芩、半夏等。

伤湿之证初起 恶寒、身重足肿、小便短赤是也。用白术、泽泻、猪苓、肉桂、茯苓、柴胡、车前子、半夏、

① 祇 (zhī 只)：正，恰。

苡仁、芡实、山药等。

伤燥之证 咽干口燥、痰不能吐、面目红赤、不畏风吹是也。用麦冬、桔梗、甘草、花粉、陈皮、玄参、白部等。

火症初起 大渴引饮、身有斑^①点、或身热如焚、或发狂乱语是也。用石膏、玄参、麦冬、甘草、升麻、知母、半夏、竹叶。

伤食之症 心中饱闷、见食则恶食、转痛是也。用白术、茯苓、枳壳、山楂、麦芽、谷芽、神曲、半夏、砂仁、甘草、萝卜子。

伤暑之症 ① 头昏口渴、恶热身热、痰多气短是也。用青蒿、香薷、白术、陈皮、甘草、茯苓、扁豆、党参。

葱盐运法 凡肚痛各痛，用连根葱白四两，炒热，熨腹上及各患处，一时即愈。一法，用盐入脐内。一法，用麸皮炒热，熨之。总不如葱运尤效。如小便不通，脐内入盐葱，熨小腹上，良久即通。寒痛加姜运，尤妙。

跌打损伤 用连根葱白、紫苏四两，煎浓汤，洗疮即愈。然不如用粗毛锤头，烧火溺令热，熨之尤妙。② 葱，生年久，浸水中也。

① 班：通“斑”。清·段玉裁《说文解字注·文部》：“斑者，辨之俗……又或假班为之。”

倪涵初^①先生治痢三方

治痢初起煎方 川黄连去芦，生、条黄芩生、白芍生、山楂肉各一钱二分，陈枳壳麸炒、厚朴姜汁炒并、槟榔、青皮各八分，红花，炒，一分，当归酒炒、生甘草、地榆各五分，桃仁去皮尖、研如粉，一钱，南木香一分，用水二碗，煎一碗，空心服，渣再煎服。此方，或红或白，里急后重，身热腹胀者，俱可服。如单白者，去地榆、桃仁，加橘红四分，南木香可用二分。如带涩重者，加大黄一钱，酒炒，服一二剂，仍去除之。若用一剂，带涩已去，不必又用二剂矣。用大黄于年幼之人，又不拘用一钱也。上方用之，在一五日内，神效；旬日内者，亦效；惟十日半月后，则当用加减方。

加减煎方 川连酒炒，六分；生白，四分，条黄芩酒炒，六分；生白四分，大红芍药酒炒，六分；生白四分，山楂肉一钱，橘红、青皮、槟榔各四分，炙草一分，生甘草一分，当归五分，地榆四分，桃仁粉六分，红花一分，木香一分，水二碗，煎一碗，空心服。

如延至月余，觉脾胃弱而虚滑者，当用补理方

补理煎方 川连酒炒、条黄芩酒炒、橘红各六分，白芍

① 倪涵初：清代名医，绍兴管墅亭后人。医术高明，救治重危病人无数，生前被人尊为“倪天医”，逝后被尊奉为“天医菩萨”。

② 仍：介词，表因果关系，相当于“于是”“因而”。《尔雅·释诂下》：“仍，乃也。”

酒炒，四分，当归、人参、白术土炒、炙草各五分，水煎，空心服。如妇人有胎者，去桃仁、红花、槟榔。以上一方，随用辄效。

治痢禁忌 一忌温补，一忌大下，一忌发汗，一忌分利。惟清热一法，无忌。

泄 泻

升阳除湿汤 治脾胃虚弱，不思饮食，泄泻无度，小便黄，四肢困弱，自下而上，引而去之。苍术三钱，柴胡、羌活、防风、神曲、泽泻、猪苓各五分，陈皮、大麦蘖、炙甘草各一分，升麻五分，水两盏，煎一盅，空心服。如胃寒肠鸣，加益智、半夏各五分，姜、枣同煎，非肠鸣不用加。

益元散 治身热泄泻，小便不利，用滑石、甘草。

白术芍药汤 治脾经受湿，水泄注下，体重困倦，不欲饮食，水谷不化等证。白术炒、芍药炒，各四钱，甘草炒，二钱，水煎服。

大藿香散 治一切脾胃虚寒，呕吐霍乱，心腹撮痛，如泄泻不已，最能取效。藿香、木香制、青皮麸炒、神曲炒、人参、肉豆蔻面裹，麸、良姜炒、诃子肉，去核、麦蘖炒、白茯苓、甘草炒、制厚朴、陈皮去白，各一两，干姜炮，五钱，为细末，每服四钱。吐逆泄泻，不下食，或呕酸苦

水，加煨姜一两、盐一捻，水煎服。水泻滑泄，肠风脏毒，陈米饮入盐，热调下。赤白痢，煎甘草黑豆汤下。脾胃虚冷，宿滞酒食，痰气作晕，入盐少许，嚼姜枣汤热服。胃气吃噎^①，生姜自然汁，入盐点服。此药大能顺气消食，利膈开胃。

止泻秘方 人参去芦、白术、干姜炮、诃子去核、茯苓去皮、木香、丁香、肉豆蔻^②去瓤、炙甘草各一钱半，作一服，水两盅，煎一盅，食前服。

大小便不通 葵子末一合，青竹叶一把，水一升，煮五沸，顿服。

大便不通

麻仁丸 治肠胃热燥，大便秘结。厚朴去皮，姜制2炒，芍药、枳实麸炒，各八两，大黄二两，一钱，麻仁易研，五两，杏仁去皮尖，炒，去皮子钱，为末，蜜丸梧子大，每服二十丸，临卧用温水下，大便通利则止。

苏麻粥 顺气，滑大便。苏子、麻仁，不拘多少，研烂，水滤取汁，煮粥食之。

小通气散 治虚人忧怒伤肺，肺与大肠为传送，叙令

① 吃噎：即干噎、吃，声哑语难也；噎，胸气饱、出息。胃虚为啰，名吃噎。宋·许叔微《伤寒百证歌》：“古人方书无吃字。唯有啰。朱肱以啰者吃气也。”

② 制：《医宗必读》卷九《大便不通》“麻子丸”条作“汁”，《类方证治准绳》第六册《大便不通》“麻仁丸”条作“制”。可参

秘涩。服燥药过，大便秘，亦可用。陈皮去白、紫苏茎叶、枳壳去穢^①、木通去皮节，各等分，每服四钱，煎服，立通。

③ 润肠丸 治胃中伏火、大便闭涩，或干燥不通，全不思食。乃风结血秘，皆令团塞，须润燥和血疏风，则自然通矣。羌活、当归稍^②、大黄^③，各五钱，麻仁、桃仁^④去皮尖，各一两，为末；除麻仁、桃仁另研如泥外，为细末，蜜丸桐子大，每服五十丸，空心，白汤送下。

小便不通

① 清肺散 治渴而小便闭，或黄，或涩。茯苓一钱，猪苓一钱，泽泻、稻麦、琥珀各五分，灯心一分，藜蘆、木通各七分，通草一分，车前子一钱，炒，为细末，每服五钱，水一盞半，煎至一盞，稍热服。

② 导气除燥汤 治小便不通，乃血涩致气不通而致涩也。知母酒制，一钱，黄柏酒制，四钱，滑石炒黄，二钱，泽泻木一钱，茯苓去皮，二钱，和匀，每服五钱，水煎稍热，空心服。如结^③闭小便，不拘时服。

③ 滑石散 治胞为热所迫，或忍小便，俱令水气迫于

① 穢(ráng 颡)：原作“穢”，据《类方证治准绳》第六册《大便不通》“小通气散”条改。

② 当归稍：当归尾。稍，本义为禾末。《说文》：“出物有渐也。从禾，肖声。”清·朱骏声《说文通训定声·小部》：“稍，按此字当训禾末，与秒为谷芒者别。”

③ 结：《类方证治准绳》第六册《小便不通》“导气除燥汤”条作“急”，义胜。

胞，屈脊！不得充张，外水应入不得入，内洩应出不得出，小腹急痛，不得小便，小腹胀，不治害人。寒水石一两，葵子一合，白朮石、乱发灰、车前子、木通去支结，各一两，水一斗，煮五升，时服一升，即利。

葱白汤 治小便卒暴不通，小腹膨急，气上冲心，闷绝欲死。此由暴气乘膀胱，或从惊扰，气无所伸，郁闭而不流，气冲胞系不止。陈皮一两，葵子一两，葱白一茎，为末，水五升，煮二升，分三服。

又法，炒盐半斤，囊盛，熨小腹。

葱熨法 治小便难，小腹胀。不急治，杀人。用葱白一石，细切，炒令热，以帕子裹，分作两处，更替熨脐下，即通。

独蒜涂脐方 治小便不通。大蒜头，者，一枚，梔子一枚，盐花少许，捣烂，摊纸花子^②上，贴脐，良久即通。不效，涂阴囊，立通。

大泻 用熟地、山药、山茱、白朮、肉桂、肉果^③、北五味、吴茱、人参、茯苓为末，蜜丸，每日晚饭前服五钱。

满泻 邪壅上焦而不得散也。用枳壳一钱，梔子、花粉、陈皮各一钱，瓜蒌^④一个，甘草、半夏各一钱，厚朴一钱。

① 辟：通“𦘔”，折叠，或闭合。清·朱骏声《说文通训定声·解部》：“辟，假借为𦘔。”《庄子·田子方》：“心困焉不能知，口辟焉不能言。”

② 纸花子：秦腔头饰以麻纸制作。

③ 肉果：肉豆蔻的别名。

半，煎服。

水泻 人参一钱，车前子一两，白芍一钱，槟榔、甘草各一钱，煎服。大泻一止，即宜用四物汤加人参、炮姜以温补之。

寒泻 一日数十行，腹亦痛，完谷不化，下咽即出。夫火热者，口必渴，舌必燥，其则生刺也，舌胎必黄灰黑色，腹必痛而手不可按；寒泻者，口不渴，不喜饮水，舌胎必白滑而不燥，腹痛喜手按。治当生其胃气，佐以分消。用人参一钱，白术一两，附子一钱，茯苓一两，泽泻、猪苓各三钱，肉桂一钱，为末，每服三钱。

火泻 乃火扶邪势，将膀胱、脾中水谷尽驱而泻，腹痛不可按，饮食下咽即出，暑热遇凉风而起。用人黄一两，人参一两，黄连、车前子各五钱，甘草一钱，为末，每服一钱。治火痢亦妙。

下血 熟地一两，地榆、白芍、当归、黄连各一钱，甘草、葛根各一钱，朴树枝五钱，煎服。一剂必下血更多，服少，三剂愈。

痢 白芍、当归各一两，莱菔子一两，枳壳一钱，槟榔一钱，甘草、车前一各二钱，煎服。若痢如鱼冻水者，乃虚寒也，此方宜斟酌。

疟疾变痢 人参、鳖甲、茯苓、当归各一两，白术、

① 车前：《石室秘录》卷一《通治法》“论痢下通治”条作“车前子”。

白芍各一两，柴胡、枳壳、槟榔各一钱，为末，每服二钱。

大吐一热吐者，必随痰而出，宜二陈汤；寒吐则地是清水，宜加人参、丁香、炮姜，然参亦只可暂用。

凡吐宜用瓜与散，必须看其痰吐在望上有光亮者，放心吐之，余皆忌吐。

吐血鼻血 生地一两，煎汤半碗，调三七根末一钱，炮姜灰五分服。又方，人参、当归各一两，枣仁、三七根各一钱，为末，水调服二钱。

反胃初起 用黄连散加黄连一钱，立止，此食入即吐之可也。如朝食暮吐，又为命门无火，当是八味汤症矣。

关膈 以开郁为主，用柴胡、郁金、茯苓、白芥子、花粉、苏子、枳壳各一钱，白芍一钱，甘草五分，煎服妙。

中风不语 尸厥、中恶、中痰等症，乃中邪风气闭也。用瓜蒂七粒，水两碗，煮一钱，加盐少许，煎之。或用皂角刺为末，吹鼻，得嚏、吐痰后，以人参、白术各一两，白芍一钱，茯苓一钱，半夏一钱，治之。又方，人参一两，半夏、南星各一钱，附子一钱，煎服。又方，用滚水、凉水各一碗，加炒盐一撮，打百余下起泡，饮之，立吐而愈。又法，用生半夏为末，水丸如黄豆大，入鼻孔中，则喷嚏不已，用水饮之，立止。

猝倒不省人事，无论中恶、中痰，皆气虚之故。用人参一钱，白术五钱，附子、半夏、南星、陈皮、白薇各一钱，

煎服，下喉即愈。虚人可用人参一两。

心痛暴亡，非寒则火。治火，用炒梔子、白芍各五钱，贯众一钱，甘草一钱，煎服。治寒，用人参一钱，白术五钱，肉桂一钱，附子、甘草各一钱，熟地一两，山茱萸一钱，良姜一钱，煎服。

腹痛极，手足皆青，由经络直中寒邪也。用人参一钱，白术、熟地各五钱，附子、肉桂各一钱，吴萸、干姜各一分，煎服。

痰病久不愈。用猪肺一个，以莱菔子五钱，研碎，白芥子一两，五味子调和，饭锅煮熟，饭后熟食之。治十集之痰，神妙。

癆虫。用肥鳅一斤，白芷一两，小茴香一钱，甘草一钱，故纸五钱，槲子一两，同在砂锅内煮烂，加五味和之，来饥饱餐一顿。以食尽为度，不必再吃饭，半日不可吃茶水，则癆虫尽死。吃水则无功。

瘟疫。宜去其火热，少用祛邪逐秽。用人参一钱，玄参五钱，柴胡一钱，石膏一钱，黄芩一钱，麦冬、白芍、滑石、花粉各三钱，煎服。

头顶出汗。乃肾火有余、而肾水不足也。用桑叶一两，熟地一两，五味一两，麦冬、云、蜜丸，日服一剂。

每饭之时，头汗如前者，为火旺也。用玄参、麦冬

1 五味：即五味子。

2 通方：此方出《石室秘录》卷五“逐瘟神圣丹”。

人冬、生地各一斤，五味四两，枣仁一斤，蜜丸。日下一两，二月愈。

心惊 乃肝血虚而不能养心也。用当归、白芍、熟地、生枣仁、远志、茯神、麦冬、五味、人参、煎服。

心惊与不寐 人参、茯苓、茯神、远志、白芍、生枣仁、熟地、山萸、当归、菖蒲、黄连、肉桂、白芥子、麦冬、砂仁，蜜丸，日服三钱。

卧不安枕 人参、远志、炒枣仁、熟地、山萸、茯神、柏子仁、麦冬、陈皮，蜜丸，日服三钱。

梦遗 熟地、山萸、芡实、生枣仁、巴戟、麦冬、北五味、莲子连心，蜜丸，日服一两。

梦遗 用芡实半斤，山药、生枣仁各半斤，莲子肉青心半斤，各五钱，米泔打粉为丸，日服，早晚五钱。莲子之妙全在心，故不可去。

脱精 用黄芪四两，当归二两，附子一钱，煎灌。富人用参一斤，附子一两。

遇交感脱精 使妇人抱住，以笔管尽力呵气入腹，虽死亦能生。急以人参三两，煎灌之。

虚火上炎，咽喉、口舌大痛，用附子末醋调，贴在脚心涌泉穴，服地黄汤。凡下寒下利之证，皆可用此法。

厥逆之症 用吴茱萸一握，为末，酒调，贴涌泉穴。

① 五钱：原脱，据《石室秘录》卷二《闭治法》“论交感脱精、论梦遗脱精”条补。

痿症奇方 黄仁、熟地各一两，麦冬一两，五味二钱，牛膝五钱，煎服。

立治 服时，宜立面饮药，乃不至叶。腰痛，立面饮药，乃能直达肾宫。

饥治 病有当俟其饥而用药者，伤寒也、虫痛也，在乱也。霍乱之症，愈后当忍饥一日，以陈皮、甘草、白术、茯苓、山楂、香薷、藿香、木瓜、白芍治之，乃不复发。盖暑热得食，复聚而不可解故也。

饱治 我在十集及头目等处，宜饱饭后服药。

脾虚用六君、四君，肾虚用八味、六味，肝虚用建中，血虚用四物，肺虚用生脉，心虚用归脾、天王补心，胃虚用四君，脾虚用补中，郁证用逍遥散。

伤风用小柴、参苏，胃热用竹叶石膏，饮食不调用六君子，头眩用小柴胡，咳嗽用通适，胸膈饱闷用通适，腹痛用小建中，水泻用五苓散。

独用泻 车前子一两，煎服。

腰痛 白术四两，酒二碗，水二碗，煎服。

吐血 血用归、芪，中寒用参、附，中热用玄参、麦冬。

目痛 柴、芍、白茯苓、甘菊、半夏、白术、羌活、草决明、甘草、梔子。

六君子汤加减法 有热，加黄芩；夜不眠，加黄连肉；潮热，加柴胡、地骨皮、丹皮；有食，胸中痛，加枳

壳、山楂；有痰，加白芥子；咳嗽，加桔梗；泄水，加车前子；腹痛，加肉桂、白芍；头晕，加蔓荆子、川芎；吐酸水，加白芍、倍加茯苓；饱满，加枳壳。六君者，参、苓、术、草加半夏、陈皮也。

倪涵初先生治疟三方 第一方 陈皮、半夏姜汁煮、茯苓、威灵仙各一钱，苍术木醋汁浸炒，厚朴姜汁拌炒、柴胡、黄芩各五分，青皮、槟榔各八分，炙草一分，姜一片，井水、河水各一碗，煎一碗，饥时服。如头痛，加白芷一钱。此方连服一二剂即愈，可勿再药。若未能愈，必用第二方，少则三剂，多则五剂而已。

第二方 牛何首乌一钱，陈皮、柴胡、茯苓、黄芩各八分，白术、当归、威灵仙各一钱，知母、枳实醋炒、各一钱，炙草五分，姜一片，井、河水各一碗，无灰酒五分，再煎一滚，空心服，二煎并服。

第三方 人参一钱，黄芪炙、一钱五分，当归、白术各一钱，陈皮、柴胡各八分，炙草一分，升麻四分，何首乌一钱，知母炒、麦芽各一钱，姜一片，乌枣一枚，水二碗、煎一碗。饥时服用。五剂，元气充足，永不发矣。方虽有三，第一实为主方。既不刻削，亦可峻补，功独归之。第二方专为有家^①而设，贫家安得有参？多服第二

① 此：此前原行“一”字，据《宁坤秘籍》下卷《山阴倪涵初治疟奇效三方》“第一方”条删。

② 有家：《宁坤秘籍》下卷《山阴倪涵初治疟奇效三方》作“有力者”。

方可也。

凡言人参即党参也，贫家安得有人参，因言通参。

心嘈 似饥非饥，似痛不痛，其症或兼暖气，或兼痞满，或兼恶心，是痰因火动，有积、有热也。治法以南星、半夏、橘红之类消其痰，以芩、连、梔子、石膏、知母之类降其火，以苍术、白术、芍药之类健脾行湿，壮其本元则安。

五更心嘈者，思虑伤心，血虚也。宜当归补血汤、六君、四物加麦冬、梔子、熟地、炒米、大枣、乌梅。

懊恼 乃虚烦之剧者，治同心嘈。

噎膈 治宜安养心神，调治脾胃。

凡酒食中毒，宜正坐仰人，呵出酒食嗜饱之气，立饥且醋。五味淡薄，令人神爽。每食讫，以手摩面及腹数遍，又行步踆踆，则食易消。

小便色 小便黄者，小腹中有热也。肝热尿者，小便先黄。下焦无血，小便涩数而黄。小便不禁，赤者有热，白者气虚。

小便不利有三 若大便泄泻而津液涩少者，宜利而已。若热搏下焦而津液不能行者，必渗泻。若脾胃气涩，不能通调水道，下输膀胱而化者，可散气令施化而出，宜用茯苓琥珀散。泽泻一两，滑石七钱，赤苓、白术、琥珀、猪苓各五钱，肉桂、炙草各二钱，为末。每服二钱，以长流水下，以美食压之。

渴而小便不通者，热在上焦气分，宜清肺散。用猪苓、通草各一钱半，茯苓、泽泻、灯心、车前子各一钱，枳壳、木通、瞿麦各七分，琥珀五分，空心的服。

不渴而小便不通者，热在下焦血分也，用滋肾丸。黄柏、知母各一钱，熟地、肉桂各一钱，为末，丸梧子大，空心白汤下百丸。

小便不通，脐下状如覆碗，痛闷难堪，治法有二。如气能化而水不通，用陈皮、茯苓、调木香、沉香末，空心服。如血污于下而水不通，则用桃仁承气之类。热则不通，冷则不禁。其热甚者，小便闭而绝无；其热微者，小便难而仅有。

小便不通，乃血涩致气不通而窍涩，宜赤苓一钱半，黄柏一钱，滑石、知母、泽泻各一钱，灯心一钱，空心煎服。又宜五苓、导赤等。

癃闭宜吐。有气虚，有血虚，有实热，有痰气闭塞，皆宜吐。

癃闭实热宜泻之，用八正散。用人参、木通、瞿麦、枳壳、滑石、栀子、车前子、甘草各一钱，灯心一钱，空心煎服。有转侧转抱，脐下急痛，小便不通，每欲尿时痛不可言，大便亦里急，重，似疝非疝，必以手按脐下，庶可立

出小便。治法用凉药疏利小^①，肠中热，仍与甜人汤，治其腹中搅痛，大便下，则尿肠随即自正，小便自然顺流。用四物汤加入参、白术、半夏、陈皮、甘草、生姜、空心煎服，随以指探^②中，吐出凉汁，七八贴乃安。又方用黑石、寒水石、葵子各一两，加水曲、车前子各二钱，煎服，仍用阴阳熨法。

阴阳熨法 治肠转、小腹痛及二便不通。先以冷物熨小腹几次后，以热物熨如前数，又以冷物熨之，自通。又生姜、葱白、紫苏叶各一握，煎浓汤，重洗小腹、外肾、肚白等处，再温再洗，拭干，于绳被仰坐于脐；次用赤芍、白芍、葵子煎汤，调苏合丸并青盐末五分，空心温服。

小便难，小腹^③胀，不急治，杀人。急用葱白一斤，切，炒热，以帕子包，分两裹，更替熨脐下，即通。又炒盐白，煮盛熨脐下，亦通。产时尿脬运动不利或平时忍小便以致不通者，产后小便不通，腹胀如鼓，用盐填脐中，葱白半斤，细切，厚铺盐上，用艾叶灶火灸之，觉热气直入腹内，即通，神效。

转脬失救则死，以甘遂末水调敷脐下，内以甘草节煎汤饮之，及药汁至脐，二药相反，脬自转矣。此方神妙，

① 小：原作“中”，据《杂病广要·脏腑类·小便不通》“转胞”条改。

② 腹：《类方证治准绳》第六册《小便不通》“葱熨法”条作“肠”。

但二药须两人各买，不可一处置，不令二药相见，乃效。曾记二十前，予偕友人行至药店门首，友言耳忽暴聩，予即买甘遂一文，代塞耳中。散时，令其自买甘草一文，晚间煎服，不可用手取耳中药，明日果通。始信古方之神也！

小便不禁能令人卒死 用菟丝子酒洗，韭子炒，益智仁、茴香炒、蛇床子各一两，为末，酒糊丸，糯米汤下七十丸。按：若系虚人、老人，似宜十个人补加减。

赤白浊 小便澄下，或如膏糊，或如米泔，或如赤脓，皆湿热也。有实有虚，赤属血，白属气。脾有虚热而肾不足，土邪上水也，与痢疾、带下同治。治法宜燮理降火，兼升举之。用一陈、一术、一升、一柴、一芍。瘦人是虚火，四物加知柏此宜。用一胃气下陷，宜补中益气。又方，四君子汤合五苓。

尿如米泔色 木通、滑石、黄柏、赤苓、生地、栀子、甘草稍各一钱，枳壳炒、白术各五分，煎服。

洩出白液小腹痛 肉苁蓉、白苓、黄芪、牡蛎、当归、龙骨、五味子，等分，蜜丸服。

解诸郁 药店內买越鞠丸，又名芎朮丸。温水下二钱，治愿欲不遂，久病不愈者。越音麦。

治湿 薏米一斗，磨粉，日日服之。湿病禁汗、下及灸。

暑病 宜用温脾、消食、治湿、利小便之药。

湿病 湿在经，则日晡发热、鼻塞；在关节，则一身尽痛；在脏腑，则当泄而大便澀，小便反澀，腹或胀满，湿热搏则遍身黄。西北人多内湿，东南人多外湿。

风湿相搏，一身尽痛，法当汗出而解，值大阴而不止。苍术、白术各一钱，羌活一钱半，防风、升麻、柴胡各一钱，煎服。

寒湿 尿清不渴，为寒湿，身体重着，如坐水中，小便澀，大便利。赤苓、炮姜各一钱，苍术、白术、甘草各一钱，橘红、丁香各五分；加姜一片，枣一枚，去核，煎服。

湿热 尿赤有渴，为热湿，用单苍术丸或二妙丸。

湿温 两胫逆冷，胸腹满，多汗，头痛，妄言，其脉阳满而弱，阴小而急。治在太阳，不可发汗，苍术白虎汤、人参白虎汤。湿病与中暑同，但身凉不渴耳。赤苓、白术、干姜、泽泻、桂心、甘草各一钱，煎服。此方治冒暑遭雨，或入浴晕倒等，故用姜、桂。

破伤人水、口噤、身强直，牡蛎煨为末，每一钱，甘草汤服。又取调敷疮口。

湿病多身痛暑病无身痛 治法大约宜发微汗，及利小便。用防己黄芪、五苓、平胃、二陈等。上焦加羌、芎、苍术，下焦湿加防己、木通、滑石，以桑白皮为主。

口疮 凡口疮无问新久，夜卧将白已散丸，以手左右交揉五十遍，睡觉行之，三五度即痊。日日行之，可除痼痛。

齿 凡暑毒、酒毒，多伏于口齿之间，宜时时漱洗晨起，以盐漱口，吐出，洗眼光明，而无齿疾。齿宜常叩。

卧 胃不和则卧不安，人卧则魂归于肝。治离魂症，用人参、龙肉、赤苓、朱砂各一钱，临卧煎服。离魂者，一人如两人也。

辟恶梦 每夜卧时，念“婆珊婆演帝”七遍。勿说梦，则吉。

渴 治渴当泄膀胱之热，用五苓散或白虎汤。花粉宜斟酌，勿轻用。

呕 呕宜多服生姜。半夏、竹茹、陈皮、藿香等，又柴胡汤。

小儿骨蒸潮热食减瘦弱 秦艽甘草薄荷汤

厥症多是火病。若寒厥，手足必青，饮水必吐，腹必痛，喜火熨之。若热厥，手足虽寒而不青紫，饮水不吐，熨火则腹必加疼。辨症清而用药神矣。

治病必先辨清内伤外感、气血寒热虚实、阳虚阴虚各症，又必辨药之寒热温凉、补泻禁忌。

凡入疫房热病之家，皆当防其毒气传染，先须饮酒而入。不饮酒者，以雄黄津唾抹鼻内及人中。又水缸内用生矾打清去秽，脚以降香浸入。又以活贯众浸水，不染疫也。雄黄最妙。

大头瘟初起，状如伤寒，五七日杀人。其候发于鼻面

项咽，赤肿无头，结核，咽联闭塞，狸头瘟、戴眼瘟、明
 蝎瘟^①，^②表证多者，荆防败毒散；里证^③多
 者，防风通圣散加玄参、牛蒡子。宜日用嚏药五七次，嚏
 出毒气此是妙法，普济消毒饮神效。

瘟疫 寒证^④不时，人多疾疫。众人焉^⑤服者，是行时
 疫。治有三法，宜补，宜散，宜降。

治法切不可作伤寒正治，但当用少剂，随明^⑥三经为
 少阳用小柴胡汤，半夏、人参、黄芩、甘草、姜、枣也；
 阳明升麻葛根汤，升麻、葛根、芍药、甘草也；加战^⑦，
 之一温病初起用败毒散，茯苓、甘草、枳壳、桔梗、柴
 胡、前胡、羌活、独活、川芎、薄荷、生姜也。加制升、
 防风名荆防败毒；加人参名人参败毒。暑湿热^⑧气及春秋
 时气病、疟痢，并可治之。

四时治法，春发温疫，宜葛根一^⑨芩汤，葛根^⑩一钱，麻
 黄六分，黄芩二钱，芍药一钱，桔梗一钱，甘草六分，姜、
 枣煎服。夏发燥疫，宜调中汤，人黄^⑪一钱，黄芩、白芍、
 葛根、桔梗、赤芍、白术、厚朴、甘草各一钱，煎服。秋
 发寒疫，宜苍术白朮汤，用苍术、白朮、麻母、甘草、
 粳米。冬发温疫，宜甘桔汤，甘草、桔梗。

风湿、湿温、疫疔流行，不问阴阳表里，通治连服为
 妙，名各散子。草豆蔻散，猪苓、石菖蒲、赤芍、良姜、

① 证：原作“症”，据文义改。

② 根：原作“肌”，据方后药物组成改。

独活、赤芍、附子、麻黄、厚朴、藁本、枳壳、柴胡、泽泻、细辛、防风、白术、藿香、半夏、吴茱萸、苍术、甘草各五分，姜、枣煎服。半朝煮一釜，老幼各饮一杯，则时气不入。

通治四时瘟疫，神授香苏散：香附一钱，苏叶一钱半，陈皮一钱，甘草一钱，苍术各一钱，姜三片，葱白一茎，煎服。此神方也，每人一碗可预防。

苏合香丸最辟瘟，宜用绛囊盛三丸，当心带之。又浸酒饮之。

疫疔发黄，杀人最急，用茵陈、人黄、梔子煎服。又用瓜蒂一钱，丁香一钱，赤小豆半钱，黍米四十九粒，为末，水先煮水一斗，却于内草孔捣，滴出黄水愈。

伤寒十劝：伤寒头痛身热，不可投热药。
热药

伤寒当直攻毒气，不可补益。毒气流脏，多致杀人。

伤寒不思饮食，不可服温脾胃药。

伤寒腹满，亦有热证，不可轻服温暖药。

是热毒

伤寒自利，当看阴阳证，不可倒服温暖及止泻药。利，惟身不热，手足冷者，属太阴；身冷四逆者，属少阴、厥阴外，其余身热下利者，皆是阳证，不可用热药。

伤寒胸膈痞及腹痛，不可妄用艾灸。
不可艾灸

伤寒手足厥冷，当看阴阳，不可一例作阴证。

热药。

伤寒病已在里，即不可用药发汗。

伤寒饮^①水为欲愈，不可令病人恣饮过度。

伤寒病初愈，不可过饱及饮酒，食羊肉，行房事。

伤寒^②差^③，但少吃粥，不得梳头洗面，不得多言、劳心费力。忌食羊、鸡、鱼、酒^④、猪^⑤、骨^⑥汁、饼^⑦面、白^⑧脯，犯则复发。

湿病忌汗、忌下及灸。

水肿最忌盐，尤忌针刺，犯之流水而死。忌用甘药助湿作满。

嗽病反水忌盐。

消渴忌服膏粱、芳草、石药，忌房劳、饮酒、咸食、面食、辛热物，又大忌半夏、南星燥剂。百日以上不可针灸，令疮中出脓水不止而死。

眼病忌鸡、鱼、酒、面、糯米，咸酸诸般毒物。不忌口，药亦无功。

耳病忌酒、面、鸡、猪助热之物。

虫病，凡取虫，作药之法，禁声，勿语道作药，则虫当闻^⑨便不^⑩动。半月虫头向上，易治，先以肉汁及糖蜜食下，则虫头向上，乃用药。

① 饮：原脱，据《太平惠民和剂局方》卷中《伤寒十动》补。

② 猪：《太平惠民和剂局方》卷中《伤寒十动》作“诸”。

③ 当闻：原脱，据《备急千金要方》卷十八《九虫》补。

疔疾大忌饱食，疔发时，切不可带热饮食，切忌猪肉必止发也。服药当于未发前两¹时，或发日清早空心，大忌发时服药，药力深苦。节饮食，避风寒，远酒色，慎起居，无有不愈。

疔风诸症，忌酸咸、鱼腥、面酱、酒醋等，肉亦助火，但可²量吃。

诸痛忌补气药。按：虚痛又宜大补。

血疔忌多食咸。又曰：久视伤血，凡血少、血虚之人，针刺出血无多，皆忌。

自汗、多汗，大忌生姜。凡辛辣之味，并忌食。冬月不宜多出汗，自汗、盗汗诸汗，通用黄芪汤、牡蛎散、补中益气汤、双和汤。

脚气病一忌嗔怒，一忌大语，一忌露足、当风入水。夏月，常须着绵袜，冬倍令暖。凡饮食之后，暖行百步。每朝早饭饱食，午饭少食、夜饭不食弥佳。忌房事、酒面、牛羊鱼肉、葱韭蒜、蒜菜、酥油、猪鸡鸭鸭，又最忌热药蒸泡。

疔病非断房事、慎厚味，不可用药。

疔疮忌生冷使物、酒醋面、五味辛热、姜桂、鸡肉、荞麦、冷药、房劳。

小便闭塞，人参、葶子各一钱，白果一钱，茯苓一钱，

1 两：原作“雨”，据《杂病广要·外因类·疔》“服药节度”改。

2 但可：原脱，据《医字入门·外集·疔风》补。

甘草一钱，车前子、王不留行各一钱，肉桂一分，煎服。此方，膀胱就必得心包络之气下行，而水路乃能出也。又方，车前子五钱，肉桂三分，煎服，即通。

大便秘，肺气燥，熟地、玄参各二钱，杏仁一钱，升麻二钱，煎，牛乳一碗，冲服。

温病者，其脉如干，身无汗但热，骨节烦痛，时时咳嗽，用白芍加桂枝多。无热而重者，小柴胡多；先时热者，小柴胡加桂枝多；多寒但重者，柴胡桂姜汤。然虽多寒，其脉或洪实，或洪滑，此实热也，忌用桂枝；风重多，其脉或寸浮，或弦滑，此亦阳证，忌用白芍。

麻木 夏月两手麻木困怠，用芍、芪、白芍、升麻、五味子、牛膝各一钱，炙甘草一分，煎服，日三四次，麻处频擦摩、曲伸之。

有目头麻至心而死者，有目是心麻至背脊而死者，急用人粪烧灰，以粥浆调饮，即止。又方，用椰子烧灰为末，每服五钱，酒调下，即止。

发狂见鬼者，正气虚而邪犯之也。人参一两，白术两，半夏三钱，南星三钱，附子一钱，大剂灌之。

中风不语，或倒不知人，或目下跌床下，气未已，热已。人参一两，南星一钱，生半夏一钱，生附子一分，煎，大剂灌之。

D 各：原脱，据文义补。

中风宜分虚实闭脱 真正中风，平日自然壮盛，不畏寒热之人，既中之后，双目突出，手足乱舞，痰如黄结成块，大小便闭而不通，不言语者，用玉蒂散、皂角汤吐之。去。用玉蒂散^①，或皂角^②，以水煎汤，吐之。此中上焦，故用小治之法。

中风若安静，平日人衰弱，平日之时，气息如无，大小便自遗，手撒眼闭，唇白，作声喘急不十分响者，乃气虚而脱是也。痰：闭宜苏合丸或紫金锭，既醒后，参汤加南星、半夏。似非大剂，难于取效。

中蛇虫之毒卒倒，身必直挺，舌必外出，眼必开一缝是也。用雄黄^③，研末，水飞净，取水用之，而不用雄黄。加食盐少许，入滚水一碗，煎之。以鹅翎探之吐之，必吐，恶虫自愈。后用人参茯苓甘草白芷汤煎之，还用高。中恶中毒者，紫金锭乃祛痰之圣药也，怪病多由于痰。

远年头风，时痛发者，用手指按摸头上，有一处按着更疼痛者，以笔点之，用磁器^④，去头是圆，研末，安于点记痛处，盖以小幌纸，用包头扎好，过夜起一小泡，以针刺出黄水，立效。

① 玉蒂散（tǎo 涛）：叩、击。《验方新编》卷十七《头面部·远年头风》作“指”

眼中翳^①肉 蛇蛻一条，以麻油炒黄不可焦，加绿豆合，以水一碗，沙糖一碗，煎七分，食远服，立退。

鹅掌风癬 雄黄、甲片，火烧重之。又以醋调汁水，洗手一月。

眼下空处，生疔出脓，日久成漏，以柿饼去皮取肉，捣涂之，十日全愈。

眼内起星 凡胡椒、甘草、橘皮、菊叶、木鼈之类皆可，杵烂，绵裹塞鼻中，几次愈。

凡大人、小儿，其肚皮忽然青黑色，此败症也，急用大青煨燥研末，每服一钱半，酒调下，黑退即愈。

耳窍出血不止，用炒甲片与白芷研细，掩之，即止，再服补血汤。

凡男妇受水湿之气，其指麻木酸痛，取蚯蚓和银朱捣，擦之。

脚跟有一孔，有水流出，大痛。以人中白，股研掺^②之。

脚气攻注，急取大田螺数个，捣放两股上，便觉冷

① 翳：原作“努”，据《串雅内外编》卷一《截药内治门》“截”。

② 掺：余抺。《集韵·覃韵》：“掺，掺搓，拍也。”《类篇·手部》：“掺，拭也。”《本草纲目·十部·百草霜》“齿缝出血”注：“百草霜掺之，立止。”

③ 两：此后原衍“足”字，据《本草纲目·介部·田螺》引《樗史》“脚气攻注”条删。

趋至足¹而安。

沙木腿肿，以杉木屑煎浓汤，日日浸洗，自愈。
肿，宜用杉木屑。

凡行远路，脚底起泡²，水调生面涂之，一夜即平，
面至鱼池。又炒萝卜子末、白矾末二味，铺于鞋底上，行
远路能不痛。

小肠疝气 荞麦面四两，葫芦巴四两，酒浸，晒干，勿炒，
小茴香炒，一两，为末，酒糊为丸梧子大，每服一钱，盐汤
空心下，两月效。

诸疝初起 发寒热疼痛，欲成囊痛者，用鲜地骨皮即
枸杞子根皮一两，麦各四两，捣如泥，以绢包于囊上，其痒异
常，一夕即消。

黄门累肿，用箭壳蛭蛭，捣碎涂之，即消，内服防风
通圣散。

湿热白浊 以六一散，开水调服二钱。
小儿白。

小儿尿如米汁，以六一散，调服一钱半，立效。

小便不通，取二四年陈麦柴一把，水煎服。又慈米了
根捣汁，酒冲服。

小便出血，用管大猪，以淡豆豉五钱，煎汤服。

1 足：原作“踵”，据《本草纲目·介部·田螺》引《埤史》“脚气攻
注”条改。

2 泡：此后原衍“丁”字，据《本草纲目·谷部·小麦》。

因受挫气，以番葡萄名^①：至葡萄，一两，好酒煎服，日
 又法，以硼砂研极细，点眼睛四角，立愈。
 王不留行一钱二分，炒，研末，酒调下，立效。

人视一物如见有二物，凡物皆然，食麦米醋数日，
 即愈。

口旁节次出血，不出则口鼻眼目俱胀合，以生姜汁并
 水各二盏，服之。

燥然手足心齐凸伸硬，以花椒、盐、醋，敷之。

大肠头^②出，急用芝麻油盛盆内，以臀坐之，再点火^③
 麻子汁数升。

大腹上麻痹不仁，多煮葱白，食之。

膈气不通饮食开关秘方 荔枝一枚大者，将壳去，
 放在荔枝肉内，再挖好冰片一钱，贴于上，即将荔枝肉裹
 好，仍放壳内，以线扎好，令病人含口内，有冷涎水出
 出，徐徐咽下，一时许，即当化完，无水渗出，即令吐
 弃，可进饮食矣。

腹中有物正如石，痛如刺，生肌散，酒浸，煎服。

眼目障翳 胡椒一两，盐三钱，真月毛一钱，冰片各一钱，
 铜杓急炒收之，每点少许。

疯狗咬伤，将狗唇内肉咬下，贴于患处，和酒调，伤

① 瑯（suǒ 琐）瑯葡萄：即琐瑯葡萄。《本草纲目·果部·葡萄》：“西边有琐瑯葡萄，大如五味子而无核。”

② 头：原作“掩”，据《万病回春》卷八《奇病》改。

③ 火：原作“天”，据《万病回春》卷八《奇病》改。

处，一日三换，三日即愈。

无名肿毒 活鲫鱼，生山药同捣烂，敷之，即愈。

春温症辨 凡春时及夏至以前，有发热口渴，不恶寒者，为春温。其症头项痛，腰脊强，脉浮，必须认清，不可误。口渴，不恶寒，切忌发汗，宜用柴葛解肌汤。芍药、黄芩、白芷、羌活、甘草、石膏、桔梗、姜、枣等，及萎蕤、柴胡等汤若是。

风温加薄荷、牛蒡、紫苏、荆、防等，切忌用发汗及苦寒之药。

痘烂遍身无皮，用茶叶拣去粗梗，入滚水一漂，即捞起，再拣去梗，湿铺床上，用草纸盖一层，令儿睡一夜，则脓皆干。

疔疮生蛆，经霜桑叶、野薄荷，煎汤洗之，其蛆自去。或先用艾条熏之，后以紫苏、甘草煎汤洗之。禁用雄黄、矾石等药。

一切毒没汗，或汤火等证，及疮毒不能生肌收斂，用当归、生地各一两，入好油二斤，煎，去渣，入黄蜡二斤，熔化成膏，贴之。

一切疮疡溃烂疼痛 乳香、没药各二钱，醋炒一钱，冰片为末，搽上痛止。

1. 搽：原作“熨”。据《幼科证治准绳》集之六《痘疹》“秘传茶叶方”条改。

疔疮疔^①或凹凸肉起，用韶粉^②、轻粉、乳香为末，猪骨髓熬膏，敷之，名减癰散。

疔痒成疮，用败草散治之^③，或加^④，或再加别药。

治一切内伤外感，参苏饮 人参、紫苏、前胡、半夏、葛根、茯苓、陈皮、枳壳、甘草、桔梗、木香、姜、枣，煎服，或前方去参、前加芍、柴治之，或用香附、苏叶、橘红、甘草、姜、葱治之。

一切风寒，神白散 白芷、石膏、淡豉、生姜、葱白，煎服取汁。若遍身疼痛，似可加用羌 防

逍遥散 散郁调经，肝伤血少之圣药 柴胡、当归、白芍、白芍、白术、茯苓、炙草、薄荷、煨姜，煎服。加丹皮、梔子名八味逍遥散。

辨 脉

切脉宜究精微，此特举其大略，盖为不能诊脉者粗言之也

脉部位 左寸心与包络；左关肝与胆；左尺肾与膀胱、大肠 右寸肺与脾中；右关脾胃；右尺 焦、命门、

① 癰：皮肤上生的斑点。《本草纲目·谷部·大豆豉》：“下气调中，治伤寒、温毒、发癰、呕逆。”

② 韶粉：即铅粉，又称胡粉、朝粉。古为辰州（今湖南沅陵），韶州（今广东韶关）专造。

③ 墙：原作“墙”，据《世医得效方·小方科·疹疮》“败草散”条改。

小肠。

下指轻重 持脉如 菽之重，与皮毛相得者，肺部也；如六菽之重，与血脉相得者，心部也；如九菽之重，与肌肉相得者，脾部也；如十二菽之重，与筋平者，肝部也；按之至骨，举指来疾者，肾部也。轻手得之为浮，为表病；重手得之为沉，为里病。

呼吸辨寒热脏腑之病 凡人一呼脉三至，一吸脉亦三至，为平焉。若一呼一吸脉来六至，则为迟，迟则为寒病在脏。若一呼一吸脉来六至，则为数，数则为热病在腑。

滑涩二脉 往来流利，如盘走珠之象为滑，乃气实而血盛之候。往来艰涩，动不流利，乃气血俱虚。更有弦脉，按之不移，硬如弓弦，为气血不和，肝强脾弱，左弦甚，土必败。

虚实辨脉 虚者，正气虚也，无力也。但指下无神者，总是虚脉。浮而无力为血虚，沉而无力为气虚，数而无力为阳虚，迟而无力为阴虚。阴虚则金水亏残，阳虚则火土受伤。脉无力，即无神。实者，邪气实也，举按皆强，鼓动有力。

胃气为本 脉以胃气为本，是有胃气。于邪脉中，得兼软滑徐和之象者，有胃气也。有力即为有神。

诊脉法 先每部诊之，又合六部诊之。凡见独大者

① 沾：原作“沾”，据《痰火点雪》卷三《痰火脉》“涩脉”改。

② 涩：原作“滑”，据《痰火点雪》卷三《痰火脉》“涩脉”改。

病，独小者病，独疾者病，独迟者病，独热者病，独寒者病，独陷下者病。①又如脉见洪者皆是心脉，见弦者皆是肝脉，见浮皆是肺脉，见缓者皆是脾脉，见沉皆是肾脉。五脏之中，各有五脉，五脉互见而有独乖②者病。乖而强者，即本脏之有余；乖而弱者，即脏气之不足。此脏气之独也。

水肿，遍身浮肿，③，大腹皮④、茯苓皮、桑白皮、陈皮各一钱半，姜皮八分，水煎服。如腰以上肿，宜发汗，加紫苏、秦艽、羌活、防风；腰以下肿，宜利小便，加赤小豆、泽泻、车前、葶藶、防己。大便不通，宜下之，加大黄、枳实。腹中胀满，加萝卜子、厚朴、陈皮、山楂、麦芽。虚者，加参、术、茯苓。若湖水，加附子、干姜、肉桂；河水，加羌活、黄柏、黄芩。扶饮者，加半夏、生姜，忌甘满及咸。既消之后，宜用理中汤健脾实胃，或以金匮丸暖命门，或六味加牛膝、车前清热，庶收全功。

治箭风⑤，甲片一钱，以研，白芷一钱，泽泻一钱，好酒煎服。

疮毒脓腐尽，用此掺上，平口收功，名生肌八宝丹。煨石膏⑥，珍珠母⑦，大蚌，拾取壳内者十片，刮去背内黑衣，安火上煨，研细，加甘石⑧，以真连⑨钱半汁，蜜拌研细，⑩。

① 下：原脱，据《医学心悟》卷三《水肿》“五皮饮”补。

② 乱：原作“括”，据《医方易简》卷五“生肌八宝散”改。

钱，儿茶一两，赤石脂一两，煨，陈年丝叶香一两，煨存性，冰片同用，凡凡五钱，用冰片一分，研无声，如香灰式，瓷瓶收藏，神效。

跌仆擦伤、齿疔连疔、钉鞋打伤、刀伤挫跌，红赤皮无，潮湿等，用广东千皮金纸一张，剪刀剪取，将全面贴伤处，一宿即愈，神妙。

黄疸腹胀 青黛一分，煨去石灰，生矾五分六厘，一味研细，分作七服包开，每早空心，用鸡蛋一个，去黄汤等，调送一服，药完病愈，亦奇方也。

千锤膏治一切头疔毒，麻油一两，以油麻仁四十粒，及并下为散料，不用器煎，松香半斤，以桑叶与日，晒干，铜绿一两，白芷、猪胆汁二钱，先将松香焙化，乃下麻油、胆汁、铜绿熬匀，捣千余下，再烘烘倾入水，用手一按百余下，油纸摊贴，拔毒妙。

相舌辨症法 白胎者，邪火未盛也，用小柴胡汤

舌黄色，心热也，黄连一梔子一钱而带灰色，胃热也，用石膏、知母 黄而淡红者，小肠、膀胱热也，用梔子 红而白者，肺热也，用黄芩、苏叶 舌黑而带红者，

① 冰：原作“水”，据此用法前药名“冰片”改。

② 剪：原作“煎”，《本草纲目拾遗》卷九《器用部》“皮金纸”作“剪”，日同“剪”，据改。

③ 蟾：原作“瘡”，据《卫生鸿宝》卷二“千锤绿云膏”条改。蟾：由蟾，或蚺蟾，即蚯蚓。

④ 手：原作“水”，据《卫生鸿宝》卷二“千锤绿云膏”条改。

肾虚而挟邪也，用生地、玄参、柴胡。舌红而有黑星者，胃热极也，用石膏。舌红而有白星者，心有邪也，用柴胡、黄连。舌红而有大红点者，胃热而带湿也，用茵陈五苓散；肉桂止可用一二分，不可多人。白而带黑星，亦胃热也，用石膏。舌黄而有黑者，肝经实热，用柴胡、梔子。舌白而黄者，邪入脾也，用柴胡、梔子。舌中白而外黄者，邪入大肠也，用五苓散。舌黄而外白者，邪在内而不在外，邪在上而不在下也，用天水散加柴胡。枳壳或五苓散亦可。根黄而尖白者，胃热而带湿也，用石膏、猪苓、泽泻。黄而陷一陷一陷者，邪湿已入大肠，急用大黄。茵陈下之。舌有红中如虫蚀者，水未升而火未乘也，用柴胡、黄连。红而开裂如人手者，邪初入心也，用石膏、黄连。根黑而尖带红者，肾有邪未散也，用柴胡、梔子。根黑而尖白者，火乘肾也，用石膏、知母、玄参以解之，不必问其渴与不渴、利与不利也。根黑而尖黄者，邪将入肾也，用手按之腹痛而手不可近者，急用大黄下之，否则用柴胡、梔子。纯红而尖独黑者，肾虚而邪火未乘也，用玄参、西，不可用石膏也。中心红而四边旁地黑者，君相火炎也，急用大黄、生地、玄参救之。中央灰色而四边微红者，邪结大肠也，下之即愈，不立则死，邪下以生地补之。中间独两星黑者，邪将入肾也，用玄参、芍药加柴胡。外红而内黑者，火极似水也，用柴胡、梔子、大黄、枳实；若又见刺，则火亢之极矣。

总之，内黑而外白，内黑而外黄，皆前症也，与上同治，上中可生四五。惟舌中淡黑，而外或淡红或淡白，内或淡黄者，较前少轻，俱可以前药治之，上中可生八九。凡舌有纯红而露黑纹数条者，此水未乘火，乃阴症也，其舌胎必滑，必恶寒，水下咽必吐。至纯黑之舌，乃水极似火，火极似水，俱不可治。

论气色 面上之两眉心以候肺^①也，红则火，青则风，黄则湿，白则寒，黑则痛也。眼之中为明堂，以候心。明堂之下，在鼻之中，以候肝。肝之两旁，以候胆。鼻之尖上，以候脾。鼻尖两旁，以候胃。两颧之上，以候肾。肾位之上，以候大肠。肝胆位下，鼻之两旁，以候小肠。肺之上为印，以候胃候。人中为承浆，以候膀胱。五色之见，各出于本部，可据五色以断病，一如肺经之法。上焦寄于肺，中焦寄肝，下焦寄膀胱。

色要有神，色黄而有光彩是也。

劝种痘说 此集初成，本无此片，畏其烦也。友言痘症险恶，然而人人所有，不能避也，勉劝增之，以便出痘之家一见心宽莫措，爰略举其凡。但方症虽存，奉劝爱惜儿女之家，及儿一岁时，早为种痘无论，避其险毒矣。即早为之，节饮食，慎起居，择天时，避寒暑，痘已善矣，病已快矣，人已逸矣。自种痘之法一开，实起天下万

① 肺：原作“膝”，据《石室秘录》卷五“六论气色”条改。

② 肾：原作“二”，据《石室秘录·伤寒相舌秘法·六论气色》改。

世儿女于水火而衽席¹之矣。劝人早为儿女种之，请看后方，可知痘疹之险毒矣。

痘疾方 半夏、贝母、苍术、陈皮各二两，南星、槟榔、厚朴各一两，细辛、丁香、甘草各五钱，雄黄一两。五月五日，于净室焚香，用陈泥、神曲、麦汁为丸，勿入阴人手中，麦茶汤空心服下。大人用一钱，小儿八分，神效。

痘母痞块 人参一钱，茯苓、茯苓、白术、白芍、归身各二钱，陈皮一钱，枳壳一钱，枳实、一枝各六分，熟地一钱，甘草四分，水煎，早晚服。外用贴万通膏，无无效者。

万通膏末药方 肉桂一钱，当归、木香、五加皮、木瓜各四钱，川芎一钱，菖蒲一钱，公丁香七个，檀香五分，共为末，瓶收，勿泄气。用时加一匙于膏药上，贴患处。此膏治五劳七伤，筋骨疼痛，脱气，心腹痛，痞块疔母，头风，崩带，梦遗，疝痛，疔母，跌打损伤切诸症。

童子癆神方 人龙胆或虫干一条，使君子、九卜子、勿令黑色、白术、红枣不裂皮者二十个，去皮核，萝卜子一钱半，枳、白术、熟地五钱，老母，藕粉一两，川连六分，酒

¹ 衽席：卧席，借指太平安居的生活。《大戴礼记·主言》：“是故明主之守也，必折冲乎千里之外；其征也，衽席之上还师。”

砂，土为末，杵丸如梧子大，每早白汤送下七粒，逐日加增一粒，加至廿一粒为止，以后只服廿一粒，一料全愈。

喉蛾方 蒜头、轻粉各一味捣，放入拇指背窝内，扎好，交臂试去，如蛾生左边，放于右指上，如蛾生右边，放于左指上，双蛾双效，有炭则吐之。

牙痛灸法 用蒜头并轻粉各一钱，同捣，以两手指交叉，在大指尽处是穴，用瓦壳装药，盖好扎住，男左女右，少顷微觉其辣，即便揭去，随起一泡，立时痛止，终身不发，神方也！

凡男妇大小，筋骨骨间忽如火热，肿硬如石，痛不可忍者，急用糯米煮饭，少加食盐，葱管共捣烂，过宿即松，一二次即愈。其饭煮熟倾鱼池，与鱼食乃效。

手丫³枝痛，以通草屑为末，鸡子清调涂。

治九道出血方 人参、川芎、当归、荆芥、白茅根，煎服。

断乳奇法 山柰、辰砂、麝香、雄黄、雌黄各一，轻粉一，白木。待儿睡熟，用麻油调搽两眉毛上，即不思乳。按：仍以墨盖黑为妥。

四物汤 熟地、当归、川芎、白芍，以风血片头

痛，春倍加，芍药和血理气，治腹中疼痛，夏倍加，当归和血，如血刺痛如刀割，非此不能除，冬乃倍加。各一钱，煎服，治一切血虚。加生姜、薄荷，或加茱萸，神妙。加延胡、槟榔、川楝子、木香，名八物汤，治经行脐腹绞痛。加参、苓、术、草，名八珍汤。

用药须知所忌 寒热虚实，稍有乖謬，死生反掌。但人习用，往往不解某症当去某药，犯其所忌，致病转增。即如肉桂，要药也，是冷者似亦宜之，而不知肺经热甚则气不下行，亦能是冷，若见是冷而用桂，岂不杀人？又如六一散，夏月常用也，而不知石膏之性渗泄重降，病有当发表者服之，必陷内而成败症，不特脾虚下陷者所当忌也。略举数条，俾知当慎。

人以脾胃为本，苦寒伤胃，滑利伤脾，如龙胆、山豆根、芩、连、三母、枳、瞿麦、连翘、枳实、玄参、大力子、天麦冬、瓜蒌、花粉、生地、金铃、荆沥、石膏、煨、梨子、厚朴，脾胃虚者忌之。

辛香之品，伐气耗血，如香附、白芷、青陈皮、生姜、吴萸、槟榔、大腹、砂仁、木香、菖蒲、威灵仙、益智、白芷、薄荷、香薷、紫苏、防风、诃子、旋覆、茱萸子、苏合丸之类，元气虚者少用。

又如羌独活、白前、延胡、姜黄、蔓荆、石膏等，血虚少用。又如升麻、柴胡、川芎、干姜、吴萸、杏仁、川胡椒、郁金、葛根、藿香、紫菀、青黛、杜、附、芥子、

沉香、藜蘆、故紙等，阴虚忌之。又肾虚忌白朮、车前、泽泻、麦芽等。又虚寒勿用丹皮、全蝎、地骨等，虚火勿用射干、大黄、黄柏、槐子等。又淡渗之品，亡津伤阴，如猪苓、泽泻、琥珀、茯苓等，津液不足，肝肾阴虚者忌之。又如半夏、南星等，大燥血液，渴家、汗家、亡血均忌。又如苍术燥结，多汗者忌。与皮气虚，有汗者忌。麻黄，于冬月及在表，非真有寒邪，则忌。丹溪用麻黄，必以人参监之。即用麻黄于冬月，不过一分而已，可多手战。茵陈治阳黄，阴黄则大忌。香薷无表邪则忌，内伤疴尤忌。病有当发表者，忌酸涩之品。黄芪，有表邪则忌。人参，麻黄未出，热同者忌。中藟，勿用大枣、甘草，用茯苓则不病。甘草必用一钱，乃能全手足。目疾，勿用泽泻、猪苓、苍朮。老人，勿点冰。疔、妊娠，勿用木通。小便不禁、通，俱忌茯苓。嗽、痢初起，忌茴子、肉豆蔻。通忌滑利，如大麦冬、人力子。当归、槐皮宜用。痰多，忌柏子仁、蔓荆子。瘰癧，忌木瓜。

按：上俱系发药，如有必不可去者，酌少用之，或以他药监之，则无事矣。新去烧灰，不知勿用，为省事。

伤寒辨 伤寒有十六名，一伤寒，二伤风，三伤寒见风，四伤风见寒，五风湿，六中湿，七风湿，八湿温，九温病，十中温，十一热病，十二温病，十三晚发，十四瘧病，十五温疟，十六疫疔也。

也。阴虚则口中有味，阳虚则口中无味。劳力伤气，劳心伤血。

急救方¹

霍乱之病，皆因饮食，不干是邪。或因冷、或
因热、或失饥、或大怒、或乘舟车，伤动胃气，令人吐
泻并作。用药迟缓，须臾不救。此风温暑湿之气之合成也，
皆脾热之所生也。

干霍乱。吐利不得，闭结气，隔绝阴阳，胀满而
死，最急。急用盐汤吐之。多服香正气散加官桂、赤
芍、木瓜、枳壳，煎服救之。或苏合丸，尤妙。不可用凉
药，宜二陈汤加解散药川芎、苍术、防风、白芷之类。兼
用姜豉汤，杏仁、生姜，生麦芽，同炒至色变，以童尿一盞，
同煎至一盞，分三次服。急用吐法，针委中穴出血，服香
正气散，必效。

绞肠痧，即干霍乱也。先浓煎姜汤试之，如吐，即是
也。治法在碗纸烧为末，热酒调服，立效。或葱白捣碎，置
于脐上。又法以手蘸温水，于病者膝弯内二寸处，拍打，有
紫黑点处，以针刺去恶血即愈。患病之人两臂腕中有筋，
必致黑色，用针刺出紫黑血即愈。

1¹ 急救方：原书卷一作“急救兽伤虫毒”，《稿本》卷一作“救急附……并虫兽诸伤又神行急救时行痧变立刻回生药酒”，可参。

2² 乘：原作“乘”，据《古今医鉴》卷五《霍乱》“百沸汤”条改。

湿霍乱 上吐下泻是也。湿为热，宜五苓散更合益元散。不渴者为寒，宜理中汤。按：思知藿香正气之妙也。

劫药 八宝红灵丹，太乙紫金锭，苏合丸，俱有。

霍乱后转筋 以盐填脐中，灼艾，不计其数，虽死可活。更用木瓜、吴茱萸、盐各五钱，同炒令焦，用白沸汤碗，煎至一碗服。再研大蒜，涂两脚掌心，立效。

吐泻后转筋不止者，用木瓜四钱，吴茱萸一钱，茴香炒，一钱，炙草四分，紫苏七分，盐一撮，乌梅一个，同煎服木瓜汤。

劫法治转筋不止欲死，男子以手挽其阴囊之，女子则挽其乳近两旁牵之，此千金妙方也。

熨法 炒盐一钵，绢包攸其胸前并腹中，以熨斗火熨之，气透即苏，再以炒盐熨其背，则十分无事。

针法 刺委中穴出血，或十指头，或十趾尖出血，见后。

灸法 霍乱转筋入腹，手足厥冷，以盐填脐中，大艾炷灸之，不计其数，立效。又法，灸气海七壮。诸法不效，灸大椎即效。但有暖气者，灸承筋七壮，立苏。按：此穴止可灸三壮。

禁忌法 霍乱吐泻之时，切勿与谷食，虽米汤一啜，

① 井：原作“并”，据文义改。

下咽必死。必待过半日饥甚，方可以稀粥将息，切记！人忌饮食及热汤，不可饮热酒。

针灸各穴 委中穴，在膝腠内腠横纹中央动脉¹，在曲踞²内两筋两骨中宛宛，可出血，痼疹皆愈。背面取之，于四畔紫脉上去血如豚块者，不可出血，血出则不止。

气海穴，在脐下一寸五分，一切气疾皆灸之³。

大椎，背脊上第一节骨也。按：骨上不可灸，恐有误。

承筋穴，在膝后胫股中央，从脚跟上七寸，不可针。

华元化仙师云，十件危病，予以十妙方救之。一霍乱吐泻⁴，二缠喉风闭塞¹，三吐血下血²，四砒霜毒³，五尸厥，六中恶客忤⁴，七脱阳¹，八鬼魔鬼打，九孕妇横逆产，十胎衣不下。

中恶客忤者 凡人暮夜或登厕，或出郊，或空冷屋忽见鬼物，口鼻吸着鬼气，蓦然倒地，四肢厥冷，两手握拳，口鼻出清血，须臾不救。此症与尸厥同，但腹不鸣，心腹俱暖，切勿可移动其尸，即令亲戚众人围绕打鼓⁴烧火，或烧檀香、安息香，直候记苏人事，方可移尸。

1 脉：原脱，据《针灸资生经》第一《足太阳膀胱经左右三十六穴》补。

2 踞：《针灸资生经》卷一《足太阳膀胱经左右三十六穴》无此字。《针灸大成》卷三《马丹阳天星十二穴治杂病歌》作“踞”。

3 下：原作“上”，据文义改。

4 鼓：原作“鼓”，据《医学入门》卷七《怪疾》“卒中恶忤”条改。

先用苏合香丸，姜汤化下二丸，苏后用他药，太乙神精丹尤好，日用朱犀散、备急丸。又急取半夏末或皂角末，吹两鼻孔中，即活。但心头温者，一日可治。又取故汗衣，细用内衣久遭汗者佳。男用女衣，女用男衣，烧灰为末，每二钱，白沸汤调下。又麝香一钱，研和醋二合，服之。又取葱蒜心刺鼻中，入深四五寸，令目中出血，即活。又生姜汁、醋酒各半盏，同煎白沸，灌之。又韭汁灌两鼻孔中。又菖蒲捣汁，灌之。又黄丹一钱，蜜二合，和服。口噤者，折齿灌之。

鬼击鬼打鬼排 此等病，皆得之九疝，卒看人，如刀刺状，胸腹间不可按，抑或吐衄下血，治法同中忌。

尸厥者，脉动而无气，气团不通，故静如死也。卒然不省人事如死尸，但气不绝，脉动如故也，即中忌之类。治法亦同，用苏合丸、故汗衣灰。以竹管吹其两耳，即苏。血之与气，并走于上，则为人厥。厥则暴死，气复反则生，不反则死。尸厥之异，卒死，脉犹动，腹中气走如雷鸣，听其耳中如微语声者是也，用还魂汤主之。

还魂汤 当归、麻黄各一钱，杏仁一升，桂心、甘草各一钱，水煎灌服。口噤者，斡开口灌之，为下立苏。仲景。

凡尸厥、郁冒、卒死、卒中之类，皆当发表。仲景云：郁冒欲解，必大汗出是也。又用硫黄散，硫黄一两，朴硝半两，研如粉，分作二服。每用酒一盏，同煎，觉焰起倾

于落内盖着，候温灌之。如人行五里，又进一服，不过三服，即苏。此方治尸厥不省人事。

鬼魔 凡人到久无人居之屋，睡中为鬼所魔，但闻其人吃吃作声，便令人唤醒，如不醒，乃鬼魔也。不急救则死，宜用雄朱散：牛黄、雄黄各一钱，朱砂五分，为末。每挑一钱，于床上烧之；次挑一钱，以酒灌之。

凡人为鬼魔卒死，不得着灯火照，亦不得近前急唤，以致杀人。但痛咬其足跟及大拇指甲边，并多唾其面，即活。如不苏者，移动处些子^①，徐唤之。若元^②有灯即存，不可吹火。如无灯，切不可用灯照，仍用笔管吹两耳。又取半夏末或皂角末，吹两鼻。鬼魔卒死，血漏腹中，烦满欲死，雄黄末吹入鼻中。又酒调一钱服，一日三次，能化血为水。又生韭汁，灌口中。梦中被刺杀或被打，忽然吐衄下血，九窍皆出血，以升麻、独活、续断、地黄各五钱，桂皮一钱，为末，每二钱，白汤调下，日^③三。

郁冒者 人平居无疾，忽如死人，目闭不能开，口噤不能言，亦云血厥。此由汗出过多血少，妇人多有之，用白薇汤：白薇、当归各二两，人参半两，甘草一钱，为粗末，每五钱，水煎服。又仓公散，用藜芦、瓜蒂、雄黄、白矾，等分为末，少许吹鼻中。

① 些子：亦作“些仔”，即少许，一点儿。

② 元：本，原来，后作“原”。唐宋人多此语，后人以“原”字代之，宋·陆游《示儿》：“死去元知万事空，但悲不见九州同。”

③ 日：原作“田”，据《医学入门》卷七《怪疾》“鬼击吐血”条改。

客忤者，中忌之类也。多于道间门外得之，令人心腹绞痛胀满，气冲心胸，不治杀人。取百草霜五钱，研，温水调下。取盐如鸡子大^①，青布裹之，烧赤，研，纳酒中，顿服，当吐出恶物。

来复丹^②，通治诸厥。凡卒急之症，有气厥、血厥、痰厥、食厥、中风、中寒、中湿、中湿之类，皆当详症治之。

卒死者，猝然暴死也。乘年之衰，逢月之卒，失时之和，因为贼风所伤，是为三患，则暴病卒死。黄帝曰：火气入于五脏者，不病而卒死矣。又曰：赤色出两颧，大如拇指者，病虽小愈，必卒死。黑色出于庭，大如拇指，必不病而卒死。凡卒死者，口张目开，手撒遗尿，为虚，宜补气；目闭口噤，手拳，为实，宜发表。人见五色非常之鬼，遂令暴亡者，皆自己精神不守，元气极虚也。凡暴亡，不出一时，可救之。虽气绝肢冷，若心腹温，鼻微温，目中神彩不转，口中无涎，舌与两耳不湿者，皆可活也。救卒死，或居寝卧，奄忽而绝，急需取雄鸡冠血，顿涂其面，于则复涂之，并以灰营^③死人一周。

卒死 狐胆腊月取者，温水研，灌入口中即活。

① 如：原脱，据《证类本草》卷四《食盐》补。

② 大：原脱，据《证类本草》卷四《食盐》补。

③ 营：居住，如《广韵·清韵》：“营，居也。”引申为围绕，缠绕，环绕。《汉书·李寻传》：“日中，为大臣欺诬，日且入，为妻妾役使所营。”顾师古注：“营，谓绕也。”

又朱复丹、苏合丸、备急丸药皆有，皆治卒死，以姜汁或酒、或童便调，灌下即活。又生黄或麝香一钱，温酒调，灌即苏。惊怖卒死，温酒灌之。

脱阳症 凡人因大吐大泻之后，元气不接，四肢逆冷，面黑气喘，冷汗自出，外肾缩搐，不省人事，须臾不救，与伤寒阴阳易同症，急服大固阳汤。用大附子一枚，重切作八片，白术、炮姜各五钱，木香一钱半，煎服或灌之。须臾又进一服，神效。又桂枝一两，好酒煎服。又连须葱白一斤，酒煎服，阳气即回。又生姜一两，研，酒煎服。又葱，盐炒热，熨脐下气海，即愈。灸臍中五分，一切气疾皆灸之。

自缢死者，心下若微温，一日已上，犹可治。当徐徐抱下，解之，不可截断绳子。令安卧被中，急须按定其心，却捻住喉绳。令一人以手掌掩其口鼻，勿令透气，气急即活。又令一人以脚蹬其两肩，以手挽其发，常令弦急，勿使纵缓。一人以手捋按胸上，数摩动之。一人摩捋臂肘并伸之，若已强直，渐渐强屈之。如此一炊顷，虽得气从口出，呼吸眼开，仍引按勿止。又法用手厚裹衣物，紧填两谷道，抱起解绳放下，揉其项痕，仍搐药入

① 手：原作“乎”，据《杂病证治准绳·诸中门·五绝》“自缢死”条改。

② 填：《医学纲目》卷十七《五绝》作“顶”。

鼻，及以竹管吹其耳，待其气回，方可放手。若便后分泄气，则不可救矣。又急打马过血，调口中即活，男雄女雌。又取鸡屎白如枣大，调和灌鼻中，尤妙。又取半夏末或皂角末吹入鼻中，得嚏即苏。须臾少与温浆饮，令喉润，渐渐咽下乃止。

五绝者，一曰血，二曰气，三曰水，四曰鬼，五曰尸。皆取半夏末，吹入鼻中。心头温者，灌一升，皆可活。

救溺水死者，一宿尚可救。急急拯出，先以刀挖开口，放篾一只含之，便可出水。然后解去衣服，多灸脐中一百壮，令两人以笔管吹其两耳。又取皂角末，绵裹纳下部，须臾出水即活。又取马血，灌入口中。又将醋半杯，灌鼻中。又用苏合香丸一丸，姜汤调灌。又取万病解毒丹一钱，冷水磨化，灌下即苏。溺死、缢死皆效。又法取灶中热灰，二石埋其身，只出头面，水出七孔即活。又法将牛一头，将死者腹横覆在牛背上，两边用人扶策，徐徐而行，则水自下，亦活。又法以

① 后分：指“肛门”，义同“下部”。辽·希麟《续一切经音义》卷六“痔病”条：“《玉篇》云后分病也。《集训》云：下部病也。《说文》云：后病也。”《医学纲目》卷十七《五绝》无此二字。

② 拯：原作“极”，据《东医宝鉴·救急》“救溺水死”条改。

③ 挟策：持鞭，扬鞭。唐·蒋防《霍小玉传》：“长安有媒鲍十一娘者……性便辟，巧言语，豪家戚里，无不经过，追风挟策，推为渠帅。”宋·沈括《梦溪笔谈》：“霍小玉，京兆倡女也，善歌舞，能弹琵琶，色艺冠一时。外，遇田家有酣斗而伤者，仇人尤而执之。”

生人倒驮死人，即负持走，吐水即活。

救冻死 人遇寒冻死，四肢强直，口噤，只有微气者，用大釜炒灰令暖，囊盛熨心上，冷则易。口开气出，然后以温粥清，稍稍与之，或温酒、或姜汤灌之，即苏。若不先温其心，便将火灸，则冷气与火争，必死矣。又法用毡或秧荐裹死人，以索系定，放平稳处，令两人对面轻轻滚转，四肢温和即活。

救饿死 凡人连日不得食，饥饿将死者，先以稀粥清稍稍咽下，令咽将满口。过一日，渐与稀粥啖之。过数日，乃与稠粥软饭，则活。若早吃饭及肉，则死矣。

入井冢卒死 夏月淘井，多致杀人，令人冒闷而死。即取井水喂其面，并冷水调雄黄末一钱，服之。转筋入腹，痛欲死者，使四人提住手足，灸脐左边一寸十四壮。又用生姜一两，酒煎服。又醋煮衣，如令热彻湿，裹转筋处。又浓煎盐汤，浸手足，沉身其间，即苏。古冢中、深井中皆有伏气，皆知治法。

人咬伤 荔枝核磨，同和搽之，外用荔枝肉盖贴，效过，不必他方。

犬伤人 凡春夏初交，犬多发狂。但见其尾直下不卷，口中流涎，舌黑者，即是狂犬。若被其伤者，九死

① 秧：《急救良方·五绝死》篇无此字。《急救广生集》卷三“救冻死法”作“蒿”。可参。

2 噤（xùn 汛）：含在口中而啼出。

生。急用针刺去血，以小便洗净，用胡桃壳半边，以人粪填满，掩其疮上，着艾灸之，壳焦粪干则易之，至白壮。次日又灸白壮，灸至二五白壮为佳。 疯狗咬人，即先口嚼浆水洗净，或以热尿淋咬处，嚼生姜擦之。又用葱白，嚼烂涂之。又杏仁嚼烂，敷之，以帛扎好；或同马兰根研细，葱汤洗后，涂之尤妙。 患人顶心中有一红发，即当拔去，后服药乃效。

治狂犬咬，先口嚼浆水洗净，然后再用防风、人南星等分为末，干贴之，神效。又仍杀所咬狂犬，取脑敷伤处，后不复发。狂犬伤或久复发，无药可疗，雄黄明者五钱，麝香五分，为末，酒调二钱服。服后必使得睡，切勿惊动，任其自醒。须利下恶物乃效，忌盐醋白日。

狂犬伤出毒法 蜥蜴屎封之，出犬毛，神效。又方，生麻油研豆豉为膏，如弹子大，常常搽拭所咬处，却搽开看豉丸内，若有狗毛茸茸然，此毒气已出。搽至无毛，方乃痊可。

狂犬咬人发狂，如狗叫，蛤蟆脰食之。又虎头骨、虎牙、虎胫骨为末，酒调二钱服。

禁忌 终身禁食犬肉及蚕蛹。三年之内，忌猪肉、鱼腥、毒物、房事，忌饮酒。宜常吃杏仁，以防其毒。 蜈蚣咬人，发狂，作脰食之，勿令知，常吃韭菜汁。

狂犬咬人，当先针刺去恶血，仍灸疮中十壮，自后每

日灸二壮，至白日乃止，忌饮酒，只就咬牙迹上灸之。常食韭菜，以渣封灸疮，永不再发。

狂犬伤青不出，发寒热，速以艾灸外丘穴。外丘在足外踝上七寸骨陷中。又灸所咬之处七壮，立愈。

马骡咬踢伤 益母草捣烂，和醋炒敷。又方用艾灸伤处，取马屎烧灰为末，敷之。

牛伤 牛触伤，肠出不损者，急送入，以桑白皮或生白麻为线，连合肚皮缝上，秽血竭末或百草霜末，血止立活。吃羊肉汤，十日愈。

猫咬伤 取薄荷叶，嚼烂涂之。又虎骨、虎毛，烧涂之。

鼠咬伤 猫毛烧灰，津液调敷。又嚼香涂之，或猫屎涂之。

蛇咬伤 中蛇毒咬昏困，五灵脂二钱，雄黄一钱，为末，酒调服一钱，以香散患处，即苏。又方五灵脂、雄黄、贝母、白芷，等分为末，酒调二钱服，亦良。又取雄黄末车螯口，立效。治蛇毒，无有如雄黄、蒿蒿者。白矾火上溶汁，滴咬处，效。

蝎子咬 冷水洗之，即不痛。水既暖，又痛，再易冷水。又用白芷、土夏为末，醋调涂之，立止毒出。

蝎蝎目，日未出时，用明白矾二斤，臼中晒一日收

① 糝(sǎn ㄙㄢˇ): 净麸，粉。

取 每遇虫咬青蚊子，可用津唾涂之，妙。

蜈蚣咬 人头垢涂之 独头蒜研涂 烟筒中烟油涂之。

蚯蚓伤 用盐汤浸洗，吃盐汤一杯 形如大风^①，眉须皆落者，石灰水浸身，愈。

蚯蚓伤 鸡屎或鸭屎涂之 蚕咬伤麻叶，打烂涂之

蜘蛛咬 腹大如孕，一身生丝，羊乳饮之，数日而平 蜘蛛咬，遍身生疮，取好酒饮之大醉，须臾虫于肉中，小如米，自出 又他方，取薑汁一盞，入雄黄^②一钱，麝香少许，和匀饮之，重死者立活 又用瓦松，擦之立愈

蠼螋伤 此名八角虫，以尿射人，如汤火伤面，火绕腰，取扁豆叶捣敷 又方乌鸡翎烧灰，鸡子清同敷 又方盐汤淋疮上，数日愈 又方犀角，水磨敷 又鸡屎涂之 又梨汁敷之 虎爪^③伤，蚕豆叶捣敷，蚕豆亦可

蜂叮人 鲜青蒿涂之 又薄荷叶之 又灰蓼头草擦之，醋雄黄涂之 又蜂房为末，猪脂涂 又人粪垢及盐擦之。

蚕咬伤 桑叶汁饮之，又涂之 又桑叶，以干好茅，和酱汁研敷 蜈蚣刺人，生芋乃擦之，能止痛

蜗牛伤 蜗牛咬青遍身者，参子汁浸之

① 风：原作“疯”，据《杨医证治准绳》卷六《蚯蚓伤》改。

② 黄：原作“香”，据《经验丹方汇编·兽虫咬伤》“蜘蛛咬”条改

③ 爪：原作“瓜”，据《奇效简便良方》卷四《损伤》“虎爪伤”条改。

蜈蚣¹伤即地狗虫 石灰醋和涂之。

壁镜伤 咬人必死 桑灰淋浓汁，调白矾末涂之。又醋磨雄黄涂之。

杂色虫 夏月有杂色毛虫，咬人，青人生疮痒痛，肌肉皆烂 用皮一碗，清油半杯，同捣，厚敷伤处，一宿取，见皮中有虫毛，埋土中养之 用白芷汤洗后，白矾末敷之 又伏龙肝醋和作团，于伤处搓擦，其毛皆出在土，痛立止，神效 又蒲公英，根叶，取汁涂之。

凡诸虫青伤者，用青黛、雄黄为末，新汲水调下二钱，外又涂之 又马齿苋捣涂 又麝香涂之 又小蓟或紫耳捣汁饮，又敷之 误食蝎蝎子甘痛，用田中泥加雄黄为丸，白汤下。

蛇蝎蜘蛛咬 生鸡子敲一小孔，令咬处，立愈

毒蛇厚在草木上，人若触之似刺割，使肿痛肉烂，手足指节垂落，白矾霜和叔青涂之

蛇骨刺人肿痛，烧死鼠灰末，敷之。

灸法 凡蛇蝎蜈蚣青虫咬伤，于伤处灸五壮或七壮，即愈。

毒蛇咬 用蛇皮贴咬处，艾火灸其上，出青即止

凡蛇虫伤毒 厚朴去心为末，酒调，尽量吃醉，以渣

¹ 蜈：原作“蚣”，据《太平圣惠方》卷五十七《治诸虫咬人诸方》“治蜈蚣咬方”改

敷之，立愈。又益母草、扁豆叶汁服，外敷之。蛇最畏莴苣，可以莴苣、雄黄敷之。

咒法 先问被伤人是甚虫伤，即默念火德星君黑杀摄，吹在伤处，自然不痛。

蛇犬及狂狗咬 用蜥蜴粪和盐研敷，神效。

青蛇及射弓、沙虱等伤人，眼黑口喎、手足强直，毒气入腹者，白矾、甘草等分为末，每一钱、冷水调下。

射弓及疰气，发无常处，用白芥子作丸服之，或为末醋和涂之，随手有验。草无入耳，以鸡冠血滴耳内，即出。

一切青虫咬，用大纸捻蘸麻油点灯，照重伤处，其青尽入油焰内去。蜈蚣咬，桑叶捣和醋敷，或鸡冠血，或用灯煤搽之，或芋梗擦之，止痛。

毒蛇咬 用好醋二碗服，令毒气不随血走。或吃清油一二杯，亦可。① 以头绳扎定伤处两头，次用白芷末② 调葱白冬汤调下，立效。

蛇入人窍中 急以手捻定，用刀划破，以辛辣物如椒等置所破处尾上，用绳系之，日出。切不可拔，拔之死不肯出。

狗咬伤 杏仁去皮尖，同马兰根研细。先以葱汤洗后，

① 疰：原作“疰”，据《卫生易简方》卷十《蛇虫伤》改。

② 破：原作“碗”，据《冷庐医话》卷二《古书》改。

河豚 子丸毒，急取芦根捣汁救之。又橄榄、芦根、粪清俱可解。

闭口川椒毒 戟人咽喉，气闭欲绝，吃大枣一枚救之，或吃井水一二碗。

救诸中毒方 久则不效，过迟则不救。

治法上宜吐之，不问何毒，多灌香油，吐利即安。搗葱探吐之，下以解毒丸、麝家利之。紧急者，只以苦橘煎甘草汤或服利之。大法甘草、绿豆，能解百毒。

解毒丸 治饮食中毒并百物毒，投人于必死。取根白芍、贯众去毛、青黛、甘草各一两，为末，盐丸梧子大，以青黛另为衣。凡人少觉精神恍惚，是中毒药，急取十五丸烂嚼，新水送下，即解。

砒霜毒 在膈上，则瓜蒂散吐之。在腹中，则万病回春丹下之。又方急取黑铅一两，熔水一碗，灌服，即解。如无黑铅，急取青蓝汁一斗，灌之。又方随猪、狗、羊、鸡、鸭热血灌之。又方白扁豆、青黛、甘草各一钱，巴豆半钱，为末，水调一匙灌之，青黛利下。又贴用猪胆，水和服之，立解。又冷水研绿豆汁服之生用。又人粪汁灌之。

按：前得一秘方，用生防风一两，为末，冷水调服，曾救多人。想服毒未久者，药在膈上，可先吐之，然后

① 戟：刺，刺激。如《本草纲目·草部·大戟》：“其根辛苦，戟人咽喉，故名。”

用药。

盐卤毒 按：前司有一狐仙云，生豆腐浆灌之即解。但盐卤能凝人之血，得豆腐浆则凝浆成腐，可不伤人也。

葱蒜毒 葱蒜米泔水几碗亦妙。势重危者，以活鸡或活鸭一只，剪去头，穿于口中，以热血灌下可解，多有得生者。

水银毒 饮地浆水，立愈。地浆水，谓之地浆水。

花椒毒 气闷欲绝者，以地浆水解之。

杏子双仁者，有毒，能杀人，用地浆饮一二碗。

藜芦毒 吐逆不止，用葱白煎汤吃。

巴豆毒 用黄芩、葛根、黄芩，冷服。又黑豆或绿豆汤，冷服。又芭蕉根叶，捣汁饮之。

草乌附子毒 心腹躁闷，甚则遍身皆黑，煎绿豆、黑豆，冷服之。又甘草、黑豆汁，又防风、黄连，又葱白、犀角，俱可。

金银铜锡铁毒 取鸡胆，吃之。又生鸡子，吞之。又黑豆汁或水芹汁，饮之。水银能解金、银、铜、锡毒，服水银，即出。宜商。

斑蝥芫青毒 吐衄不止，用绿豆，或黑豆，或糯米，和米泔，取汁服之。又盐汁饮之。又猪乳服之。

硫黄毒 令人心闷，取猪乳热血，饮之。又宿冷猪肉及鸭肉羹，冷饮之。

雄黄毒 防己煎汁，吃之。

水银毒 肥猪肉煮，冷食之。又猪脂，服之。

海菜毒 令人腹痛，发气，吐白沫，饮热醋即安；

狂走欲投水，似有祟状。

诸兽肉毒 犀角，浓磨汁一碗，服之。

诸鱼毒 吃冬瓜汁，最妙。鲙鱼毒，食蟹蟹之。鱼蟹毒，靛汁、陈皮煎汤，极冷服。

凡食鱼肉过度，食其满，立消。还饮其肉汁，亦消。

蟹毒 生藕汁、冬瓜汁，并消。又紫苏、黑豆汁，并解之。蒜汁亦可。

食菜中毒 猪骨烧灰，和水服。葛根浓煎汁服。

食瓜毒或吃瓜果过多腹胀 桂心末服之，或加醋香。

烧酒毒 面青口噤，初觉便脱衣推身滚转之无数，叫之即苏。又以温汤裸体浸灌，常令温暖。若灌冷水，即死。又取生瓜取汁，灌之。葛根汁灌。

轻粉毒 生绿豆浸烂打汁，同地浆水灌之。

附子毒 生绿豆汁或田螺打碎，水调服。

钩吻毒 生地黄汁、生地黄叶与芹菜九升，并茎有毛。误食杀人，用甜桔梗半斤，煎服。

木鳖子毒 发背欲死，用肉桂一两，煎服。或用香薷一两，和白糖灌之。

铅粉毒 以砂糖调水服，或萝卜汁饮之。

半夏毒 饮食不下，用老生姜汁半杯，忍痛咽下，片

刻立愈。

酒毒经日不醒，黑豆一升煮汁，灌之即醒。

烧酒醉死 急用生蚌，切水灌之。或取井底泥，掩心口。或以青布浸新汲水器上之^①，葛根白解之。

误食桐油，呕泄不止，急饮热酒解之。

过食白果，多成风眩，以白葱头煎汤，服一次。

误食银销^②，渐闭肠胃，延旦垂死。以饴糖四两，熬为丸，不时以麻油吞下。服完，自合，须至百日乃无患。

误吞铜物，多食芋芥、核桃，自能消化。此方系古传，各方。

吞铁物 用枳炭烧红，带红研细，以少糖调服二钱，立愈。

小儿误吞针 将半生熟出芽蚕豆打碎，用盐汁和丸吞之。或用土吸眼珠一只，水煎汤吞下，其针即穿于眼内，从大便而出。方系古传。

吞金器 胸膈间不可忍者，以羊头骨煨末，每服一钱，米饮下，过夜其金器即随大便取下，此妙方也。或鸭血灌之。

① 罨(yǎn 掩)：被覆、遮盖。罨也是外治的一种方法。

② 银销(yōu 有)：见《本草纲目拾遗·金部·银销》：“一作釉。此乃倾银铺熔银脚也，凡熔银入罐，必多用硝及礞砂、黄砂以去铅铜杂脚，见成十足成色为纹银。其罐底所余黑色半渣，名曰销 有毒，不可误食，食能坠入肠，此物无入药用者，故纲目银下附乌银，虽无主治，尚列其名，而销未及焉者，或以其毒而弃诸……”

鸭蛋不消，饮糯米泔水，立解。食鸡子发闷，饮醋即解。

蜒蚰入耳，以羊乳滴入，化水流出。……
虫入耳^①。

臭虫入耳，鳖甲烧烟熏耳，虫立死，无害。后服菊花汤三日，杜火气。

① 又见……入耳；此11字混入正文，据文义移入注文

诸痛方

男妇小儿通治¹

通则不痛，脉满为实。温则痛止，为虚。如因风而痛者，则拙掣恶风，或有汗而痛。因暑热痛者，或有汗，或无汗，则皆恶热而痛。因湿而痛者，则头重而痛，遇天阴尤甚。因痰饮而痛者，亦头昏重而痛，愤愤欲吐。因寒而痛者，细²色见寒而痛。各与本脏所属风火暑热之气兼为之状而痛。气虚而痛者，遇劳则痛甚，其脉大。血虚而痛者，善惊惕，其脉芤。用是病形分之，更兼可见并察之，无不得之矣。

头痛 头昏耳鸣，九窍不利，是气虚。如气上不下，头痛眩疾者，是下虚上实，无器头痛也。有欬逆头痛者，大寒内入与喘，喘所故令头痛，尚亦痛。心烦头痛者，病在脑中，乃暑热也。太阳经痛，恶风寒，脉浮紧，用川芎、独活。少阳经痛，脉弦细，往来寒热，用柴胡、黄

1 诸痛方男妇小儿通治：此8字稿本卷三作“诸痛头、咽喉、目、口舌唇齿、耳、心胃胸膈腰背脚气小腹诸淋脚膝背脊两腿两足等症”，其注文为诸痛之子目，可参。

2) 细(chu处)：原作“细”，据《杂病证治准绳·诸痛门·头痛》改；不足，不铢。引申为短，拘急。

芩 阳明经痛，自汗发热，不恶寒，脉浮缓长实，用升麻、葛根、石膏、白芷。太阳经痛，必有块，体重或腹痛，脉沉缓，用苍术、半夏。少阴经痛，是寒气也，为真寒假，脉沉细，用麻黄附子细辛汤。厥阴头痛项背，或吐衄，脉浮缓，吴茱萸汤。三阳头痛用羌、防、藁芥、升麻、葛根、石膏、柴胡、川芎、芍药、细辛、葱白等。如阴痛头痛，只用温中药如理中、姜、附等。眼黑头旋，风虚内作，用天麻。

偏头风 半边痛是也。左属风，羌芥、防风。血虚者，川芎。当风。右属痰，苍术、半夏，热加芩芩。

雷头风 头痛而起核块是也。用升麻、苍术各四钱，荷叶一个全者，水二盅，煎八分，食后服。

大头痛 头肿大如斗是也，是人行疫病。用黄芩、葛连各一两，人参一钱，栝树、玄参、生甘草各一钱，连翘、大力子、板蓝根、马勃各一钱，麦冬、升麻各五分，柴胡、桔梗各一钱，共为末，时时此服。或加防风、薄荷、川芎、当归，蜜丸服之。如大便硬，加酒煎大黄一钱，以药末五钱，煎服，一日三次。即普济消毒饮。

眉棱骨痛 防风、羌活各一钱，石膏一钱，冬不用，甘草一钱。夏用一钱五分，为末，每服一钱，水煎服。

头风屑 用泻青丸化开，竹叶煎汤化下。

① 棱：原作“梭”，据《文堂集验方》卷三《头痛》“头痛连睛痛”条改。

头重 用麻黄根^①，三钱，菖蒲^②、香^③，各一钱，红豆^④十粒，羌活、连翘各三钱，共为细末，鼻内搐之。

头内如虫封固，名天白蚁，用茶子细末，吹鼻中。

头项强痛 用麻黄、桂枝、杏仁、甘草、防风、羌活、独活、川芎、白芍、白芷、蔓本、柴胡、升麻各一钱，多加紫金^⑤，再用生姜一片，薄荷一分，煎服。

治八般头痛 用草乌、细辛各一分，黄丹^⑥少许，为末，吹入鼻中。

风热上攻头痛不可忍 片芩^⑦一两，羌活^⑧、独活^⑨、川芎^⑩、细辛^⑪、白芷^⑫、薄荷^⑬、荆芥穗^⑭、头风^⑮及脑病加细辛、蔓本、蔓荆子各一钱，为末，每服二钱，茶调下。

治偏正头痛 川芎一两，香附四两^⑯去毛，为细末，每服食后，茶调服。

治头痛不忍者 用葱^⑰，去皮，研取汁，令病人仰卧垂头，以铜篦点汁入鼻中，急令搐入脑，眼中泪出，即瘥。

头痛连睛痛 用石膏、大力子^⑱，各一钱，为末，茶清调下。

治风邪在脑，或感湿邪，头重脑晕，及眉棱^⑲、眼眶^⑳病者，川芎^㉑、细辛^㉒、白芷^㉓、白芍^㉔、蔓本^㉕、蔓荆子^㉖、水

① 棱：原作“棱”。据《类方证治准绳·头痛》“小芎辛汤”条改。

② 白芷：《类方证治准绳·头痛》“小芎辛汤”条作“白术”。

煎，食远服。

凡头上不可用升药，宜用降火药。下病宜升，上病不可升也。

目 痛

目病宜先理脾胃，养血安神为本。阳虚则眼楞急而为倒睫拳毛，阴虚则瞳子散而为目昏眼花。在肝者除风散热，在肺者养血安神。内疾非服不除，外疾非点不退。

夏枯草一两，香附一两，甘草四钱，为细末，每服一钱，茶清调服。治日珠夜翳，或点寒凉药反痛甚者，最神效，四日愈。

凡治目最忌大寒。芒硝、石膏、梔子一犯则成翳。补肝散，治肝虚目暗痛及羞明怕日，夏枯草五钱，香附一两，为末，每服一钱。要忌咸物，血病尤多食咸故也。

治睛疼难忍者 当归、防风、细辛、薄荷，等分为末，每服一钱，麦冬汤调下。食后日午、夜卧各一服。

柴胡复生汤，治红赤羞明，泪多眵少，睛珠痛，常欲闭不敢久视。柴胡六分，苍术、茯苓、黄芩各半钱，薄荷、桔梗、炙甘草、白芍药各四分，羌活、独活、草本、厚荆子、川芎、白芷各一分，五味子一钱，水一盃，煎一盞，食后服。

当归养荣汤 治睛珠痒甚，余治同上。四物加羌、防、白芷。

决明丸 治畏日恶火，沙涩难开，多泪俱多，久疾不愈者。羌活、独活、归尾酒洗、炙甘草、五味子、防风各五分，白决明盐一分，草决明、黄芩、黄连酒制、黄柏、知母各一钱，煎服。

白眼痛 多有赤脉，视其从上而下者，太阳也，羌活为使。从下而上者，阳明也，升麻为使。从外走内者，少阳也，柴胡为使。

沙涩昏翳者，乃气分隐伏之火，脾肺皆有湿热，用桑白皮散。

天行赤热者 七日愈，戊午七日，火数七也。

暴风客热症 风热火攻，火在自分也。

火胀大头症 目赤肿而头面浮肿，皮肉厚赤也¹。

羞明怕热²，症，原在肝胆脾三经，火盛血热而已。

睑³硬睛疼证 风热肝虚血少，不能营运于目络，水无所急，火反乘虚而入，会成燥湿热，直带于肌肉，轻则内生椒疮，重则肿胀如杯，硬而贯睛等症。治当收退⁴，退，退皮也。

1 症：《杂病证治准绳·目痕》“火胀大头证”条作“证”。

2 燥赤也：原脱，据《杂病证治准绳·目痕》“火胀大头证”条补。

3 症：《杂病证治准绳·目痕》“羞明怕热证”条作“证”。

4 睑：原作“脸”，据《杂病证治准绳·目痕》“睑硬睛痛证”条改。

5 于：原作“子”，据《杂病证治准绳·目痕》“睑硬睛痛证”条改。

痛如针刺症 病在心经，实火有余也。‘鸡冠蚬肉’者，心之热。筋肉攀睛者，脾胃热毒，脾受肝邪也。

眵泪稠浓者，肺虚也，肺热也。肿痒如杯，用洗肝散。

洗肝散 治赤目肿痒难开，沙涩眵泪。羌活、当归、羌活、防风、山栀、炙甘草、川芎、大黄各一两，为末，每二钱，水调下。

桑白皮散 治白睛肿起，日夜疼痛，心胸烦闷。桑白皮、玄参、升麻、旋覆花去枝叶、赤芍、杏仁、甘菊、甜葶苈、防风、黄芩、枳壳、炙甘草，为末，每四钱，水一盞，姜一片，煎八分服。

朱砂煎 治白睛肿起，赤涩疼痛。朱砂、杏仁去皮尖、青盐各一钱半，白硝、黄连各半两，研匀绵裹，以雪水浸一宿，滤久，入瓷器中。每用以铜箸点之。

洗眼汤 治白睛肿起，赤涩痒痒。青皮、桑白皮、威灵各一两，大黄、玄参、地肤子，青盐各五钱，竹叶四升，水煎，入盐淋洗。

治睛痛难忍者 白芷、细辛、防风、赤芍，等分为末，入沙糖二钱，同煎服。

治眼睛痛 乳香、没药、黄连、雄黄、盆硝，各等分为末，啗鼻。

(1) 鸡冠蚬肉：是因热毒蕴结，血脉不通所致。以睑内长出紫色瘀肉，形如鸡冠，或如蚬肉为主要表现的外障类疾病。

眼涩痛不能视物 用熟羊头眼中白珠子一枚，于石上和枣汁研之，取如小豆大，安眼睛上，仰卧一日二夜，不过三四度，痊。

治睑¹硬睛疼去翳 蜥蜴、白术、黄连、枸杞子、苍术、²、地骨皮、丹皮、龙胆草，各等分²，为末，每服一钱，荆芥汤下。

痛如针刺咽喉亦痛 罂粟黄、甘草、当归、芍药、麻黄、荆芥穗各一钱，白术五钱，为末，每服一钱，生姜、薄荷煎服之。又补肝散，人参、茯苓、川芎、五味子、桑木各一两，羌活子、细辛各一两，为末，每服一钱，空心，米饮调下。

治红赤羞明，痒痛沙涩，名春雪膏 独何去油，四钱，龙脑五分，以黄研极细末，入龙脑和匀，用生蜜一钱一分，再研，点眼锐眦。

目痒极难忍 川乌炮、川芎、荆芥各五钱，羌活、防风各一钱，为末，每服一钱，食后薄荷汤调下。

凡目赤不可具汤浴，并忌用汤洗足，汤驱体中热集于目，必丧明。

飞丝入目 青菜汁点之如神。右葛蒲搗碎，左目塞右鼻，右目塞左鼻，屢效。又头上白屑少许，揩之即出。

1 睑：原作“脸”，据《类方证治准绳》卷七《目痛》“二术散”条改。

2 各等分：此三字原脱，据《类方证治准绳》卷七《目痛》“二术散”条补。

尘物入目眯目 用生粟米七粒，焙干取汁洗之。藕捣碎，绵裹，滴汁入目中，即出。用豉七枚，浸水洗目。用东墙土马齿苋，烧灰研细，点少许于眦头，即出。新桑根皮，洗净捶碎，入眼，按之自出。猪脂煮，取水面如油者，仰卧去枕，点鼻中，不过三四次，与物俱出。

砂芒眯目 蚕沙，以新汲水空心吞下十枚，勿嚼破。又法，以貂鼠毛皮裘袖收之，即去。

麦芒入目 大麦煮汁，洗之即出。

竹木入眼 蛭虬捣涂之，立出。石灰入目，山梔浓煎，频洗。

凡目病及眯目，取地肤子白汁，点于目中。

眯目生翳 用覆麦、炮姜为末，井华水服一钱，日二服。

风热目暗涩痛 车前子、黄连为末，食后温酒服一钱，日二服。

眼目赤烂 紧闭目，以防风、薄荷、荆芥、桑叶热汤频洗。五月取老黄瓜一条，上开一孔，去瓤，入苦酒令满，悬阴处，待酒透出，刮下点眼，妙。人乳入黄连炖，点之，妙。

拳毛倒睫 用木幣子仁捉烂，以帛包作条，左患塞右鼻，右患塞左鼻，次服蝉蜕、甘菊、谷精草、防风散。

① 翳：原作“瞖”，据《本草纲目·草部·瞿麦》改。

眼睛突出一二寸 以新汲井水滑渍睛中，数易之，自入。

赤眼肿痛 以三七磨汁，涂四周，甚妙

赤翳攀睛 每蝶翅一钱，辰砂半钱，乳飞，黄蜡和，临卧入少许眦中，天明洗去。

目为物所伤 四物加草本，前胡、防风各七分，煎服

通治目疾驱风退翳明目神方 蛇蛻微炙，一两，蝉蜕去其足翅，一两，羌活、当归各一两，石决明用布入东流水一伏一时取出，拭如粉，川芎各一两，防风、茯苓、炙甘草各四两，赤芍一两，黄芩六两，荆芥穗，苍术浸去皮，切，十五两，共为末，服二钱，食后米汤或茶调服 忌食发风毒物

凡有目疾者，服归脾丸最妙，日服三钱。

咽喉痛

咽痛皆火郁上焦，致决凝气血聚结于咽喉也

缠喉风症 其肿透达于外，且麻、且痒、且高

乳蛾症 肿于咽两旁名双蛾，一边肿者名单蛾 甚者宜蛾上刺血。

喉痹症 或有疮或无疮，初起通用荆芥、甘草、桔梗、连翘、大力子、防风、竹茹煎服，或加射干、栀子、黄芩之类 若肿达于外者，以甘根、地龙、伏龙之类敷

1 伏：原作“代”，据《类方证治准绳·痘疹余毒》“蝉花无比散”条

之。若牛疮，白者多涎，赤者多血，大率与口疮同例，如黄薇根皮、黄柏、黄连、青黛、煎咽亦好。

喉痹，乡村病皆相似者，大行邪也。必先表散之，人忌酸寒之药，宜用甘草、桔梗、黄连、半夏、姜蚕、大力子、荆芥煎服。

水浆不入，牙关紧急，不省人事者，先用解毒雄黄丸。用雄黄研飞、郁金各二钱半，巴豆去皮出油，一钱，为细末，醋煮面为丸，如绿豆大，每用一丸，醋磨化服之，即时痰出后，更用生姜汁灌之，再用上项药，无不神验。

玉钥匙 治风热喉痹及缠喉风。煨白一两，糊似干西，白姜全二钱半，冰片少许，为末，吹入喉中，立愈。

玉屑无忧散 治咽弱语声不出，咽物有碍，或口舌生疮，或误吞骨屑，使寒不下。玄参、贯众、滑石、砂仁、黄连去须、炙甘草、茯苓、山豆根、荆芥穗各一两，寒水石煨，一两，煨砂一钱，为细末，每服一钱，茶送下。

碧玉散 治喉咽肿痛，水浆不下，或喉上瘰，重舌，木舌肿胀，皆可服。青黛、盆硝、蒲黄、甘草，等分，为细末，吹入喉中，细细咽下，或用沙糖为丸溶化。

备急如圣散 治时气，咽喉闭塞，水谷不下，不省人事。雄黄、藜芦去皮用仁、白矾飞、牙皂去弦，为末，鼻内搐之。

① 喉：原作“痛”，据《卫生宝鉴·咽喉口齿门》“碧玉散”条改。

咽喉备急丹 青黛、朴硝、白姜各一两，甘草四两，为细末，腊月牛胆一个，入药其中，阴干用。

因痛不妨咽物，不宜用寒凉，用发声散 全栝楼二两，姜食枳、干姜、桔梗各七钱半，甘草二钱，炒，为末，每用半抄吹中。若大肿痛，左右有红，或只一边红紫长大而水米不下者，用此药二钱，朴硝一钱匕^①，和匀，吹入喉中。

治悬壅肿，不下食，用玄参一两，升麻、射干、大黄各半两，甘草二钱半，为末，用水煎含咽。悬壅俗名小舌头。

治喉中悬痛垂长咽中妨闷 用烧盐、桔矾研细，以箸点之即消。

治唇闭闭塞不通，舌气上攻，用马牙硝研细，卷裹钱，含咽津，以通为度。

治风热客搏上焦，悬壅肿痛，用生药子^②、生甘草各一两，为粗末，每服二钱，水煎，含之良久咽下。

咽中反梗，马牙疼痛，咽物不下，用射干、桔梗、升麻、犀角屑各二钱，木香、木通各一两，苏子^③、诃子、槟榔、枳壳^④、小蓰、炙甘草各一两，为粗末，每服三钱，水煎服。

咽中有物如弹丸，日久深远，津液难咽，作闷疼痛

① 匕：原作“七”，据《卫生宝鉴·咽喉口齿门》“发声散”条改。

白去黄，着米醋拌煨^①，火煎沸起，取下，如此二次，饮醋尽，不过一二次，即痊。

冬月于临卧时，食生萝卜三五片，可无咽喉之疾。

诸物梗喉

骨麻根捣烂，丸如弹子大。如鱼骨梗，即以所伤鱼汤送下。如鸡骨梗，即以所伤鸡汤下。又法，以犬吊其一是，取其涎，徐徐啗之，或冲入药内服。又法，切砂，井水沏熟，含化，最能软骨。又法，用贯众浓煎一盞半，分服，连进一片时，一咯其骨自出。细茶、五倍子，等分方末，吹入咽喉，立愈。又法，吃橄榄即下。或用橄榄核方末，顺流水下。和芭、螺壳哽喉，将鹅吊一是，取涎，徐徐咽下，或用白饴糖多吃。

误吞竹丝哽，以烂竹筒上内者，煎汤服。鱼骨哽，取本鱼生眼珠，以腐衣裹之，拼命吞之，即愈。吞碗丝，以绿骨麻梗烧了，当烟筒呼吸，其喉舌肿处即消。吞钉铁金银铜等物，但多食肥肉，自随大便而下。吞钱，烧炭末，白汤调服，或食荸荠，其钱自化。吞发绕喉不出，取自己凡发烧灰，白汤调服一钱。凡治哽之法，皆以类推。如鹁鸪^②、^③、^④治鱼哽，磁石治针哽，发灰治发哽，狸、虎治骨哽。凡卒然咽噎，用炭末蜜丸

① 煨：此后原衍“唐”字，据《杂病证治准绳·七窍门·咽喉》删。

含咽。

口舌生疮 宜凉膈散。

口疮烂 用导赤散合四苓散，各等分，煎服。

口糜烂 柴胡、地骨皮各二钱，连翘一钱，黄芩、薄荷各七分，煎服。

口舌生疮初起 炙甘草二钱，藿香、石菖蒲、梔子各一钱，为末调服。

口舌疮连年不愈 玄参、天冬、麦冬，等分为末，蜜丸噙化。

口唇紧小不能开合，饮食不得，不急治则死，急用芫黄饮子 升麻、白芷、枳壳、黄芩、防风、半夏、石斛各一钱，甘草五分，姜五片，煎服 外用黄柏二两，五倍子、密陀僧各一钱，甘草二分，为末，水调后二味，涂黄柏上炙干，再涂再炙，药尽为度 然后将相作薄片，贴于唇上，大肉即愈 蛇蛻治唇重脱，烧为末放。

舌肿大渐渐满口，不急治则杀人 甘草霜、芒硝、滑石，为末，酒敷 又法，用紫背二钱，竹沥和匀，贴抹口中 蒲黄、竹沥涂舌上 又法，日促八九次，刺舌出血妙。硼砂、牙硝治舌肿。

舌下肿如核大，破出黄痰后复发者，连翘一钱半，牛蒡子、真川连各一钱，入花粉、梔子仁各七分，枳壳、柴胡、荆芥、薄荷各五分，甘草一分，灯芯一握，水煎服。

口舌生疮菌 酸枣仁、茯神、人参各一钱，犀角、玳

珀、朱砂各五分，冰片一分，为末，蜜丸，麦冬汤服。噙化最好，亦可时时搽咽。

舌忽肿大 百草霜、青盐，等分，为末，井水调涂舌上。

舌根忽生小舌，针刺去恶血，即愈。

舌上生疮或白胎如雪 先以生姜片蘸蜜水揩洗，再用薄荷汁和白蜜和匀，涂舌上。

舌胎辨症 舌本红而泽，舌上胎滑者，以丹田有热，胸中有寒，邪气相传入里也。寒变为热，则舌胎不滑而涩。若热聚于胃，则舌黄。黑者，热极也。舌色淡黑二三点，用补肾降火之药。

唇口肿赤者，热极也。唇口青黑者，寒极也。脾肺病久，则虚而唇白，肺主唇也。

小儿口舌疮难用药，以大南星取半心龙眼大，一块，为末，醋调，涂儿脚心，甚妙。或吴萸为末，醋涂脚心，亦效。乳母宜服凉膈散。小儿口疮，薄荷汁拭口内，西瓜水徐徐咽之。

口疮 先以布巾蘸薄荷汤拭口，再用黄柏、儿茶、白枯矾为末，掺之。又方，蒲黄、青黛、硼砂、焰硝、甘草，为末，掺之。

凡治口舌疮，皆宜以布巾蘸薄荷汤，拭净后用药。

① 蒲：原作“治”，据《景岳全书》卷六十《口舌方》“碧雪”条改。

山坑，不必善。立春前一、二日收干，阴干二、三月。一切，用盐拌，蒸熟作菜，永无眼患。凡眼眼病，煎汤或研服，立愈。方系仙传。

皮肤痛不可以手按 用桑白皮一钱，干葛、柴胡、枯芩、玄参各一钱，地骨皮、大冬、麦冬各一钱半，甘草、木通各四分，麦一升，葱一握，水一斗，煎八分，食后服，取微汗。

耳中卒痛 用剪刀铁浆入即愈。又用盐五斤蒸热，以耳枕之，冷复易之。耳红肿内胀，用轻霜青竹管露在外将朽者，烧存性，为末，放入耳中，其疼即止。

耳内如有虫在内奔走，或血水流出，或耳痒不可忍者，把碗皮烧存性研末，贴毛管吹之，立愈。

耳内出水成疮 用野鸡屎为末敷之，并吹入。又用枯矾、胭脂土、海蛤蜊为末，先以细杖绞尽脓水，后用吹之。鸡屎白炒研敷之。耳内胀而，百草霜、锅底墨吹满耳，深入无苦，即自出。蚌壳半两，烧存性，麝香五分，细裹塞之。穿山甲烧存性，入麝香吹之。

耳内外恶疮及头疮肥疮痼疮^① 用黄柏半两，干马齿苋一两，为末，敷之。

耳出臭脓 用杏仁炒黑捣膏，绵裹纳入，日三四易。

① 痼（guō 锅）疮：生于手足间的痘疮。《本草纲目·主治下·诸疮上》：“痼疮生手足间，相对生，如茱萸子，痒痒浸淫，久则生虫。”《医宗金鉴·外科心法要诀·痼疮》：“痼疮每发指掌中，两手对生茱萸形，风湿痒痛事汗水，时好时发久生虫。”

之，妙。

疳耳脓汁 用青黛、黄柏末搽之。炮子黄炒油涂之，甚妙。又用出鸡卵壳，炒黄为末，油调灌之，疼即止。

耳中出血，蒲黄炒黑，研末掺入。凡人耳后发际搔痒，小窍出血，此名发泉。取多年粪桶箬，烧灰敷之，立愈。

百虫入耳 生油调铜绿，滴之。胆汁灌之，即出。川椒末浸醋，灌之。杏仁捣烂，取油滴入，非出即死。人乳滴之，即出。

蜒蚰入耳 芝麻炒研，作袋枕之。麻油作煎饼枕卧，须臾自出。

香油虫入耳，用冰片、地龙、硼砂吹之，或以香物引之。生乳少少灌入，即出。若入腹者，饮一升即化为水。

蚁入耳 穿山甲烧研，水调灌入。

蛆入耳 绿矾掺之，即化为水。蚤虱入耳，以菖蒲末炒热，袋盛枕之。蜈蚣入耳，炙猪肠掩耳，自出。蝇入耳害人，皂角、蠹虫研烂，同鱗鱼血点之。

蚂蝗入耳 取田中泥一盆，枕耳边，臭气自出。

水银入耳 以金枕耳边，自出。

水入耳中 薄荷汁滴入，立效。

耳中有物不出，弓弦打散，涂好胶，挂入耳中，徐粘引出。

耳中有物 如枣核等入耳，大痛不可动者，以火酒滴入，仰之半时，即可钳出。

头耳诸疮 并用肥皂煨存性，一钱，枯矾一分，香油调涂。

冻耳成疮 白敛、黄柏为末，生油调敷 生姜汁熬膏，涂。

耳足冻疮 橄榄核烧研，油调涂之

心胃脘分治

心痛与背相控，善噫，如从后触其心，低矮者，肾心痛也 腹脹胸滿，心无痛甚，胃心痛也 如以锥针刺其心，脾心痛也 色苍苍如死状，终日不得太息，肝心痛也。动作痛益甚，色不变，肺心痛也。

胃病或满，或胀，或食不下，或呕吐，或吞酸，或大便难，或泄利，面色浮而黄者，胃之本病也

左脉浮弦，或恶风寒者，有外邪，用藿香正气丸药店有。

按之痛止者，为虚，宜按以收之 勿食辛散之剂 白粳丸、参术散。

病久气虚血损，及素作劳羸弱之病患心痛者，皆虚痛也。

死血作痛^①，脉必涩，作时饮汤水下或作助

虫行，面上白斑，唇红能食，或食即痛，或痛后便能饮食，口中沫出。

治九种心痛 草果、延胡 五灵脂、没药、等分，为末，酒调服。

心腹冷痛 丁香白朮，白芍药各二钱，良姜二钱，炙甘草半钱，为末，每服二钱，陈米汤下^②。或加炮姜、白朮、附子、人参等。

积热攻心、苦毒入心，面目赤黄，身热烦躁，为热心痛 用金铃子、延胡各二钱，为末，酒调下 痛止，服枳术丸，宜山栀、黄连等。

心腹并痛 用附子、良姜各等分，各炒为末，入盐少许，每一钱，米汤下 二药必须各炒，若同炒则无效，名一炒丹 又延胡、胡椒，等分为末，每一钱，温酒下。

诸痛不可用补气药，气旺则愈痛，痛急时服苏合丸半粒。

心痛虽日数多，不吃饭不死；若痛止便吃物，即还痛，必须三五服药后，方可吃物 若不止饮食，痛必大作。

心胃痛，宜用葱、姜二物捣烂作饼，炙热贴脐，以熨

① 痛：原作“气”，据《杂病证治准绳·心痛胃脘痛》改。

② 半：原脱，据《世医得效方》卷四《心痛》“鸡舌香散”条补。

斗火熨饼上。

腹痛 中脘痛，太阴也，用理中汤 脐腹痛，少阴也，姜附汤 小腹痛，厥阴也，吴茱萸主之 大约大腹痛多食积外邪，脐腹痛多积热痰火，小腹痛多瘀血及痰或尿涩

寒热虚实辨 绵绵痛而无增减者，寒也 时痛时止者，热也 其痛有常处而不移动者，死血也 痛甚欲大便，利后痛减者，积也 腹痛脉滑，小便不利者，痰也 用川芎、苍术、香附、白芷为末，姜汁和汤，服时苍术香汁妙。

凡腹痛按之痛者，为实 按之不痛者，为虚 按之痛，重按却不痛者，此是气痛，乃虚寒证也 若重按愈痛而坚者，积也。

诸痛呕吐 寒宜理中汤，主热下寒者用黄连汤 黄连一钱，人参一钱，半夏一钱一分，炮姜、桂枝各一钱，甘草五分，姜、枣煎服。

诸般腹痛一服立止 苍术、香附炒、白芷、川芎、赤芍、枳实炒、滑石、神曲炒，各一钱，炮姜、陈皮各五分，炙甘草三分，水煎服。

腰痛有十 肾虚者，用青娥丸药店有。

挫闪腰痛 延胡、当归、桂心、杜仲，等分，姜汁炒为末，每二钱，酒下一又方，用神曲炒香一大块，烧令熏赤，好酒一大盏，淬酒中，便饮之，令尽，仰卧少顷即安

或以此酒，吞青娥丸更妙。

腰痛药宜菟丝子、牛膝、续断、威灵仙、破故纸、杜仲、胡桃、苡仁、芝麻、猪肾、核桃、五加皮等。

痛风 即痲痺。其症短气自汗，头眩欲吐，手指掌曲。其痛如掣者，寒多；其肿如脱者，为湿多；肢节间黄汗出者，为风多。身体痲痺者，彻骨疼痛，须大作汤丸治之。痛风多属血毒，多用芍药，佐以桃仁、红花、黄芩、威灵仙、甘草、黄柏、牛膝、苍术、麦汁。在上加羌活、桔梗、杜枝，在下加防己、木通。活络丹治一切痛风，筋脉拘挛沉痛，温酒下。

肩臂痛 宜先灸之，或用万应膏加肉桂、麝香贴患处。宜作左右开弓势，早、午、夜各三次。

脚气痛 外症全类伤寒，但初起脚膝软弱，项背转筋亦肿为异耳。脚气皆由气实而发，故不得大补，亦不可大泻。纵甚虚羸，亦须微微通泄，亦宜时取汗也。治要疏导大便而淋洗，宜羌活导滞汤、当归拈痛汤、二妙丸。最妙以三棱针数刺脚上出毒血，则肿消痛止。或刺爪中端，多出黑血。最忌热药蒸泡，恐逼邪入经络也。早饭饱食，午饭少食，夜饭不食弥佳。夜食则血气壅而增痛矣。

① 痲(huì会)：痲，结块；肿瘤。

脚气湿气，皆从足心涌泉穴起，朝夕常以两足赤肉更次用一手握指，一手摩擦，多时觉足心热，即将脚指略略动转，脚力强健，自无痿弱痠痹诸疾矣。

脚气药 生膝、石船、苡米、威灵仙 各为末，各一钱，白芷、数日花、何首乌、蓖麻叶 脚气药，取叶六叶之，一马、鹿茸、松节、五加皮、桑枝、川椒、槟榔、鳅鱼、鲫鱼、生栗、木瓜、黑豆、赤豆、紫苏。

小肠气痛 病在小腹，腹痛不得大小便，名曰疝。得之寒，亦有得之湿热者。苏叶一两，杉木炭一两，煎浓汤熏洗，妙。

疝痛劫药能劫疝止痛 山梔四十枚，烧去心，大附子二枚，炮裂，碎作二钱，水一盞，酒半盞，煎至七分，入盐一撮，温服，名仓卒散。又乌头、梔子各切，炒，研末，顺流水入姜汁调服。又方，朴枝、山梔、川乌同炒，为末，姜汁糊为丸，姜汤下。四十丸，大能劫疝。鲜苏叶揉软包之。

疝刺痛不可忍者服之神效 乳香、没药、当归、白芷、川芎、羌活、独活 各一钱，为末，每服三分，甚者五分。先煮好茶一盞，次掺药末在茶上，不得吹搅，立地细细嚼之，名神圣代针散。

治男子七疝，妇人带下痼聚，痛不可忍，皆任脉所

1 自：原作“白”，据文义改。

主，治法同。用山楝子炒、茴香、山茱萸、吴茱萸、食茱萸、青皮、陈皮、马兰花、芫花各二两，为末，醋糊和丸，温酒下五十丸。

治诸疝及外肾肿胀痛，一服立应。乳香、没药、木香、附子各二两、茴香二两、川楝肉、延胡、全蝎各二两、人参各一两，为末，酒糊丸梧子大，空心酒下百丸。

禁忌 凡疝病，非断房事与厚味，不可用药。

导引法，坐舒两足，以两手握大指拇，便是上头下极，挽五息止，引腹中气而行身体，去疝散焉。

疝病在妇人则为阴户突出，名曰阴疝。又言小儿偏坠，九有不效，名马兰花丸。橘核二两、海桐皮二两、昆布盐干二两、海带盐干二两、桃花盐干二两、山楝子二两、马兰花各二两，松槲五钱，为末，酒糊为丸梧子大，盐汤或酒下六七十丸。此方治四种疝病，即核肿胀偏有大小，或便如石，小则绞痛，甚则囊肿胀出黄水。在妇人则阴中突出，如菌、如马冠等症，乃肝郁胃气下陷，宜先服补中益气汤、逍遥散，又服此丸。

阴内如菌突出。用藜芦为末，猪脂调敷，一日一易，努肉自入。

阴肿痒极、便秘欲死。用橘皮、枳实各四两，炒香熟，绢袋盛，分两包，遍身从上至下及引伸处，以酒浸之，冷则换温者，直至腹中有枳实气，即效。又用四物汤加柴胡、梔子、丹皮、龙胆草煎服。

妇人阴户内，不论何病，总宜逍遥散。

妇人阴门边生疮，作痒作痛不止者，用蛇床子一两，花椒一钱，白矾一钱，水十碗，煎五碗，熏之洗之，五日愈。

妇人儿门内诸暗疾 当归一两，枳实一钱，白芍五钱，柴胡一钱，茯苓五钱，椿树根五分，煎服。如有火加黄芩，寒加桂枝，有痰加白芥子。

产门内生虫 鸡卵一付，以针刺无数小孔，纳入户中，则虫俱入鸡卵之内矣，一付全愈。后用白芍、当归各五钱，甘草一钱，龟子一钱，陈皮五分，泽泻一钱，茯苓一钱，白术五钱，煎服四剂。

产门外生疮久不效者 炒黄柏、炒白薇各一钱，轻粉五分，白芷一钱，冰片五分，麝香一分，儿茶、铅粉、樟脑各一钱，乳香五钱，一钱，为末修之，兼治各色之疮，俱神效。

淋痛 小便如粟状，小腹弦急，痛引脐中，皆由肾气虚有热也。夫凡小肠有气则令人胀，小肠有血则小便涩，小肠有热则小便痛。热者为血淋，不痛者为尿血。败精者名为砂，精结散者为膏，全有结者为石淋。皆不可用补药，又禁发汗。

劳淋者，苦倦虚损，小便不出，小腹急痛，宜四物加

1 散：原作“改”，据《丹溪心法·淋四十三》改。

知母、黄柏、滑石、琥珀、甘草梢。

血淋者，时下血，疼痛满急，宜四物加知、柏、泽泻、茯苓、甘草梢或用导赤散。

热淋者，便赤色，脐下急痛，宜八正散^①、导赤丸，或益元散加木香、槟榔、茴香各一钱，为末，空心服。

气淋者，小便涩滞，常有余沥，小腹聚痛，宜沉香散^②。葵子、赤芍各七钱半，沉香、石韦、滑石、当归、王不留行各五钱，青皮、陈皮、木香、甘草各一钱^③，为末，每二钱，空心下。气淋，气不可忍者，用通秘散^④。附子、陈皮、赤苓各等分，煎服。

石淋者，尿下砂石，令人闷绝，用枳壳散、益元散煎水，吞米复丹为妙。久服则大便通泄，石块自小便出，益元散专主石淋。治砂石淋痛剧，滑石、石膏各五钱，石韦、瞿麦、木通、葵子各二钱，为末，每二钱，葱白、灯心煎汤，蜜一匙下。砂石淋急痛，用硼砂、琥珀、赤苓、葵子、陈皮各一钱，为末，每用二钱，以葱白一茎，麦冬^⑤一粒，蜜二匙，煎汤服。

膏淋者，尿出如膏，热中涩痛。沉香五分，葱白一茎，

① 秘：原作“秘”，据《丹溪心法·淋四十三》“通秘散”条改。

② 各：原脱，据文义补。

③ 煎：原脱，据《古今图书集成医部全录·淋浊遗精血汗门》“滑石”

④ 甘：原作“甘”，据《古今图书集成医部全录·淋浊遗精血汗门》“硼砂散”条改。

同捣取汁，儿茶二钱半，琥珀一分，为末，调白沸汤，入葱汁，空心同服。如神。又方，用白苓一两，桑螵蛸炙、鹿角胶珠、秋石各五钱，为末糊丸，人参汤下。

砂淋者，茎中有砂，涩痛，轻则为砂，重则为石。用海金沙七钱半，滑石五钱，为末，每二钱，以木通、麦冬、车前子煎汤，入蜜服。又方，用石首鱼头中骨五斤，火煨为末，滑石五钱，为末，分作二服，木通汤下。又治砂石淋，每尿时器中刮刮有声，痛楚不堪，用杜牛膝即虎杖根一两，水五盏，煮耗其四，留其一，去滓，以麝香、乳香各少许，同服服之。又方，用瓦松煎汤，重洗小腹，约两时即通。淋症又见小儿门，参看可也。

冷淋者，必先寒战，而后小便。用生附子、滑石各七钱，木通、制半夏、瞿麦各一钱一分，姜五片，灯心一扎，煎服时加蜜少许。

诸淋通治 散热利小便，只能治热淋、血淋。其砂淋、石淋，膏淋，必须开郁，行气，破血。蒲黄、牛膝滋阴黄柏、生地。

治少腹痠用青皮、黄柏。治淋用大黄、玄参、细辛、黄芩、车苓、黄芩、甘草梢、当归、梔子、海金沙、地肤草汁、冬瓜汁。

通治小便膀胱积热，或脬闭不通，或遗尿不禁，或

1. 剉(bào包): 象声词。

2) 制:《医学入门》卷六《杂病用药赋》“生附散”条无此字，可参

白浊如汁，或膏淋如脓，或如梔子水，或如砂石、米粒，或如粉糊，俱热证也，用郁金、黄连丸悉主之。苈石、白朮各四两，熟牵牛子头末二两，黄芩、大黄、琥珀各一两，郁金、黄连各二两，为末，水丸梔子大，沸汤下五七十丸。

妇人产后诸淋通治神方 白茅根二钱，瞿麦、白朮各钱半，葵子、人参各一钱一分半，青贝、桃胶、苈石各七分，石首鱼头中骨二钱，蛭、甘草五分，紫贝二钱，各二钱，分三剂，入姜三片，空心煎之，空心煎服，或白朮末，用一钱，木通汤下。

小儿胎毒成淋 用紫雪和黄相细末，丸梔子大，每十分下二先下二白丸，至二时又以二白丸作一服，以热汤下，以食物压之。半日淋下后，又以陈皮、桔梗、木通煎服。

茎中痒痛 用八味丸加车前子、牛膝煎服。八味丸也。

茎中痛不可忍 川楝子肉、甘草梢各一钱，玄胡索七分，人参五分，赤芍四分，琥珀、泽泻、柴胡、当归尾、青皮、黄柏各三分，灯心一团，空心煎服。

头痛 风入太阳，用川芎一钱，细辛一钱，白芷一钱，柴胡、半夏、甘草各一钱，芍药一钱，煎服。又方，蔓荆子、白芷、甘草、半夏、细辛各一钱，川芎五钱，煎服。又

方，用蓖¹麻子一握捣碎，同枣肉丸如黄豆大，外用丝绵裹之，纳鼻孔中，少顷必有清涕流出，即将丸药取出，头疼即愈。不可久放鼻中，必致脑髓流出，反成不救之症，慎之。

头痛用川芎、沙参各一两，蔓荆子、细辛各一钱，水煎，去八分，加酒半碗，非治脑²。乃肾水不足，邪火冲入于脑，终朝头昏，法当大补肾水。若止治风，则病更甚也。六味加芎、归、麦冬、玄参、玉竹治之。

治风用柴胡、麦冬、郁李仁各五钱，白芍一两，辛夷、枳椇各一钱，白芷一钱，水一碗，煎汤，入酒一酒杯，醉后愈。最好者再饮之，饮酒必以酒为效。风入胆，胆应脑，脑热则鼻下清水。

治眼用³，黄连一钱，花椒七粒，明矾一分，荆芥五分，姜一片，一日洗七次。

与火之患，目目不明不⁴，无移是也。有实火者，红肿如含桃，泪不⁵，酸痛着明，多眵⁶也。虚火、实火，以此辨之。

虚火眼 人乳一大杯，生地一钱，玉竹一分，明矾一分，煎汤，一日洗七次。又方，柴胡、防风各一分，黄连一分，花椒七粒，明矾一分，水半碗⁷，饭前上茶，一日洗三次，二日止痛。按：此方可治实火。又方，人乳半大杯，黄连三分，

1 蓖：原作“革”。据《石室秘录·吸治法》“论头痛”条改。

2 半盂：原脱，据《石室秘录·上治法》“目痛”条补。

大枣一枚，明矾一分，人参一分，煎二沸，目洗七次，一日愈。

目痛 柴胡、当归、甘菊、荆芥、防风、半夏各钱，白芍一钱，枳实、白茯苓各一钱，甘草一分，煎服，可洗。

目眶面涩，无泪而红赤者，非热也，乃肾水亏而虚火冲上耳。用六味汤加柴胡一钱，白芍一钱，当归、甘菊各钱，煎服。

目肿而痛，如针刺一般，宜直散肝胆之郁火。用柴胡、枳实、白茯苓各一钱，甘草、半夏各一钱，煎服。

努肉扳睛，睫毛倒生，用甘菊一两，白芍一两，当归半斤，柴胡四两，丹皮一两，威灵一两，沙苑二两，草决明四两，茯苓一两，麦冬、天冬各一两，枸杞子一两，为末，蜜丸。每日饥时服一两，一料愈。能母欲者，一料可也。

喉痛假热辨 喉门肿痛，炎如锦不绝，水滴不能下咽，人以为热也。然面颊虽甚，至早少轻；喉虽肿，舌必不燥；痰虽多，必不黄不成块，此乃假热之证也。急取利其少商之穴，出血少许。急以附子一钱，熟地一两，山萸肉一钱，麦冬、五味子、牛膝各一钱，茯苓二钱，煎服。盖少阴

① 努：原作“努”，据《辨症奇闻·目痛》改。

② 威灵：原作“萎灵”，据《石室秘录·长治法》“论努肉扳睛”条改。

之火如奔马，凡野水大耗，元阳不能下藏，无水以养火而火必上越，结成肿痛，状似^①双蛾，实非蛾也，妄治必死。少商穴在手大指端内肉^②，去爪甲角如韭叶，出血以泻诸脏之热。

阴虚双蛾，附子一钱，盐少许，用一片含在口中，立时有路，后以八味丸一两服，白汤送下。有目重夜轻者，山豆根、桔梗各三钱，半夏、甘草各一钱，煎服。

口舌生疮者，心火郁结也，黄连一钱，葛蒲一钱，水煎服。

心痛 枳实、乳香、白芍、炒梔子各一钱，甘草五分，煎服。此方专治火痛、呼号口渴者效。

心痛 苍术一钱，白芍五钱，当归一两，肉桂、良姜各一钱，水煎服。此方治寒邪犯包络，散肝邪，即所以散包络之邪也。

辨症 肝邪之犯，必恶寒，见水则仇^③，以火熨之则快是也；热邪之犯，见水喜饮，手按之则痛甚。治宜审清，不可误也。

心痛有吁号不能安于床席者，肝经热也，急泻肝以救包络之热。用白芍一两，当归、炒梔子各一钱，生地五钱，甘草一钱，陈皮八分，煎服三剂。胃寒而痛者，在心之上；

① 似：原作“以”，据《石室秘录·逆医法》“论双蛾”条改。

② 肉：《外科大成·针砭灸烙烘照蒸拔等法·针》“针少商穴法”条作“肉”。

③ 仇（chóu 仇）：原作“雠”，据文义改。

脾寒而痛者，痛在心之下与左右也。

腹中疼痛欲死，手按之转甚者，乃火扶去与食也。用甘草一钱，白芍五钱，茯苓、枳实各一钱，柴胡、枳实各一钱，山楂一钱半，煎服。

腹痛手不可按者，用枳实一两，白术一两，芍药一钱，炒焦，酒煎服。芍药最能安胎，又能逐邪而化物，愈久愈妙，最宜多备，炒焦用。

臂痛肩膊痛 当归一两，白芍一两，柴胡一钱，羌活半钱、秦艽各一钱，陈皮五钱，附子一钱，白芥子一钱，水六碗，煎二沸，入酒二碗服，以汗为度，此肝气郁也。亦有从痰治者，宜审脉及症，消息之。

脊疝者，膀胱之气化不行，故上阻滞可作疝，治当清其膀胱之火。盖膀胱借肾道而行，所以脊脊作楚耳。用熟地一两，芫花仁五钱，茯苓、芡实各五钱，泽泻、车厘子各三钱，桂心三分，煎服。

背脊骨痛者，肾水衰耗，不能上润于脑也。黄芪、熟地各一两，山萸、麦冬各四钱，五味子一钱，白术五钱，茯苓一钱，防风五分，附子三分，煎服。念此则生水，必多服，乃能取效。

腰痛用白术、芫仁各一两，芡实一两，煎服。此乃弹弓之故。

① 芫：原作“芫”，据《石室秘录·完治法》“论两臂肩膊痛”条改。
② 一：原脱，据《石室秘录·长治法》“论背脊骨痛”条补。

腰痛不能俯者，水湿也。用柴胡、泽泻、猪苓、白芥子各一钱，防己一钱，白术五钱，山药一钱，甘草五分，肉桂三分，煎服。轻者四剂，久病二月有效。

腰不能直者，风寒也。用逍遥散加防己一钱，煎服。如久病则改用白术一两，杜仲一两，合逍遥散，酒煎服。逍遥散见妇人方。

腰以下痛，两足痛，肾虚加湿也。用黄芪半斤，防风、茯苓各五钱，车前子一钱，苍术五钱，杜仲一两，肉桂一钱，水十碗，煮三沸，取汁三碗，入酒二碗，醉而愈。此由风入四肢及头上、背间、腰下也。

手足麻，肝木郁也，用逍遥散加炒枳实、半夏、白芥子各二钱，煎服。

两腿酸重，此湿气入于骨中而皮外无湿也。用薏仁一两，茯苓一钱，芡实一两，肉桂一钱，牛膝一钱，草薢一钱，煎服。须久服乃效，或丸服。

两足弱不能步履，气虚不能运用也。用补中益气汤加牛膝、石斛、人参各三钱，黄芪一两煎服。

两足骨中寒痛，用薏仁一两，白术五钱，芡实、杜仲各一钱，茯苓一两，草薢一两，肉桂、牛膝各一钱，煎服。一月不可改方。寒湿集于双足，将成痿也。又方，白术四两，苍术半斤，山药一两，车前子一钱，牛膝一两，生黄芪一两，

1. 各：原脱，据《博奇主男科》卷下《麻木门》“足弱”条补。

杜仲四两，肉桂一两，为末，蜜丸，饭前酒下一两，一料必效。

疔疮，沙参一两，橘核、肉桂、柴胡各一钱，白芍五钱，陈皮、吴茱萸各五分，煎服。孙真人治疔用此，乃疔之病也。

阴肿如牛，取诸葛菜洗去泥，打烂封之，神方也。

外科方

欲发痈疽之候 凡发热憎寒，头痛恶心，筋脉拘挛，气急烦闷，或疔毒多年，皆是欲发痈疽也。懊郁不遂志欲之人，多有此疾。人患口疳，必生痈疽，吃金银花汤最妙。

热肿则阳气内郁，故而红肿、皮肤微高、气面坚厚，或痛或痒，谓之肿。有因风邪而得，则肿使色白；有因热毒而得，则肿使色赤。血涩不通，风邪内作，即无头无根；气血相搏作者，即有头有根。疔发深而不痛者，胃气太虚，因虚而不知痛也，必死。小按即痛者，病势浅；大按乃痛者，病势深。男以左边为重，女以右边为重。

肿高而软者，发于血脉；肿下面坚者，发于筋脉；肉色不变者，发于骨髓。疔疔有热，则气血行而生肌；阳证

① 欲：原脱，据《东医宝鉴·杂病篇·痈疽》“痈疽欲发之候”条补。

无热，则气血涩而不敛。未溃而痛者，泻之；已溃而痛者，补之；其有秽气所触者，和缓之；风冷所逼者，温散之。

腐者，气血郁积，瘀肉为脓也。脓溃则肿退皮宽，痛必渐减。而反痛者，此为虚也。

痈疽发于内者，当审脏腑。如中府¹，心之腧，隐隐而痛者，肺痈；上肉微起者，肺痈也。巨阙属心，期门属肝，章门属脾，京门属肾，中脘属胃，大枢属大肠，关元属小肠，若有上证，仿此辨之。

少阳厥阴二经，血少，肌肉难长，妄用驱青利药，以伐其阴分之血，必死。

辨脓法 但以手掩肿上，热者为有脓，不热者为无脓。按而陷者，其脓深；按之即痛者，其脓浅；按之软而即复者，有脓；按之强而不复，无脓也。按之坚硬者，未有脓也；按之半软半硬者，已有脓也，宜急破之。重按乃痛，脓之深也；轻按即痛，脓之浅也。

坚硬脓稠者，为实；松软脓稀者，为虚。救脓不去，用白芷，不可用白术，术能生脓也。醋和雄雀屎，敷痈头上如小豆大，其头即穿。

辨晕 真晕生于疮口之傍，如红筋之状，见晕则非关

1. 雀：原作“雀”，据《肘后备急方·治痈疽如乳诸毒肿方第三十六》改。

症矣。一晕、二晕、三晕尚可，四晕必死。

治法大略 初发，则表者散之，里者下之，火以灸之，药以救之。刘宗素法曰，补填脏腑令实，勿令下陷之邪蔓延。外以火灸，引邪透出，使有穴窍着而不乱，则可转死回生，变凶成吉矣。

仙方活命饮 治一切痈疽疔毒，未成者则内消，已成即溃，排脓止痛消毒之圣药也。金银花五钱，归尾、皂角刺、陈皮各一钱半，乳香、没药、天花粉、白芷、赤芍、甘草节各一钱半，防风七分，没药五分，穿山甲炒，五分。热肿甚者加人黄一钱或五钱。在上者炒，在下者生用，酒、水各一盅入瓦罐封口。煎一服后，再饮酒一杯，以香敷患处，侧卧而睡。忌食物、铁器。毒在上背，角刺为君；在腹，白芷为君；在四肢，银花为君。予每用此方治外症，以时随症加减分两。自初发以至收功，用至五六剂者，无有不效。但虚人无火，则不用人黄；溃后不用角刺、甲片，其余则不敢增损。虚证溃后，酌加参、芪。外症只此一方足矣。倘有加减，不过地榆、川芎、连翘、山梔、芩、连、生赤首乌等。阴疽恐侵脏腑，不过苍术、地榆皮、芪、术、桂皮少加，四君随症施治，总以此为准。

飞龙夺命丹 **梅花点舌丹** 治一切发背、痈疽、疔疮、恶疮。服之便起发有头，不痛者便消，已成者即愈，此乃恶证中至宝也。每服先以葱白一寸，病人昏迷，叶有

了心，男左女右，将药丸在葱内以热酒一二盏送下，被覆约人行五里之久，再以热酒数杯助药力，发热、汗大出为度。如无汗，再服一二丸药店有，不备方。

痈疽因积毒在肝肺，当先助胃壮气，使根本坚固，再以行经活血药为佐，参以经络、时令，使毒气外发，可以内消，此治之宜早也。始觉患起高肿五七日，忽平陷者，是内攻之候，急以内托散治之。用人参、黄芪各半斤，当归、白芍、厚朴姜制、桔梗、肉桂、川芎、防风、白芷、甘草等分为末，每一钱，木香酒调下，加白芍药。

替针丸 治脓成未破或脓出不快，白丁香一钱，硃砂末、没药、陈仓米各一分，研匀，以饭米丸，如粟米大，点疮上，即溃脓出，^①，好肉易生。

涌泉膏 治痈疽软而疮头不破，或已破疮头肿结无脓者。用罂粟壳，^②为末，研三粒葱膏，如小豆许，点在膏药中，视疮口处贴之，少顷脓出，即速去药。

痈疽破穴后，误入诸毒水，^③用沙糖、糯米粉各四钱半，生甘草末一钱，入熟水少许，摊贴，毒水自出。驴、马汗一切毒水皆治之。

① 各：原脱，据《疡医证治准绳·疮疡·取脓》“替针丸”条补。

② 研：《仁斋直指方论·痈疽证治》“涌泉膏”条作“揉”。

③ 髻（xìng 兴）：肿起，肿病。《医宗金鉴·外科心法要诀·疥疮》：“髻肿作痛，破津黄水，甚流黑汁。”今特指淋巴结肿大。

④ 各：原脱，据《仁斋直指方论·痈疽证治》“去水膏”条补。

排脓生肌法 疮不内敛，由于肌肉不生，腐肉不去，皆由脾胃不壮，气血不旺，必以补托为主，用上全大补汤①，与一②，常有回生起死之功③，不可轻用，以免减之。

脓水出多，心烦少睡，托里圣愈汤④ 地 参、芪、芎、归各三钱，煎服。

疮口深大方 用深山黄牛食塞满疮内，俟纸贴干，三四日后去之，妙。深山牛吃百草，故入药。又，白芷、大腹皮、露蜂房煎汤，淋洗拭干，以黄桑叶晒干为末，散⑤掺其中，常服内托散⑥，饮酒，食肥肉，自然生肌易合。

去恶肉方 恶肉不去，好肉不生，疮口不合 用雄黄一钱，枯矾一钱，生肌散⑦，研细⑧，⑨，勿使荣生⑩ 掺膏药⑪上贴之，恶肉自去 亦可打条去⑫

巴豆、雄黄，只去恶肉，不伤良肉 有死血不去，白丁香上之。

去恶肉，生好肌，用鹿角细末，醋熬为糊贴之，妙，名鹿角散。

洗法 脓血欲聚之时，当早晚朝夕洗疮，外舒其毒 才觉有脓，即暖醋煮艾叶煎之；才见恶肉，即煮药汤而去

① 愈：原作“俞”，据《外科心法要诀》卷二《溃瘍主治类方》“圣愈”条。

② 散：《普济方》卷二百九十《诸疮口不合》“痈疽疮口深大方”条作“撒”。

之，万不可误，迟则毒侵筋骨矣。

凡疮肿初生，一日，急用药汤灌射之，一日，再灌，再灌，再灌，在四肢者，浸渍之；在腰腹背者，淋射之；在下部者，浴渍之。如药二两，用水二碗，煎一碗半，以绢帛蘸药水，温渍患处，稍凉则急令再温，勿用冷者。日用五七次，以肿消痛止为验。

凡疮有口，用此汤洗。猪蹄两只，煮软，刮去上油下皮，用清汤加白芷、生甘草、羌活、黄芩、芍药、露蜂房、当归各一钱，投药中再加十数沸，以帛温洗恶物令净，避风及秽气触冒。

解毒汤 治痈疽已破未破，皆宜洗之。溃烂，最要洗净，然后用药掺贴。黄柏、泽兰、甘草、荆芥、赤芍、大黄、白芷、当归、独活各一钱，煮酒，入葱白五根，大枣五枚，去核，水二升，煎，乘温重洗。如溃烂者，入猪蹄一只同煎，可免于痛。一名水师精明。

洗毒汤 洗一切疮肿。苦参、防风、露蜂房、甘草各三钱，煎洗。

去疮中脓血毒水，用桑灰淋汁浸洗。

盐汤温洗痈疽肿毒，日洗二三次，最妙。

掺贴法 凡疮肿初生，似有头者，即以温热药引出热毒，于四畔赤肿处贴生肌药，折伏热毒，驱邪逐恶。

贴膏药法 疮口有脓血不净，须用药汤洗净拭干后，却用膏药之，若有脓血水流出，用纸揩

之，一日一换；浓白浆上，则一日一换。凡搽药之时，须研极细，则不痛。

鲫鱼膏 鲫鱼^①，甘草节八钱，麻油^②十二斤，巴豆两二钱，桑枝为箸，铅粉收之。

乳香膏 治疔疮发背，疔疔白疔。乳香^①，青梅花叶白芷，同匀敷之。如疔，即水调之，令微有油散。敷之，包至方一按：疔初起，即于半夜，用不药油^②时涂之，日三四次时涂之，即消。又用盐擦之，日一次，亦消。又用雄酥^③青丹，或用京都灵应如意丹，或用好麝药，或用八宝^④灵丹^⑤，或用梅花点丹^⑥，但白芷，用津唾调至分，安膏药上，敷之，无有不散者。如发寒热者，服仙方活命散，一二服即散。芙蓉花叶，敷之亦散。

疔疮 紫雪丹^①，涂之，服飞龙夺命丹。

法宝丹，治一切神毒，故有内服。大花梅一两，白芷赤芍各一两，郁金一两，为末，茶调拌之，上则换新者。

凡疮疖破头后，俱用升药^①，安少许药上，贴之，自能提脓。至三四日后，脓根拔出，少加熟石膏于升药内，匀如桃花色，收膏药上贴之，直至生肌，神效无比。

① 散：原作“敢”，据《刘涓子鬼遗方·刘涓子治痈疽神仙遗论》“乳香膏方”条改。

② 丹：原作“内”，据文义改。

升药提过之后，用此手拈长肉，搽右膏^丁，东丹^丁两，研搽。又治烂腿赚疮。

流注初起，宜葱熨法，

红丝疔 疔有一条红丝线直上者，急用葱烙于红线所至处刺出血，又刺起其丝，急以雄黄、乳香等药于疔处内涂之，不可必穿，此药多入于疔是相部，不急治则死。或穿至骨节处，或至化骨，急以凉水涂之，一日数次。惟已溃者忌服之。

金银酒 治一切疔毒、疳疔、恶疮，不拘发在何处初发敷此，白及白中一个银花厚捣碎，入酒调和，涂敷四周，中心一孔。又取五加皮酒，生甘草一两，入砂锅内煮一斗，水一斗，煮六斗，入好酒一斗，煮一斗，分服，最妙。或加当归、黄芪各一两，无妨。治小疔。头，另有方在汤火伤门。

风仙花白梅可发背，取花连根叶捣碎，先以米醋洗患处，后敷之，一日一换，如神。

鬼馒头叶 取汁和蜜饮数碗，以毒散之，治背疮效。

茨菇 取根蒂捣，敷即青即消。煎服亦效。

脂麻油 疔疔毒疮初起，使毒不内攻，麻油一斤，煎十余沸，俟冷，入好酒二碗，分五次，一日一夜吃完，此神仙截法。

丁 东丹：又名铅丹、黄丹，橙红粉末细腻，辛寒有毒，外用于拔毒生肌膏药中。

甜瓜子 最为畅胃腹内痛要药 为末，酒服二钱

蜀葵花 诸痛疮肿毒，痛不可忍，葵花根煨捣贴之，立效 黄蜀葵花叶，入盐研煨，敷之亦效

葫，小蒜也，治痈毒疮肿，叫呼不得卧 取独头小蒜细捣，麻油调，厚敷，干则易，神效 又芙蓉叶末，醋调敷

商陆根和盐，敷恶疮效 马兰头汁，治火丹圣药，冬用根调六一散敷。

芩根叶 痈疽未成脓者，芩根叶捣敷，日数易，肿消。

醋 醋磨京墨，四围敷之 生姜、猪胆同涂，痈肿即消。

赤小豆 治痈肿法，赤小豆末、鸡子清调涂，治一切肿毒。

荆芥 捣煨和醋敷疔，神效 又煎服之

人尿，疔疽欲死，取野人干屎，烧存性，醋和如泥，敷肿上，干则易，甚良 又治疔肿，封其上，一日根烂 人有生疔走黄者，以此灰酒调服。

舌菌初起 用犀角、黄连、大黄、朴硝、硼砂、蒲黄、百草霜为末，掺之；内服导赤散、逍遥散加减，效过多人。

① 葫：大蒜的别称。弘景曰：“今人谓葫为大蒜，蒜为小蒜，以其气类相似也。”

发背诸痛肿，未有头者，用湿纸贴¹上，先¹处便灸之。痛者灸¹至不痛，不痛者灸至痛。

恶毒痛肿连阴及小腹¹不可忍者，用茴香苗叶打汁一升服，日三四，渣敷肿¹上。冬月根亦可用，投¹验。

治诸肿毒，用大黄土、飞丹、米醋调涂。又肿未成¹脓，白牡蛎末水调涂，干更¹上。又，凡肿毒已¹溃，未溃，用鲤鱼烧灰，醋调涂，未消再涂。

一切痈疽发背，用冬瓜一大块含疮¹上，热即易之，瓜未¹尽而疮已¹敛小矣，即用膏药¹治之，此法神妙。

一切痈疽内攻未出脓者，用葵子、水吞三五枚，逐作¹窍出脓。一方吞葵子百粒，当日疮头开。

治痛¹冲、¹鼠瘻、¹蛇虫、¹狂犬等毒，并用¹紫荆煮汁服之，亦可洗¹。

鹿角胶一片，水浸软，贴¹肿当头，肿溃脓自¹出也，妙。

一切¹痛¹冲¹发背，初出¹疼痛¹难忍，用¹梧¹楼¹根¹为¹末，每服¹二钱，井水¹调¹下。又，以¹醋¹调¹贴¹之。又方，背¹疽¹有¹脓，用¹鳝¹头¹、¹马¹齿¹草、¹蛇¹皮¹、¹月¹石¹、¹土¹硫¹磺¹共¹研¹，以¹水¹搅¹匀。地¹上¹掘¹一¹坑，¹量¹疮¹大¹小，¹深¹五¹六¹寸，¹置¹匀¹在¹内。令¹患¹人¹以¹肩¹背¹坑¹仰¹卧，¹四¹边¹掘¹好，¹不¹令¹透¹风，¹须¹臬¹脓¹水¹退¹入¹坑¹内，¹其¹疮¹便¹回，¹大¹妙。想¹此¹法¹治¹各¹疮¹俱¹妙。

1 灸：原作“灸”，据《针灸资生经·发背》改。

乳痛 地黄汁敷之，一日数次，效。痛不可忍，用蜂房烧灰为末，每服二钱，水一盏，煎六分，食后服，或服后乃可用。又蛤粉、藕粉各一钱，同服。按：蒲公英、牛甘草、银花、黄芪各五钱，煎服。加酒一杯，渣敷，必效。

治痈肿疮疖用蜂房、蛇蜕各一，必无干、女子发一木，先以油熬槐、柳、杞、梅、桑条、约味白漆入，下煎二味，熬成膏，用帛摊贴，效。脓疮用蜡纸摊。又方，陈小粉炒黑研细，以醋调贴。

疔疳疔肿，用紫花地丁、苍耳木，酒煮用钱服，效，亦疗黄疸。如鲜者，打汁更妙，渣敷。

疔疳发背，痛不可忍，用灸针内式上占泥，取出阴干为末，以新汲水调敷，其痛立止。

疔疳疔毒，用黄蜀葵花，盐掺收入瓷瓶密封，经年不坏。每用，患处敷之。若无花，根、叶皆可。赤小豆为末，醋调敷即消。

脓水不十，用白龙骨一分、寒水石一分、黄丹一分，为细末，掺疮口。

疮内有脓不能自出，用白芍一钱、川芎一钱、白芷一两、轻粉一钱，为末，疮平者掺，深者用纸捻蘸药入疮口内。

生肌用白敛、赤敛、黄柏俱炒，各二钱，轻粉一钱，为末，先用葱汤洗净，乃上药。

生肌散，寒水石煨包煨，黄丹水飞，炒为末用，掺上生肌。又见便易。

肺疽日禁，用桔梗一两，炙甘草一两，每服七钱，水一盏，煎一盏，空心服，须臾再服为效。

肺疽喘急，坐卧不安，用桑白皮、甜葶苈各一两，各一两，为粗末，每服一钱，水一盏，煎八分，食后服，以利为度。

便毒^①，初觉肿痛，即用铁秤陀于上按摩数次，自消散。又方，胡桃七个，烧存性^②为末，食前酒调服，不过三次消。又方，用冬葵子为末，每一钱，酒调一两服，即愈。又方，用皂角不蛀者，烧存性^③为末，酒调七分服，立效。又方，用皂角子七个，水吞服，亦效。又方，用大黄一钱，煨牡蛎一钱，梔子、炙甘草、地龙去土，各五分，水盏半，煎一盏，温服，以利为度。凡痛疔无头肿，服此宣通立愈。又方，用黄柏、黄芩各一两，地骨皮一两，乳香、没药各一钱，为末，井水调，摊纸上，贴之。凡痈疔贴此，消毒止痛妙方也。

疔肿垂死，用菊花叶打汁，入口即活。冬用根，菊最治疔毒。又方，用磁石^④为末，好醋和，封疔上，根即立出。

疔疮 用蝉蛻、僵蚕为末醋调，涂四周，留疮口，俟

① 毒：《儒门事亲·治一切恶疮方》“便痈方”条作“痈”。

② 存：原作“在”，据文义改。

根出稍长，然后拔出，再用药涂之，大有功效。又用苍耳叶，烧存性，和雄黄醋调，涂疔上，十则易，不过十度，即根出。

鱼脐疔 疮头黑深，形如鱼脐，破之渗出黄水，四围浮浆者，为尤甚。用丝瓜叶、连须葱白、韭菜共打汁，调和服，其毒随患处脉下。如在肘者，涂涂各疮膀。在背中，贴心脐，并以帛扎住，俟肉下红丝皆白，即愈。

脱疽疔 久患消渴之余，多有此症。发于足傍名曰脱疽，发于足指名曰脱疽，赤黑者死，宜急斩之。治法先以隔蒜灸，内服仙方活命饮。重者色黯，先灸，更服寒命丹及补药，庶可保生。外治用桐油及无名、异煎一沸，入川椒一勾，剪葱叶在内同煎，浸七日后，单以此药贴疮上即安。

疔疮不出者，用巴豆半粒，微有末，以葱和蜜为膏，敷疔上，自出。

瘰癧方 用夏枯草煎汤饮，渣敷。又用旱莲草汁饮，渣敷。夏枯草、甘草加香附、远志、贝母，用十个人补汤，圣药也。

卒得患疮人不识者，用生藤根打烂，敷之。又苦竹叶烧灰，以手清擦诸疮。治一切疮，皆先洗净，而后用药。

大风疮五死：一皮死，麻木不仁；二肉死，割切不痛；三血死，溃烂成脓；四筋死，手足脱落；五骨死，鼻梁塌，眼断，唇翻，声哑。

洗法治满身疮烂，地骨皮、荆芥、苦参、细辛各二两，河水煎，熏洗，以通身出血为效。又治遍身癰疮，以桃、柳、桑、槐、楮五般枝煎浓汤¹，浸坐没颈一日，浴汤如油，即安。

疮烂遍身，散药用贯众、寒水石、硫黄、枯矾各二两，蛇床子二两，鲜皮、朴硝各二五钱，为末，腊猪油调敷。一方加滑石、地肤子、白芷、白薇、鳖甲、大黄、百部。

大庖疮²，形如鼓钉黄豆者，属脾，多生满面；形如绵花者，属肺，多生毛发；形如紫葡萄，按之紧痛者，属肝，多生于尻臀两阴筋骨之处。形如鱼泡，内多白水，按之不紧者，为大泡。初起即服防风通圣散³，再贴去内毒，再贴去硝、黄发汗，以去外毒，以后用加味通圣散丸。防风通圣散，大黄、硝、荆芥⁴不用、梔、芍、翘、甘、桔、芎、归、滑石、薄荷、苓、术、石膏、姜、葱，煎服，渣敷。亦可为末，搽之。

洗法治杨梅疮烂。防风、苍耳子、地骨皮、荆芥、苦参、细辛各二两，熏洗，以通身出汗、出血为效。又方，苦参、蛇床子、白矾、荆芥，煎汤，浸洗。又桃、柳、桑、槐、楮，浓煎浴。

搽药治杨梅大庖，遍身疮烂，杏仁十四粒，针挑入土烧干，白芷、轻粉二钱，冰片二厘，为末，猪胆汁或香油调搽。

1) 汤：原脱，据《串雅内外编》卷二《洗法门》“五枝浴”条补。

2) 各：原脱，据文义补。

忌食牛肉、鸡、猪、鱼、生冷及辛、热、酸、甘、辛热及盐。

療癰 妄用刀針割破，必死，可已。又已為刀点，服
此药，又用白胶香、麝香、降香为末，和出他，外以水
纸拖之，一夕自退。又未破者，用香、白胶、麝香、降香、
白、没药、丁香、端午草收者，用香、白胶、麝香、降香、
白、以桑枝为骨，色微匀，和等，出火气，七日收好。每
用摊贴神妙，只贴便消，不必服药。

结核者，火气热甚，在皮里膜外，多是肺病之证，用陈加酒大黄、枳实、柴胡，在翅下服。又高燥、青皮、贝母、陈皮，常服亦可。

结核在臂 陈加连翅 防风、荆芥、酒芩、桑木
角刺、僵蚕、入明香少许煎，大阴 一掌刮之积痰自出

痰核瘰气久不消 海藻 昆布 陈皮 珠珀 贝母、为末，
蜜丸，食后化 又外用生南星、醋煮冻之

瘰癧 瘰有五，瘰有六，皆气血凝滯而成。通治有螳螂丸，先須斷厚味。海藻、昆蟲、已布、桑白等，皆之藥也。

头上生疮如麻，用防风通圣散煎汤为末，酒浸焙二次，食后白汤调服，日三次。又盐汤清洗，用干布敷之，效。

上散，治头疮，又治疥痒诸症。配伍了，便众

① 来：《医学纲目·痼疽所发部分名状不同》“败散瘰方”作“已”

白胶香、寒水石各二钱，枯矾、黄连各五钱，雄黄一钱半，硫黄、吴黄各一钱，斑蝥一两，以灰是过，为末，腊猪脂或香油调。先以苍耳煎汤，洗大疮，后掌中捻药，量疮大小，却擦疮上，一擦即愈。

小儿癩头及身上诸疮 黄连五钱，蛇床子、五倍子各二钱半，轻粉一分，为末，荆芥汤洗后，调捣服。

鼠疮色紫黑，先以针刺去恶血，冷水洗净，乃贴膏药。忌日光、火气、阳气。如有黑肿未尽，再去血，以紫黑血尽为度。

鼠疮臭烂，先以海桐皮、石榴皮煎汤洗，后牛蒡子半斤，煎末，烧重之。或槐枝、葱白、川椒煎汤洗，拭干，方贴膏药。

鼠疮取虫法，用生鳝鱼数条，以香油涂腹下，置疮上，昂屈，以帛扎定。少顷痒不可忍，然后取，视腹下有小窍，即虫也，未尽再用。脚上小烂疮，鲫鱼骨洗净，用乃水洗贴之。

鼠疮用降真香烧存性、五倍子焙、麝香为末，先洗疮净，后敷之。

鼠疮并脚腿血风疮，用老松香如琥珀色者，瓷器内熬过，令冷为末。以清油或腊猪油调成膏，用青箬叶一斤，随疮大小，以针于光面上密刺眼，将膏涂在粗面上，油纸裹之。先用飞盐、葱、椒煎汤洗疮净，却将箬光面贴疮，绢帛扎好，至五日再洗换药。忌油、面、发物，甚验。又

方，用猪胆、黄蜡熬成膏，贴。又方，血竭末敷，以上为度。

脚上疮流黄水，用大黄、黄连、黄柏、轻粉、白矾、淡豆豉^①、伏龙肝为末，以花椒熬油，调敷，效。用油纸包疮上。

脚上疮久不愈，用老松香、樟脑、黄丹^②，白脂石灰、轻粉、川芎、白芷、蜈蚣为末，熔化松香，加清油和之，作隔纸膏贴，二日一换。或单用白芷、川芎、蜈蚣三味，煎汤洗，亦效。脚上疮久不愈，五倍子末搽之。

脚上疮用乳香、没药、赤石脂、黄丹各^③二钱，白膏、明，为末，桐油调作隔纸膏贴，效。又方，用槐、柳、槐、橘、桑枝各一把，煎汤洗疮。又用米泔洗过拭干后，以净黄蜡熔开，捻成薄饼子如疮口大七片，每日一洗一换，七日必愈。又用槐、椿、桃、榆、柳条、豕芥熬汤，时洗过干，用生黄蜡于纸上，量疮大小，排成十个，都拚在疮上。三日一次洗疮，除去着疮蜡纸膏一个不用，七日必愈。

凡脚上疮痒，新定。洗法屡验。用苦参^④一两，桑白皮五钱，生甘草、黄柏、当归尾、白芷煎汤重洗，无不止痒消肿者。价轻药易，可以便人。

① 豉：原作“鼓”，据《卫生易简方》卷九《疮》改。

② 各：原脱，据文义补。

③ 上：原作“土”，据《普济方》卷二七六引《德生堂方》改。

冷脓疮，用鹿角灰、油发灰、乳香为末，清油调敷。脓疮成白，久不十好，沙糖屑唾津调敷，日三次，日愈。

治诸疮，用马勃封贴，甚良。又方，蒲公英捣贴之，治恶疮、恶刺。

疔毒初起一二日内，用肥皂醋煮，捣涂即消。此方¹，可便村居。

一切青疮并人食毒物，用珊瑚砂、甘草各四两，入瓷瓶内，以香油²，浸之。遇有患者，令服酒一小盏，立效。愈久尤佳。

一切恶疮痛肿，用猪胆、姜汁、醋、好京墨，浓煮，以鸡翎扫之，效。

蛇头疮，用生黑豆为末，却将大槐子壳一个，入木丁内，笼缚在指头上，即愈。

多年疮口不干，用冬瓜叶焙为末，贴之，效。

面上生疮。用曼陀罗晒干为末，少许贴患处，³，一二日亦可。

遍身热毒疮病，粘不得衣被者⁴，用菖蒲叶⁵为末，铺于席上。令患者卧其间，仍以被覆，五七日可愈。又⁶，叶卧法，见痘疹。

1) 方：原作“万”，据文义改。

2) 粘不得衣被者：《卫生易简方》卷九《疮疖》作“贴着衣被不得”。

疮疥癣杀虫，用酸泔洗之。

诸般恶疮，过毒去死肉，用白矾一两，黄丹二两，醋炒三钱，为末同炒，去尽水为度，贴上。

治疮毒取吐恶心，用干胭脂半钱，绿豆粉一钱，研匀，新汲水调下，只一服，立止。

一切疮生肌，用白及、白敛、黄柏、黄连、乳香、没香、黄丹，为末掺之。

治恶疮，用雄鸡屎，阴干，烧存性，为末，香油调敷。又方，用燕窝内外泥食研细，以清油调搽。又傅作膏贴之。

治痼口疮，用菖蒲根捣汁，拭疮破搽上，根即拔出。恶疮、疥癣、风疹，用青蒿煎汤洗，能杀虫。樟脑亦杀虫。

鱼脐疮，痛不可忍者，先以针刺疮上及四畔作孔，用菖蒲汁滴入孔中，痛即止。菖蒲不可多食，令人昏目。

鱼睛疮，遍身赤白，头出水，发憎^①寒，朱砂、蝎酥、白面研末，放疮口内。

疮市痈肿表^②青^③，药用牡蛎、大黄、梔子为末，每五钱，煎服。

风疮用桔梗、防风、地榆、薄荷、地芥为末，每五钱，茶调下。

① 憎：原作“增”，据《卫生易简方》卷九《疮疖》改。

② 毒：原脱，据《卫生易简方》卷九《疮疖》补。

治诸疮，用紫草、黄连、当归、麻油各^①一两，熬枯去渣，乃黄蜡、大枫子油冷搽。

恶疮有虫久不瘥，用柏节烧油涂之。

恶疮连痂痒痛，用扁蓄捣烂封之，痂落即瘥。

一切疮肿，用紫荆木煎汤洗，除血长肤。又用山慈姑、紫叶捣为膏，入蜜贴之，候清血出，效。

游风、热毒、风疹、疥瘡，用苦棘皮煎汤浸洗，
小儿方。

风热湿疮痒，用马齿苋烧研，入青黛涂之。

恶疮脓水不瘥者，用黄蜀葵花木涂之。服之治诸淋，亦效。

疮上有风，水肿，疼，秘涩，用葱叶、干姜、黄柏煮汤浸洗，立愈。

治五般疮毒，用芷根炒存性，研末，猪脂调敷。

诸疮中风寒水肿痛，用芷白捣敷，能生肌。

反花疮，用马齿苋烧灰，猪脂调敷。

肺青疮如大风疾，用桑叶、茶一宿，日干为末，每服二钱。

一切热毒疮，蜚蠊屎和盐、醋调涂。马兰汁调六一散，亦治丹毒。

治臀中高疮，其疮常对在两脚，用桃叶、无患子皮烧研，

① 各：原脱，据文义补。

醋敷

治恶疮，用鲫鱼骨烧灰，敷之。

多年恶疮，或痛痒发烂，用马粪研，并肉末敷上，效。

历场风并鼠咬，用途中死蛇蟬骨烧，封之。又乌贼骨醋磨，先以布擦，肉赤即敷之。

鼠咬肿核痛未成脓，用柏叶烧灰，敷之。又炒盐热，置肿上熨，令热气下即消。

治诸疮用泔水盥洗，以绵拭水，取葵菜微火暖，贴疮引脓，不过二三次，脓尽即肉生。忌房事、色、葱、发物。痿音漏。

诸般疮作孔穴，多年不闭者，用龙葵根、小蒜、核葱、附子、雄黄、赤小豆、麝香为末，醋和作饼，贴疮上，以艾灸之，饼子焦黑即痊。

又方，用巴豆烧灰为末，贴疮孔内，蜡药封之，大妙。

疮内恶肉，用乌梅烧灰为末敷上，恶肉立去，极妙。想敷鸡眼亦妙。

切疮有烂死肉，用地榆木掺之，死肉自去，止痛生肌。亦治金疮。

患疮久不效，用豆豉^①为末，以猪油调涂。

① 豉 (biáo 标)：脆，《集韻·宵部》：“豉，轻脆也。”

② 鼓：原作“鼓”，据《卫生易简方》卷九《疮疖》改。

舌上生疮，胸膈痛，以豆豉末口内含一宿，即愈。

一切瘰疬，用松脂为末，填孔中满，每日填二次，十余日效。

一切恶核疮中有息肉如蛇出，用硫黄末掺之，其肉即缩。

治法以温散风冷为急，以水次之，生肌又次之。

凡漏疮，孔中多有秽恶，常须置风洗。用白芷、蜂房、人腹皮、苦参，煎汤重洗，干则取东阿石榴根皮为末掺，以杀淫虫。

取漏虫法：用艾叶、白芷、苦参，忌房劳，戒怒气，否则核大而水多。

熏漏疮方：艾叶、五倍子、白胶香、苦楝根，如烧香法，置长桶内，坐其上，熏之。

先量积热，久则为寒，宜用附子灸法、硫黄灸法。脓水不绝者，皆灸。冷漏多在腿足之间，内踝上一寸，灸壮。在上则灸肩井在肩上陷罅^①中、鸠尾。

下疳疮，用川楝子、黄连、瓦松、川椒、葱根、艾叶煎汤浸洗，立效。又方，甘草、赤皮葱、黑豆、槐条浸洗，日三。又治阴蚀诸般恶疮，蛇床子、地骨皮、人蓐、麻黄、荆芥、防风、枯矾、葱白，煎洗。

洗下疳习蚀，用黄柏、黄连、当归、白芷、独活、防

^① 罅 (xià 下)：缝罅，裂缝。如云罅、石罅、罅缝。《说文》：“罅，裂也。”

风、朴硝、荆芥，入铜钱五十文、乌梅五个、盐一起，煎汤，日洗四五次，敷药。

治下疳湿疮 黄柏以壳子^①取末，蛤粉为末掺之，妙。又鸡抱卵壳各只二枚，煨黄丹各一钱，轻粉、冰片各一分，为末掺或鸭子清搽。

白田螺壳溪港中陈久者，煨，入轻粉、冰片、麝香，香油调搽。

下疳妬精疮诸方通治 黄连、款冬花为末，敷。浸淫疮者，初生甚小，先痒后痛，汁出浸淫，湿烂肌肉，延至遍身则杀人，四肢流入口者不可治。用苦楝根烧存性，为末，猪脂调敷。湿则搽之，先用苦参、大腹皮煎汤洗之。又见小儿方。

小儿浸淫疮，用苦瓠一两，蛇蜕二条、柞木微炒，各五钱，桑叶半斤，合，为末，用鸡捶吊贴之。又胡麻生油喂，敷之。小蓟捣烂，新水调敷。鸡冠热血涂之。黑弩中土，水和涂之。

下疳 灯心灰入轻粉、麝香掺之，立效。又用橄榄烧存性，为末，油搽。肿不消者，用防风、荆芥、甘草、土膝，煎汤熏洗。又用益元散加荆芥、防风、何首乌，煎汤浸洗。女子阴户疮痛痒，同此治。

漆疮 用蟹汁涂之，或用杉木煎汤洗，效。

① 各：原脱，据文义补。

冻疮烂痛，生附子为末，面水调敷。

冻斗成疮，黄柏、白敛为末，盐汤洗后，敷。

冻疮皮烂，痛不可忍，大黄研细末，水调涂，痛立止。

葡萄疮，疮头如葡萄色，四周肿起，先追脉尽，次用冰梅掩之，神效。

人身发大疔口疮，一身可即如火疮，皆载白浆，不治则死。口后疮疔，一岁方大。取好蚕茧升麻，数洗拭，涂之。又煮桑菜叶，以蒜蓉贴之，数日即止。

小儿耳后耳边疮，通耳唇良效名。胡粉^①、黄柏、白芷、黄连、黄芩、轻粉各一钱，土四指^②或，麝香少许，为末，香油调涂。又黄连、枯矾末敷，妙。

口舌生疮，初发如莲花，根蒂小向下垂乃大。治法以刀决其根，烧铁烙以止其血，次以雄黄、轻粉、白芷、白芷、白敛为末敷之，以槐枝枕其牙颊间，无使口合。一两日，疮口定合，口自便。次日出脓，用生肌散敷之。此名内疳。

走皮癰疮，生甚堪堪，发如豆梅，蔓延两耳，流汁臭。先用桑寄生无^③桑枝、桑根皮各一握，白芷、黄连各一分，同汤洗之。候血尽，次用皂荚、竹笋支虎存胆、

① 胡粉：为矿物铅加工制成的碱或碳酸铅。

② 两：原作“雨”，据《医学入门》卷五“走皮癰疮”条改。

③ 各：原脱，据《医学入门》卷五“走皮癰疮”条改。

黄柏、白芷、蓝叶，等分为末，清油调涂，神效。手蹇疮，皂角、枯矾、轻粉、黄柏、黄连末，敷之。

痈疽去腐生新，止痛收口，乳香、没药搽疮上，膏药盖之。如腿烂，用黄蜡熔化，加乳、没鼎之，七日一换，如神。

小儿胎毒，头生红饼疮。先以艾叶、大腹皮、葱白煎汤洗，后生蓝叶、生艾叶入蜜捣，敷。

蛇缠疮 身上生疮，有头尾，似蛇形。初起艾隔蒜于头上灸之，雄黄末醋调涂之。又酒调服之。如口舌生疮，想亦可以此治之。

遍身生疮，状如蛇头，蜡矾丸，每服百丸，神效。

鱼目疮，遍身生疮，如鱼目，无脓，又名往虏疮。升麻浓煎入蜜，洗之。

人常近火，则生火斑疮，出汗痛痒，黄柏、薄荷洗之，或为末掺之。

高疮 生手足间，相对如茱萸，痒痛折裂，有孔如蝼，久不愈。用杏仁、乳香各二钱，硫黄一钱，为末，麻油入黄蜡溶化成膏，贴之。

一切热疮，郁金、黄连、黄柏、梔子、葵花为末，水调贴之。名葵花散。

① 蝼（guō 锅）疮：生于手足间的疽疮。《本草纲目·主治·诸疮》：“痼疮生手足间，相对生，如茱萸子，痒痒浸淫，久则生虫。”

② 各：原脱。据文义补。

通治诸疮遍身出脓血痛痒者 用升麻葛根汤加大麻、蝉蜕，名平血饮，与人参败毒散共合和，加薄荷、生地、麦冬、生姜煎服。人参败毒，茯苓、草、枳、桔、柴、前、羌、独、芎、芍，煎服。

治恶疮遍身痒及血风疮，连翘、赤芍、当归、荆芥、防风、牛蒡子、川芎、栀子、黄芩、瞿麦、木通、生地、人花粉、麦冬、甘草、灯心各五分，煎服，名连翘饮。

二黄膏，治一切恶疮。麻油二两，煎巴豆肉十粒微黑色，去豆入黄蜡二两，熔化，又入硫黄、雄黄末各一钱，和匀成膏，以药汤洗疮后，用此搽，效。

贝母膏，治一切恶疮。贝母四钱，生半夏、生南星、五倍子、白芷、黄柏、苦参各二钱半，黄丹一钱半，雄黄一钱，掺或蜜水调搽。

杀虫方 槟榔五钱，黄连一钱，穿山甲烧灰，五厘，麝香为末，涂。诸恶疮有虫，须用凤蛭、黎芦。

生肌黄蜡膏 香油、黄蜡、松脂油、发灰，熔化后之加乳香、没药更妙。

诸疮未合，风入为破伤风，湿入为破伤湿，二者害人最急，切宜慎之。急用鲤鱼目睛，烧存性，研敷，汁出即愈。各鱼目皆可用。

治大小丹、赤白痢，用苦硝煎汁，拭丹上。治火丹，用盐煎敷之。五色丹，名油肿，不可忽略，用榆白皮末和

鸡子清，敷。

治疮疹入腹，用蚕沙浓煎洗，避风①；

火游肿流，遍身赤色，入腹即死，用生猪肉贴赤处，其肉臭恶，虫鸟不食。治火丹赤肿，黄芩木水调涂，效。毒出肺经，想此方妙极。

五色丹毒，遍身散行，用干姜木煎调涂，五色②按：未敢轻用。

治时疾发豌豆疮及赤疮子未透，心烦狂躁，气喘妄语，或见鬼神，用龙眼一钱，细研，配前猪心血和丸，如鸡头大③，每服一丸，紫草汤下，心忪便定，得睡④，疮复发透，依常将息。

火丹痧⑤疹 升麻一钱，玄参二钱，干葛一两，青蒿一两，黄芪一两，煎服。又丝瓜子一两，柴胡一钱，玄参一钱，升麻一钱，当归五钱，煎服，治火丹神效。又方，柴胡一钱，白芍三钱，丹皮二钱，栀子炒三钱，玄参三钱，麦冬三钱，荆芥一钱，生地一钱，防风一钱，大花粉一钱，专散肝木中之火《石室秘录》：此胃火与肝火结也。

脚肿烂疮 先以葱汤温洗，后以白蜡一两，黄丹一两，甘菜地上蚯蚓屎⑥一两，樟脑一钱，雄鸡一钱，铅粉五钱，松香一钱，乳香六钱，一钱，没药一钱，制绿一分，轻

① 睡：原作“种”，据《本草纲目·木部·龙脑香》改。

② 痧：原作“疹”，《石室秘录·达治法》“论火丹痧疹”条作“砂”，据文义改。

粉一钱，儿茶一钱，冰片五分，麝香五分，为末，乘葱汤洗患处之时搽上，必然大痒，少顷流出黄水如全汁者数碗，再用葱汤洗之，又搽，又流，如是者三次，则水少而痛止。

疥疮 苦参五钱，甘草一两，银花一两，苍耳草八钱，荆芥一两，防风二钱，生黄芪一两，水，浴一日，必愈。又方，轻粉一钱，白矾一钱，防风一钱，苏叶一钱，油胡桃连油，三钱，捣成团子，擦疮上，一日即愈。

脓窠疮 当归一钱，生地黄一钱，熟地一钱，白芍、人冬、麦冬、茯苓、白术各一钱，川芎、甘草、柴胡、人参各一钱，荆芥一钱，苏叶、黄芪各一钱，四剂后必加疮口膨胀，去柴胡，加五味子二钱，又服四剂，疮知收敛。又鲫鱼膏贴之。

黄水疮 生黄芪一钱，防风一钱，水十碗，煎数沸，洗疮上。

紫癜风 苍耳子一两，防风一钱，黄芪一两，米汤丸，早服三钱。

头面黄水疮，流到即生，蔓延无休者，用蚕豆壳炒成炭，研细，加黄丹少许，和匀，菜油调涂，一日愈。

小儿或头面或身似杨梅疮，烂成孔者，用菜稿米泔

① 湿：《石室秘录·下治法》“脚胫烂疮”条作“湿”。

② 一：原脱，据《石室秘录·浴治法》“论治疥”条补。

③ 生：原作“二”，据《石室秘录·肌肤治法》“论脓窠疮”条改。

上气水滴下，以盘盛取搽之，数日愈。

腊髯^①头疮 皂矾一钱，炒红，棟树子一钱，炒，黄芩五钱，炒焦，川椒一钱，炒出汗，共研细末，以豆腐汁水洗之，待燥，用柏油调搽，随愈。

喉痹乳蛾 雄麻雀尿一、二钱，研末，沙糖丸，用绢裹，含咽，立愈。

咽中结块，不通水食者，以百草霜蜜丸芡实大，煎汝水调化一丸。

咽喉生疮，层层如叠，日久有窍，用臭橘叶煎汤，连服十日，愈。

唇口四围生疮 以旋覆花根存性，麻油调搽。

口舌糜烂 以大红蔷薇花之叶或根忌火炒研末，和冰片搽擦。

舌 饮食不进，取地龙十条，吴萸五分，共研，和生面少许，醋调涂两足心，以绢缚之，立效如神。^②又，小儿走马疳。

卒然舌大硬肿，咽喉闭气绝，^③急用皂矾五钱，炒，^④撬开牙关，将药末擦舌上，立效。再以百草霜，酒调，下三钱。

心胸一片无皮，溃烂成漏流脓，用荸荠为粉，日日掺

① 腊髯：即黄癣。也作癩痢、鬣髯。

② 霎(shà 煞)舌：霎，古代棺饰，垂棺两旁。霎舌，病证名。系指舌忽然肿硬，伸出口角，时时动摇的病证。

之，效。

乳上湿疮痛痒，用蚌壳煨末，和轻粉、冰片研匀，金银花汤调搽。

乳头开花，以寒水石研末，和冰片、白芥粉，水调搽之。

乳内有块防成乳岩 每日用山慈姑一钱，胡桃肉一枚，酒服，以散为度。

乳痛串乳，洞见内腑，年久不愈者，取拯船之槽上首手捏之处旧藤梯，剪下，以阴阳瓦上煨干末，日日搽之，或香油敷。

乳头黄泡疮，白蟹壳煨，橄榄核煨，寒水石、冰片干渗，或麻油搽，并治痘毒。

乳痛乳岩 黄瓜萎大者一个，去皮，留为末，子多者有力，甘草五钱、当归酒浸，焙，各五钱，乳香、没药另研，各一钱，为末，酒三升，入瓦罐内，慢火熬一升半，分二服，食后良久服之，乳岩可以绝根，名瓜萎神效散。

乳痛初起神效 用黄瓜萎一个，去皮，留汁，甘草五钱，没药一钱，或加当归、白芷、乳香。用当归一碗，煎一碗，分两服，即愈。凡此大忌刀针。

1 煨(huāi 汉): 焙, 烘干, 烘烘。

2) 或加: 原脱, 据《古今图书集成医部全录·妇人诸乳疾病门》“一醉膏”条。

3 用: 原脱, 据《古今图书集成医部全录·妇人诸乳疾病门》“一醉膏”条补。

乳岩初起，急用葱白捣碎，黄芩一钱，打烂为丸，实大，绵裹。如患左乳塞右鼻，患右乳塞左鼻，一行即消。乳房结核，白芷、贝母各一钱，一分为末，酒调常服。四十以外不必治也，妄治则死。

抱头先肿，或热或痛，然于手爪里边粘脓溃破，或爪甲俱脱，以雄黄入鸡子内，以患指浸其中一宿，次日更以蜈蚣烧研，重捣指一次，即消。蒲公英打烂，煮服。煎敷亦效。

冬月手足皴裂作痛，清油五钱，黄蜡一两，入胡粉五倍于末，熬令紫色取起。先以热酒洗患处，用药收干，以纸贴之，痛立止。

嵌甲疮五指俱烂 绿矾五钱，火煨研末，先以盐汤洗疮拭干，敷药，以帛裹之，一日一换。又方，枯矾五钱，黄芩二钱，麝香少许，用如前法。又方，陈皮浓煎汤，浸良久，甲肉自相离开，另去为中爪甲，外用瓦灰烧灰，和雄黄末掺，或香油调敷。

脚指间湿烂或指甲角入肉，便刺作疮，不可着履，用枯白矾一钱，黄丹五分，为末，掺之，食恶肉，生好肉，刮去甲角即痊。

阴囊湿痒妙方 煅牡蛎、黄丹、枯矾，为末，搽之，亲效。宇泰先生妙方也。

① 熟：《杨医证治准绳·手足皴裂》“黄蜡膏”条作“熟”

肛门痒痛 生艾、苦梓皮根煎汤重洗。大痛者，火也，秦艽羌活汤。穿山甲醋煨捣，鱼鳔捣如泥，贴之，痛即止。

凡大人小儿面颊两旁各生红白瘰泡，浸淫痒痒，每处直长一条，连生十余个，久则杀人，用端午日人家所挂刀茅，取下，连根叶切碎捣末，香油调搽，五六次即愈。

足趾脱疽 此疽发于脚趾，渐至全跖，逐节脱落，亦有发于手者。用土蜂房，煅研细末，以醋调搽，立愈，真神方也。须服石室秘录中保脱汤。方用薏米二两，杜心一钱，茯苓一钱，白术一两，车前子五钱，水煎服十剂。

凡疔疳发背初起，一日之内，一洗即消，真神方也。青田者，一服消。鸡子一枚，倾入碗内搅匀，入苡苡一钱，调和，清汤炖熟，好酒下，随量饮之，吃尽为度。

消毒神方 雄山芩一两，白芷一钱，土朱一两，松香一两，全蝎一两，白洋槐一两，共捣碎，固之留顶，药上置纸，周围一搽，疔疳初起，即消；已成者，搽一次，收小出毒，立愈。屡试屡效。

1 脱疽：疑为“秘录”。

2 保脱汤：见《石室秘录·奇治法》“人有手足脱下”条，亦称“郭显保脱汤”。

3 茯苓：原作“苻苓”，据《奇症汇》卷七《手足》“患手足脱下”条改。

4 坤：原作“顿”，据《验方新编》卷二十四“治疮毒初起”条改。

悬痈 生于肛门前肾囊后，初起如松子大，急用甘草四两，截为段，以急流水一大碗，文武火漫煎水炙之，水尽为度，劈开中心有水润为止。如无，再煎水炙，炙透捣碎。每服一两，用酒二碗，煮至一碗服。次日再服，料消尽。

又治悬痈流注 全蝎十个，洗去盐，瓦上煅研，配胡桃肉一两，捣匀，酒送下，一醉愈。

天行斑疮 头面及身，状如火疮，皆有白头浆水，不治杀人。以蜜水调搽疮上，再以蜜煎升麻拭之，内以芦根汤煮粥食之。

湿疮漫淫 芦薤一两，炙草二钱，研末。先以豆腐泔水洗净，抹干，敷之。

担肩疽疔 五倍子炒，研，黄丹炒，研，为末，醋调涂。

唇上生疔杀人，急以铜虫捣烂涂之，候刻流出黄水，肿消，神效。如无铜虫，以五谷虫一钱，糯米、白矾一分，麝酥一分，以烧酒化开，共调匀，涂疔上，少刻疔破流水，亦效。凡疔生唇上，即看大腮弯①有紫筋起者，急以银针刺出血，即瘥。

疔毒误食猪肉走黄必死，急捣芭蕉根汁服之，或救人屎灰服亦效。

① 弯：原作“腕”，据《外科医镜·附方》“化疔救唇场”条改。

拔疔秘方 鲇鱼鳞，用手刮下，不可见水，阴干收贮。用时以银花汤浸软，拭干，用银针挑开疔头，将一片贴于，以清凉膏盖之，一宿揭开，其疔连根拔出，后用生肌散收功。

凡农夫赤足下田，受热毒之气，足跖肿痛，以鸭毛煎汤，和皂矾洗之。

痔漏疮痛 取活鲤鱼鳞三五片，以绵裹如枣形，纳入肛门，坐片时，痛即止。痔疮初起，忍冬藤、石菖蒲煎汤洗之，效。

痔疮将成漏管 每日用笋过头蚕纸一张，晒燥，用小刀刮下蚕壳，以阴阳瓦煨黄，陈酒送下，连服十张，能除根。

疥疮 白薇一钱，白芷、茶叶、白芷各一钱，花椒一钱，炒研，蛇床子一钱，大黄、明矾各五钱，寒水石一钱，炒研，雄黄一钱，樟脑一钱，共研细末，用生腊猪油去衣膜打烂擦之，大效。

坐板疮痒 先以砂仁壳煎汤洗之，用茅草坑埤土之泥刮下，晒燥研细，麻油调搽，三次效。

头顶生疮如樱桃大，疮破则顶皮断，但日饮牛乳，自消。

1 刮：原作“括”，据《验方新编·疔疮部》“拔疔除根方”改。

2 刮：原作“括”，据《奇效简便良方·痔漏脱肛》“痔将成管漏”条。

3 埤：《验方新编·疔疮部·治坐板疮方》作“坎”。

遍体生肿块，名鱼脐疮，其色皆黑，用腊猪头骨煨研，鸡子清调敷，日三次。

有患乳瘤，灸^①然肿及头面，以蚯蚓屎晒干末，井水调搽头面。

肛门痛不可忍 郁李仁泥^②一两，羌活一两，大黄酒八钱，槟榔、木香、朴心、川芎各1钱，为末，蜜丸，下五十丸。微利即痊，切不可快利。

痔疮 有肛下疳者，有茎中出自津者，勿专出寒凉

痔治大约以槐花、槐角、生地凉血，川芎、当归、桃仁和血生血，枳壳行气，黄芩、黄连、枳子清热，黄柏、防己、泽泻去湿，麻仁、大黄润燥，秦艽、荆芥疏风，用水马散。又地骨皮浓煎，熏洗。

痔肿痒痛 威灵仙、枳壳各二两，煎汤，熏洗 又槐花、荆芥、枳壳、艾叶，煎汤，熏洗 又无花果叶，煎汤，熏洗。

肠风脱肛红肿 荆芥穗、朴硝汤洗 痔痛不可忍，绵花煎汤洗。又单用朴硝洗，妙。

洗痔漏神效 垂河柳根上须一把，花椒、芥菜子煎汤，先熏后洗，立愈 虫自出，须用河水洗

治五十年久痔、痔漏、脱肛肿痛效方 川椒川一分，

① 灸：《验方新编·头面部·头面突肿》作“突”

② 各：原脱，据《普济方》卷二百九十六《诸痔》“治大肠痒痛或肿闷”条补。

冰片半分，白雄鸡胆一个，取汁和药搽。先以药水洗净，上¹药妙。

黑地黄丸 治久疔、疔漏下脓血者圣药也。用苍术¹，川椒，熟地¹，五味子半斤，干姜茯苓¹一两，苍术¹，夏元钱，为末，枣肉丸，空心米汤下。疔毒宜食鲫鱼、鳊鱼。

仙²治胸背头面手足一切痈疽 五日之内，犹当内散。不论阴疽阳疽，俱用银花¹一两，蒲公英¹一两，生甘草¹一两，当归¹一两，大花柳五钱，水煎服，渣敷，二剂全愈。此治阳症，加生黄芪一两，同煎。

凡阳疽疮必然突起，其色红肿发光，疼痛呼号者是。若阴疽疮色必黯，痛亦不甚，但觉沉沉身重，其疮口不突起或现无数小疮口，以散出脓；而内消之法，与阳疽同治。

阴疽用附子¹二钱，人参¹一两，生黄芪¹一两，当归¹一两，金银花¹一两，白芥子¹二钱，麦冬¹二钱。总之阴疽宜用温热散之，不可用寒凉解去也。按：阴疽多生于富贵失势之人，加香附、川芎亦效。

末药³，人参¹二钱，乳香去油¹二钱，冰片¹一钱，血竭¹五

① 上：原作“止”，据文义改。

② 仙：《石室秘录·外治法》“论阳症痈疽、论阴症痈疽”条作“仙”。

③ 末药：《石室秘录·外治法》“论阳症痈疽、论阴症痈疽”条作“末”。

钱，二七一两，儿茶一两，水飞去砂，五倍子一两，簪贝一钱，贝母二钱，轻粉一钱，每为末，研至无声。

外痔 麒麟菜一两，洗，用大泉水煮烂，和白糖五钱食之，止痛。

凡人口舌生疮，用黄柏一钱，姜蚕一钱，枳壳烧灰，钱五^①，炙草、薄荷各五分，冰片一分，山豆根五分，共为末，一日搽三次，二日愈。

大拇脚趾忽然赤肿酸痛，以大黄、朴硝、石膏、姜仁，大下愈。

小腹有块自冲胸部，叫痛发厥，气平如故，止觉筋硬，此名横梁痛，治难见效。女子最多用破故纸一两，黑芝麻一两，拌炒。筛去芝麻不用，将破故纸磨末，酒丸，每三钱酒下水下亦可。

阴有疝发肋下，久则有声如婴儿啼，自药不效，惟灸阳陵泉穴二七壮即愈。阳陵泉穴在膝下一寸外靠陷中，伸而得之，在膝下外尖骨前。阳陵泉一穴在膝屈骨下一寸外廉两骨陷中，蹲^②坐取之。

疔药方 蜈蚣五分，玄参、冰片、麝香各二分，因路一钱，枯石膏，没药一钱，乳香一钱五分，苘胡一分，端午日碾末，用膏药，上挑破疔头，贴之。

① 钱五：《石室秘录·上治法》“论口舌生疮”条作五分。

② 蹲：原作“蹈”，据《针灸大成》卷七《足少阳胆经考正穴法》“阳陵泉”条改。

喉肉凸出疮，1者，乌梅肉、熟地炒为灰，研末掺之。

腿脚血风疮 黑鱼片取其皮，先将药水洗净，拭干，贴上鱼皮，神效。

癣疮 木槿子七个，土槿皮一两，斑蝥七个，俱五分，火酒浸七日，搽之。

湿气脚指烂疮 腊底陈油灰一两，炒黄研末，搽之立效。

疔疽大毒，腐去孔深，洞见肌膜者，用玉红膏堵塞疮口，自能生肌长肉收口，外科仙药也。当归一两，白芷一钱，甘草一两一钱，紫草一钱，麻油一斤，将前药浸七日，煎至药枯，刮去渣，将油再熬至滴水成珠，下白芷一两搅匀，次下血竭末四钱待冷，再下轻粉二钱待成膏，所用，愈宿愈佳。凡疮口深陷，以新棉花蘸涂此膏塞之，即日痊可。不得加减，恐反不效。

凡毒发于骨节间，此药能移之，或上或下，使无残疾之患。白皮一两一钱，紫花地丁八钱，乌鸡骨般、朱砂、雄黄、轻粉各一钱，五倍子二钱，大黄各一钱，牙皂八分，各为末，以醋同敷，毒之上截即移至下半截，仍照人虚实内服药饵，屡验。名移毒散。

又方，紫荆皮一两，炒，赤芍一两，炒，白芷一两，炒，白芍一两，炒，白芨一两，炒，独活一两，炒，为末，以酒和葱五钱，煎滚调涂，一日一换，肿消不痛为度。

切大疔，将成未成者，但用此药十数处，以膏药

盖之，明日视其发处之处，把微，搽入青水，乃用膏药贴毒，一或收药，即毒出而愈，真妙法也。此毒即即也，自然之理，名打泡神方。

打泡神方 用雄蟹一钱，胡椒一钱，巴豆一钱，厚朴一钱，共研末，涂于膏药上之。凡毒升程，只要药味在地。

代针提毒丹 此丹九分提毒功用，每用一丸，安毒顶上，药盖好，明日发一泡，药破出去青水，即清。又可代刀针破毒。川子仁一钱，雄蟹一钱，通草一钱，沉香一钱，黄、烟砂、白土、白丁香各五分，入药打碎，为丸如绿豆大，每一丸，安毒顶上，即破出头。

诸疮疥癣 水银一两，腊月猪油一斤，用马毛熬七日七夜，不住火，冷取膏，敷疮，不用水银。

诸伤方

金疮失血，其人当苦渴，然当忍之。禁食干食，可与脂肪之物，以止其渴。又不得多饮汤，则血溢出杀人也。又忌愤怒及大言笑，动作劳力。食忌酸咸、热酒、热羹等，皆使疮痛而死。又不可饮冷水，血见寒则凝，入心则死。折伤同此治法。

金疮，以逐瘀血为主。若去血过多，则调气血为主。

一九

伤重者，急冰中交回时，冰片铺在伤处，以帛扎定，血立止。

止血收口方 用白炭、老松皮、白芷、血竭、
为末，以之。早血同末，包妙。或用、常有未敷之、使月
以膏药同贴之、一日一次、以与此法。如不止、再贴、再
矾、为末、掺之。

在平地上，取一与男数人，用布，其，口，分

伤重欲死，取土一斗，以覆其身，人于其腹，浸坎而
中，一足久伤手，小尔一足伤足，一日乃愈，乃可以饮，出
血而愈。

傅山草书，纸本，行书，轴，北京故宫博物院藏。

刀枪伤腹裂肠出者：用槐花、川芎、当归、白芷、续断、芍药、甘草、人参、鹿角、土姜、附子、各等分，为末，每一钱，温水调服，日三服，立愈。误断指头、坠香未掺之，包以丝绵，七日必愈。

血瘀凝积欲死 人黄 1钱 蜀椒 1钱，川椒 1钱，梔子 5分，
酒煎，鸡鸣时服。

跌伤，出血流于皮下，痛楚不能转侧，大蓟一两，当归一两二分，穿山甲一两，瓜蒌根、柴胡、甘草各一钱，桃仁十个，为泥，红花五分，酒水中半煎服²。

丁 托：原作“托”，据《病医大全·急救部·金疮门主方》“金疮至重”。

2) 酒水中半煎服：《类方证治准绳·胁痛》“复元活血汤”条作“水一盞半，酒半盞，同煮至七分，去滓，大溫服之”

金疮中风，水卢痛，取葱一把，煨研，敷之^①立愈。

一切打仆刀伤，身体出血，内损脏腑，花蕊石散，^②入方掺之，童尿酒调服，妙。

跌仆断伤 当归1钱，大黄1钱，生地6钱，赤芍、桃仁各1钱，枳壳1钱，红花、丹皮、龟板各1钱，水一碗，酒一碗，煎服。

伤破血流不止 生白芍研细末，掩之，血立止。生半夏末亦妙。

跌打伤手足断折 急以杉板夹住手足，不可顾病人之痛，急为之扶正，凑合安当，倘有不正，必为妄人。细心扶凑端正，后以杉板夹之，再用千那脚、大黄炒黄、红花、当归、芍药各1钱，丹皮1钱，生地5钱，土狗十个，土虱十个，捣烂，先将药用酒煎，再入自然铜末1钱，调服，连汤吞之。一夜生合，神奇之至，^③《世医秘纂》。

凡堕落、压倒死者，急安好处，以手掩其口鼻，^④一食顷，候眼开，先与热小便灌之，妙。跌仆伤须用苏木活血，黄连降火，白朮和中，以童便煎服。伤在上，宜饮韭汁。

跌打伤，惊动四肢五脏，专用恶心，当先用通大便药和童便，服之立效。^⑤方见后。又苏木煎汁，磨降香涂之，不

^① 水卢痛……敷之：此11字《证类本草·葱实》作“水入破肿，煨葱敷之”。

可见水，神效。

头上有伤或打破，用药糊绢缚，不使伤风，慎之。

苏合香丸治打仆堕落扶惊，气血错乱，昏还不省。急取苏合丸三丸，温酒、童便调灌，即苏。

伤损极重，大小便不通，心腹胀闷，用大黄、芒硝各一钱，当归、红花、苏木、桃仁各一钱，厚朴、陈皮、木通、枳壳炒、甘草，各五分，煎服。

伤损痛不可忍。白术^上、当归^上、白芷、杜皮、乳香、没药、甘草，各等分，为末，每二钱，温酒调下。

陈王丹止血定痛。大黄^上，有灰^{六两}，同炒紫色为度。摊于地上^一，去灰青，为末，收伤处。生半夏末敷之，血立止。

伤药宜包白、人尿、酒糟、胡桃、旋覆根、降香、青蒿、和紫灰等。

包白入沙糖火烘，重热拍开，其中有涕，便将疮损处、冷则易热者，^{立立止}。包白、沙糖捣敷，亦妙。此打仆易便之方，故记之。

微伤血出者，白蜡为末，涂之。

破伤风有四因：一者卒暴伤损，风邪袭身；二者诸疮汤洗灸炙，逼毒发背；三者疮口不合，筋骨流孔风袭；四者疮口闭塞，气难通泄。多由亡血，筋无所营，故邪得以

丁 上：原作“士”，据文义改。

袭之。

破伤风者，诸疮久不合口，因热甚郁结而毒日不得宣通，沸热因之遍体，故多白腐，热甚生风也。凡口疮口，无汗者，中风也；口自出黄水者，中水也，并欲作疔，须急治之。又痛不在疮处者，伤经络，亦先治也。初觉疮肿起白腐，身寒热，急用防风、南星，等分为末，蜜调，贴之。伤在头面，急用水调青和雄黄敷上，非蜜调为度。若腰脊反张，身如身冷，不知人，急用蜈蚣细末擦牙，口出涎沫，立甦。亦宜按摩导引法。

破伤风多死，宜用防风、全蝎之类。在头面则白芷为君，防风头佐之；在身体及四肢则以防风为君，随身稍各用；在下部以独活佐之，杏仁研白面，等分，新汲调涂，效。

治宜四君兼四物，加陈皮、姜、枣。破伤风非此不除，用蝎和七个为末，热汤调服，起死回生。又宜二乌、天麻、蜈蚣、白芷。治法有在表、在里、半表半里，同伤寒三法。

治箭或针折在肉中。象牙屑水敷上即出。又用瓜蒌根捣烂敷之，日三易，即出。又用西塘、白芷和黑鼠研敷，并治恶刺。黑鼠想即头上虱也。

治竹木刺入肉针入肉。牛膝根嚼，掩之即出。瞿麦浓煎，饮之，日三次。又鹿角烧灰为末，水涂，立出。又山羊屎烧灰，和猪脂涂之，自出。又白梅肉嚼，封之，刺即

又鱼鳔敷疮十四日，肉尽刺即出。又鼠脑厚涂之，即出。又用王不留行为末，调服三钱，即出。

针刺入肉 生姜、槐皮、盐，等分，调涂，以帛扎之，即出。又方，用蓖麻子研，先以帛衬在伤处，敷上蓖麻，以石之，见刺出，即投去，恐药性利害，努出好肉也。加白梅同研尤好。

诸般杂物刺及鱼骨刺入肉不出，用白梅肉煮烂，研，布象牙末厚敷之，刺软立出。如咽中刺，则水调饮之。

鱼骨在腹中刺痛，用茱萸一合，水煎服。若骨在肉中不出，嚼茱萸封之，骨当烂出。

跌打损伤至重者 用白木耳、黄木耳亦可同焙为末，每服一两，用麻油调服，串陈酒调下，日一服，服四两，起死回生，活人多矣。

又方，桃仁、杏仁、梔子飞面，葱白捣汁，与醋调和，如码子大。右伤左手心握之，左伤右手心握之，中伤两心，右两手心握之。日换一次，握过三夜，伤痕提出，其效如神。

跌打刀伤即骨碎亦可治 小鼠七八个，多年陈石灰、土半斤许，共捣烂，做饼，贴堵上闭口，碎研掺之，或麻油调敷。

汤火疮 用刘寄奴为末，先以糯米浆鸡翎扫伤处，后掺末药在上，并不痛，亦无痕。但凡汤伤，先用盐末掺之，护肉不坏，后用药敷。又方，用白及末或白敛末敷，

汤火热油伤烂症，用寒水石、大黄、当归、黄柏、麻油敷或干掺。

软疔，小疔也。用野蜂房一个，烧为末，另用巴豆肉七粒，汤煎三沸，去豆取油，调蜂房末敷之，立效。又枯白矾为末，麻油调敷，亦效。又大黄、黄柏、当归为末，以生地汁调涂之，名三物散。

卷 三

血 症^①

血 凡口鼻出血，衄、唾、咳、喘等因也，有升无降，血动无主，故上出，以当补泻抑扬。血见热则行，血见寒则凝，血见黑则止。久视伤血，血病无多食咸。

呕血、吐血者，从胃而上溢于口也

咯血、唾血者，出于肾也。

咳血、嗽血者，出于肺也。衄于鼻者，口鼻血也。

痰带血丝者，或从肾、或从肺来也。

出于小便曰尿血，口血甜者曰血瘕。出于大便者曰肠风，口有痔也。

从汗孔出口衄衄，从齿根出口齿衄，从舌出口舌衄也。

从委中出口髀血，从九窍出口九窍出血也。

治衄血以凉血行血为主，犀角地黄汤入郁金、黄芩、阿胶、升麻、梔子、丹参。

呕血吐血 实者三黄泻心汤，虚者人参救逆散、茯苓

① 血症：原书“血症、痰饮、咳嗽、喘急”四篇在“妇人方”后，今据原书封面目录移至妇人方前。血症：此二字原无，据原书封面目录和版心目录加。

补心汤。

治咳血嗽血唾血咯血 咳本于肺，龙脑玛苏散 嗽本于脾，用六君子加味逍遥 咯出血者或咯红丝者，精血竭也，四物加姜汁、竹沥、童便、青黛。

先见红后见痰是胃虚火动，四物加贝母、花粉、山梔、麦冬、丹皮煎服。

先痰而后见红是痰火积热，降痰火为急，山梔地黄汤。

痰嗽带血者，此胃火热，血蒸而出，重者山梔，轻者蓝实。

先吐痰后见血是积热，先见血后见痰是胃虚。

便血 有实热者，当归承气汤 元气下陷者，厚朴煎、补中益气汤 内伤饮食者，平胃散加枳壳、槐花、当归。酒毒便血者，酒煎黄连丸。

血从齿根出 牙本属胃，牙齿属肾 外用绿袍散，内服生地芩连汤 羌活汤、香附 荆芥、槐花 百草霜、小蓟、蒲黄、薄荷、黄连、芒硝、青黛等。

舌出血，用文蛤散 五倍子、白胶香、牡蛎煅，为末掺之 又方用炒蒲黄掺之 又方用炒槐花掺之 又方亦小豆一升，捣碎煎汁服之 又方发灰二钱，醋调服且掺之。

血药 血滞用桃仁、红花、苏木、血竭、丹皮，血热用生地、苦参，血寒用干姜、肉桂，血虚用从蓉、牛膝、

枸杞、益母、夏枯、龟板，血痛用 乳香、没药、五灵脂、凌霄花，血崩用蒲黄、阿胶、地榆、棕榈灰、百草霜，血燥用乳酪，血结用醋汤和之，血不足用甘草，血色萎黑用熟地，血色鲜红用生地 脉洪实痛用大黄酒拌，和血止痛用当归。

治血防风为上使，连翘为中使，地榆为下使，不可不知。

大凡吐血、衄血，若出太多，必有瘀于胸膈者，当先消瘀而凉之、吐之 消瘀宜犀角地黄汤，用生地 一钱，赤芍 一钱，犀角、丹皮、黄连、当归、黄芩各 一钱 凉血宜生地芩连汤，生地、黄连、黄芩、栀子、川芎、赤芍、柴胡、桔梗、犀角、甘草各 一钱，藕汁磨墨汁调服

三黄泻心汤 治吐血大作，此乃热之甚也 大黄 一钱，黄连、黄芩各一钱，生地二钱，煎服。

人参救肺散 治虚劳吐血 人参、黄芪、白芍、熟地、归尾各 一钱，柴胡、升麻、苍术、陈皮、苏木、炙甘草各五分，煎服。

茯苓补心汤 治劳心吐血 白芍 一钱，熟地 一钱，当归 一钱半，川芎、白茯苓、人参、前胡、半夏各七分，陈皮、枳壳、桔梗、苏叶、干姜、甘草各五分，煎。

龙脑鸡苏丸 治咳嗽唾咯血 薄荷 一斤，麦冬四两，蒲

① 用：原脱，据文义补。

黄、阿胶各一两、甘草一两半、人参、黄芪各一两，为末，别以木通、柴胡各一两，用汤半碗，浸一宿，取汁用蜜二斤，炼一二沸，入生地末六两搅匀，入柴胡、木通汁，慢火熬成膏，然后将药末同水和为丸豌豆大，熟水下二十丸。

六君子汤 参、苓、术、草、夏、陈。

加味逍遥 归、芍、丹皮、白术、桃仁、贝母、牛蒡、黄芩、桔梗、青皮、甘草，煎服。

山梔地黄汤 山梔一两、生地、赤芍、知母、贝母、瓜蒌仁各二钱、花粉、麦冬、丹皮各三钱，煎服。

鼻衄久不止，以大白纸一张，作十数折，冷水浸湿，置鼻上，以热熨斗熨之，至一二重纸上，则血立止。又方白及末冷水调涂山根上，立止。仍以冷水调白及末三钱服，尤妙。

治衄血不止，取芍，冷水浸冻后煨干，最绝血路。

治辛热物伤脾胃吐血、衄血，名曰吐血，用大蓟、桑白皮、犀角、升麻、蒲黄、杏仁、桔梗、甘草各二钱，煎服。

治劳心吐血，用莲子苦心半斤，糯米二斗，为末，白鸡服。

治饮食过度，负重用力，伤胃吐血，白术二钱，人参、

1 柴胡：《医学入门》卷六《杂病用药赋》“龙脑鸡苏丸”条作“银柴胡”。

2 同：此后原行“搜”字。据《医学入门》卷六《杂病用药赋》“龙脑鸡苏丸”条。

茯苓、黄芪各一钱，山药、百合各七分半，甘草五分，前胡、柴胡各三分半，姜、枣煎服。

内损心肺，吐血下血，其出如涌泉，口鼻皆流，不救则死，服此立安。用侧柏叶即侧柏^①，一两，荆芥穗烧灰、人参各二两，为末。每服一钱，入^②白面一钱，新汲水调如稀糊服。

吐血不止，将本人吐的血取来，瓷锅焙干为末，麦冬汤调下，血臭者不治。

血出口鼻如泉涌，诸药不效者，用七生汤。生地、生荷叶、生藕节、生荷叶、生茅根各一两，生姜五钱，俱捣取自然汁一碗，浓磨陈京墨，与汁同服。

伤损口鼻出血 百草霜一钱，糯米汤调服。

治咯血吐血虚劳嗽神效 乌梅汁、梨汁、柿霜、白沙糖、白蜜、萝卜汁各四两，姜汁二两，赤苓末二两，用乳汁浸晒九次。款冬花、紫菀末各二两，共入砂锅内熬成膏，丸如弹子，每一丸临卧含化咽下。名元霜膏。

治咳嗽唾咯吐血，劳心动火，劳嗽久不愈者，雪梨六十个，取汁二十盅酸者不用，藕汁十盅，生地汁十盅，麦冬汁，五盅，萝卜汁五盅，白茅根汁十盅，滤去渣，火上煎炼蜜一斤，饴糖八两，柿霜八两，姜汁半杯，火上再熬如膏。

① 烧：原作“漉”，据《金匱翼》卷二《诸血统论》“侧柏散”条改。

② 入：原作“八分”，据《金匱翼》卷二《诸血统论》“侧柏散”条改。

每五匙，日三服。

尿血者，小便出血而不痛，四物汤加山梔、滑石、牛膝、黄连（或发灰¹）、琥珀、侧柏叶、赤芍、赤苓、木通、麦冬、瞿麦、玄参、灯心等。

妇人尿血 生地一钱半，小蓟叶一钱，当归、羚羊角、赤芍各一钱半，煎。

小儿尿血 甘草、升麻煎水调益元散，服之。

远年下血 地榆、苍柏各五钱，煮十余沸服。

便血及诸下血 厚朴、生姜各五钱，同捣烂炒黄²白术²、神曲、麦芽、五味子各一钱，同炒黄为末，糊水和丸梧子大，米饮下百丸，奇效。

齿缝出血不止 黄连、薄荷、芒硝、青黛等分，为末，入冰片少许，掺之。

宣牙出血 荆芥穗、槐花炒为末，擦牙或服。

牙根出血 郁金、白芷、细辛为末擦牙，以竹叶、竹茹，入盐含漱。

牙宣出血 白芷、小蓟、香附、蒲黄炒为末，指牙肉上，立止。

满口齿出血 地骨皮煎汤，先漱后吃。

一切云血过多，必致眩晕闷绝。凡崩中、个奄等一切

1 灰：原脱，据《医学入门》卷四《灰》“五加气血石膏灰”补。

2 炒黄白术：原作“白术炒黄”，据《医学入门·杂病用药赋·农补真》乙正。

去血多及产后，皆宜大剂芍药汤煎服救之。

生地芩连汤，治去血过多，血晕不省。生地、芍药、当归、赤芍、白芍、黄芩、黄连、防风煎汤，徐徐咽下，危证也以此救之。

血虚眩晕卒倒，不可惊哭叫动，动则乘虚死矣。用四物汤加入参、白术、陈皮、茯苓、荆芥穗、甘草炙、熟地、乌梅、大枣煎汤救之。

黑药皆能止血。莲蓬、黄绢、乱发、棕榈皮、百草霜各烧存性，加梔子炒黑、蒲黄、松烟墨、血竭，共为末。每服三钱，以藕汁、萝卜汁调服，或蜜丸米汤下。

十灰散 治呕吐咯嗽血及虚劳大吐血，用大蓟、小蓟、柏叶、荷叶、茅根、梔子、大黄、茜根、棕榈皮、侧柏皮，烧存性，出火毒，为细末。用藕汁或萝卜汁磨服，服五钱即止。

又如马尾、藕节、绵花、艾叶、蒲黄、土柳、罌、皆可烧灰单服。

一切失血诸病，通用四物汤、童子尿。

痰 饮^①

痰饮 火炎重灼而成痰，饮水不散而名饮。其症不一，百病杂出，并无常所。脊中每有一气如冰东之寒者，

① 痰饮：此二字原无，据原书目录补。

或浑身习习如虫行，其为内外疾病非止白端。治宜逐去败
 痰，露表里为外证实寒热，而分汗下温利之法。《秘录》
 曰：白病皆生于痰也，怪证皆起于痰也。痰病有十，饮病
 有八。

寸脉沉，食少，肌色如故，眼抱及眼下如灰烟黑色
 者，痰也。

凡病白为不效，又寸脉伏而大者，痰也，用控涎丹药
 有。

凡痰病者，胸满食减，肌色如故，脉滑不均不定，
 为异。

寒痰青，湿痰白，火痰黑，热痰黄，老痰胶。

凡痛时时走易不定，左右转移，痰也。

痰病有似邪祟者，以痰客中焦，血气不运，致十二官
 各失其职，视所言动皆有毒发也。愚人以邪治之，其人必
 死。先宜多饮姜盐汤探吐之，或竹沥、香酒多啖之，次服
 导痰汤。

痰块 葱陆根、生南星合捣令碎，涂之立消。

浑身有块块，都是痰涎流注于经络也。通用加味二陈
 汤及化痰汤，外用生南星醋研涂之。

治痰 气为先，分导次之。治痰当补脾胃，调中气，
 此治本¹也。

¹ 本：原作“木”，据《明医指掌》卷三《痰证·论》改。

二陈汤 通治痰饮或呕或怔忡，头眩心悸，或发寒热，或流涎作痛。制半夏一钱，陈皮、茯苓各一钱，炙甘草一分，姜三片，煎服。

鹤顶丹 治痰热壅盛喘，声如拽锯，及痰结胸膈，用明白矾、真月砂，等分为末，每取一些，作丸樱桃大，薄荷汤下。

竹沥达痰丸，能运痰从大便出，不损元气。丹溪曰：“痰在四肢，非竹沥不能开”，是此药也。按：痰在手则肩臂痛，在足则脚气肿痛。

瓜蒌仁，治热痰、老痰、酒痰、厚痰，木痰、鱼腥、丸服皆妙。

葶苈子，除胸中痰饮，逐肚中之水。

旋覆花，消胸中痰结，除肺中痰水。虚人禁之。凡平痰唾如胶漆，非此不除。

枳实，除胸肺痰痞，泻痰，能冲堵壅。孕妇、虚人大忌。

苍术，消痰水，能治痰饮成窠臼，极效。

贝母，治燥痰、胸膈痰。去心研碎。

前胡，治热痰，又治痰满胸膈。肝胆经风痰，非前胡不除。

干姜，治寒痰，下气、久嗽用百部。

生姜，去冷痰、痰癖、胃气，姜汁同用竹沥则效。

半夏，治寒痰，去胸中痰满。油炒半夏，大治湿痰。

凡去痰須用半夏，熱加黃芩，風加南星，瘡加陳皮、白朮。

天¹南星炮黃色，治風痰加姜汁。

枳壳、薤白，散胸膈痰滯。

月² 2 号

白芥子，治胸膈冷痰。凡痰在膈下，非芥子不能达萝卜子，治痰，有冲墙倒壁之功。

乌梅，去痰止渴。病当发表者大忌。

木瓜，止其筋消痰，陈者良。忌铁。

芎藭，风痰能降，湿痰能燥，结痰能软，暑痰能消。蛤粉，能坠痰软坚。

白附，降气下痰，药中作水浆声者，服之立愈。

苏子，降气消痰，止喘嗽。

厚朴，消痰散满，脾胃虚者大忌。

咳 嗽

可参痰药治之。

凡时感冒咳嗽，宜参苏饮。人参、紫苏、羌活、制半夏、葛根、茯苓各一钱，陈皮、枳壳³、桔梗、木香、甘草各五分，姜、枣煎服。

1 天：原作“夫”，据《直指小儿》卷二“南星醒神散”改。

2 八九月：原作“九”，据《本草纲目·木部·枳壳》改。

3 小：原作“少”，据《本草从新·果部·木瓜》改。

诸般嗽 杏仁去皮尖、研，茯苓一钱，橘红、桔梗、甘草、五味子各一钱，煎服。

二陈汤，治嗽去痰，伐病根之药。然气虚、血虚、火盛咳嗽大忌。

嗽而无痰者，以辛甘润其肺。

夏月嗽而发热者，小柴胡汤加石膏、知母。

冬时嗽而发寒者，小青龙汤加杏仁。宜少用。

一咳即出痰者，脾湿痰滑也，宜二陈加南星之属利其脾。

连咳十数不能出痰者，肺燥也，宜枳壳、紫苏、杏仁之属利其肺。

外感久则郁热，内伤久则火炎，俱宜开郁润燥。

嗽而势下咽，宜以青皮疏肝，兼用白芥子之类，后以二陈加南星、香附、青皮、青黛、姜汁制为丸，服之。

夜嗽、久嗽多责肾虚，用知母止嗽，勿用生姜。用八味地黄丸加入冬、贝母、陈橘红，或知、柏。

肺热痰咳血，宜连阿胶丸。凡痰少而赤者，火嗽也。

久嗽者积痰，肺脏气不升降，或挟湿与酒也，用贝母散。贝母姜制、干姜、五味子、陈皮、半夏各一钱，柴胡、杜心各半钱，黄芩、桑白皮各一钱半，木香、甘草各一钱二，为末。每用五钱，入杏仁去皮尖，研七粒，姜七片，煎服。

伤风嗽者，寒热有汗，恶风口干，烦躁，鼻流清涕，

用苍术一钱，羌活、川芎、白芷、细辛、甘草各一钱，姜五片，葱白二枚，煎服。按：用杏仁、荆芥穗、前胡、桔梗、桑白皮、苏子加减俱可。

寒伤肺者，憎寒发热，无汗恶寒，不渴，遇寒而咳，加麻黄一分、杏仁、桔梗，煎服。按：用前风嗽药加减外，尚可用苏叶、薄荷、茯苓、干姜、青皮、朴心、旋覆花、款冬、参、术、紫菀等加减。

热嗽者，烦渴引饮，口燥面赤，宜葶苈散。黄芩、黄连、大冬、麦冬、半夏、五味子、杏仁、甘草、知母、石膏、桔梗等。又凉膈散去朴硝加入参、枳壳、桔梗、桑白皮等分，煎服。

种咳嗽，每遇寒则发，乃寒包热也，解散则热自除。用枳壳枳壳汤加麻黄、防风、杏仁、苏叶、陈皮、木通、黄芩煎服。

湿嗽者，咳则身重，骨节烦痛，或有汗，或小便不利，脉濡弱，白术一钱，半夏、橘红、茯苓、五味子各一钱半，甘草五分，姜五片，煎服。

干嗽而无痰者，宜泻白散。见小儿。

肺郁嗽，睡不安，贝母一钱，杏仁五枚，青黛一钱，为末，沙糖、姜汁糊丸，噙化。

虚劳嗽者，盗汗出，骨蒸热，宜四物加姜汁、竹沥，或四物合二陈，少加知、朴。按：似宜人参清肺汤、人参紫菀散、二母丸加减。用瓜蒌仁、生脉散、地骨皮、百

部、百合、柏子仁、人麦冬、沙参、黄芪之属，更审脉象用之，乃为无误。

食积者，胸满噎膈，乃食积生痰也，用二陈加厚朴、山楂、麦芽。

食积或吐青黛，瓜蒌仁不能除。又云有食积人，面青白黄色不常，面赤如蟹爪路，一黄一白者是也。以半夏、南星、瓜蒌子、萝卜子、青黛、姜汁治之。

气嗽者，七气积伤，或痰涎凝结，或如鼠掣，或如朽核滞塞咽喉，咯不出，咽不下，如人多有之，用苏子降气汤。苏子、橘红、半夏、当归、前胡、厚朴、枳实、各一钱，肉桂、甘草各五分，姜三片，煎服。或四七汤、丁香亲汤、苏子煎等。

久患气嗽圣药 陈皮、生姜，同捣焙干为末，神曲为丸，米饮下三钱。

痰嗽者，痰动便有痰声，或出痰正也。寒汤加枳壳、桔梗、瓜蒌仁、黄芩、贝母煎服，又用十枣丸。

寒热交作而痰嗽者，小柴胡汤加知母、白芍、五味子、桑白皮。

干嗽者，无痰有声，肺之无津液也。乃风郁火邪在肺中，最为难治。此症本于气逆，咳至十余亦无痰出，须用桔梗以开之，下用滋阴降火之剂，若不已则成劳，四物加

1 上；原作“土”，据《医编》卷二《咳嗽》改。

竹沥、黄柏之类。以痰不出者，用蜜水吐之，蜜煎生姜汤、蜜煎陈皮汤、烧生姜胡桃汤皆妙。又方生地一斤，杏仁一两，生姜、白蜜各四两，共捣如泥，入¹瓷器置饭上蒸五七次，每于五更挑二匙咽下。又方白蜜一斤，生姜二斤，取汁。先称铜器知斤两讫，纳蜜复称如²数，次纳姜汁，以微火令姜汁尽，而蜜斤两在则止。每服如枣子大，含化，日三次。

劳嗽吐红者 白朮、茯苓、百合、阿胶珠、大冬各一两，白芍、人参、五味子、黄芪、半夏、杏仁各七分，细辛、红花、桂皮、甘草各二分，水煎服。

血嗽者，古打仆损伤而致，四物汤加大黄、苏木煎服，或为木酒服。

酒咳者，引饮，冷与热凝于胃中成块而咳作，用青黛、瓜蒌仁。又方以竹沥煎苏苏，入此汁，合瓜蒌杏连丸。

喘 急³

喘症有八 风寒伤肺，宜发散；痰火胀肺，宜疏导；但火急者，亦不可用苦寒，宜温以劫之。见后。

1 入：原脱，据《杂病证治准绳》第二册《咳嗽》补。

2 如：原作“知”据《医学纲目·肺大肠部·于咳嗽》改。

3 喘急：原无，据原书目录补。

治十八般咳嗽、哮喘、吐血诸症如神。知母、贝母、旋覆花、陈皮、马兜铃、麻黄、甘草炙，各一两，桔梗、人参各五钱，阿胶珠、款冬花、五味子各三钱，杏仁、葶苈子、半夏各二钱，为末蜜丸，乌梅姜枣汤下，日一服，名鸡鸣丸。

喘嗽宜辨寒热 因风者遇风则甚，因寒则值寒嗽甚，因热则遇热即发。又酒后嗽甚则热也，吃冷白痰涎则有寒也。涎清白者寒也，涎黄白者热也。

喘咳宜分虚实 治法最要分肺虚实。若肺虚久嗽，宜五味子、款冬花、紫苑、马兜铃类补之。若肺实有火邪，或新嗽，宜黄芩、天花粉、桑白皮、射干类泻之。久病气虚而喘，宜阿胶、人参、五味子。新病气实而喘，宜桑白皮、苦葶苈。肺病咳嗽，大抵秋冬则实，春夏则虚。若实则面赤，饮水身热，痰盛涕泪稠粘，或胸膈面肿。若虚则面白脱色，气少不语，喉中有声，痰唾清利。肺感微寒八九月间，肺气已大旺。病嗽者，病必实，非久病也，宜泻之。

按：丁巳八月，有人用力倾跌，五更醒，少食寒热，医用麻黄一剂，一更即嗽，医用青龙汤，即彻夜不得卧，汗出如雨加喘。邀予诊之，用沙参一两，柴胡七分，加以他药，一剂而安。用治数人，俱应手而愈。

① 肺气：原作“气肺”，据《小儿药证直诀·咳嗽》乙正。

可拘新病宜泻，为一例也。

治嗽劫药 五味子五钱，甘草一钱半，五倍子、芒硝各一钱，用蜜丸噙化。

诸喘劫药 萝卜子半斤，一两，皂角烧灰，一钱，为末，姜汁和蜜丸服。上后，因痰治痰，因火治火，可也。

哮喘即痰喘甚而常发者，此寒包热也，必须薄滋味，不可用凉药，不得汗泄，宜温散。此症亦有中外皆寒者，不可不察。

治哮喘神方 麻黄一钱，杏仁一钱半，黄芩、半夏、桑白皮、苏子、甘草、款冬花各一钱，银杏叶一两，一个，炒黄色，研，水煎服。

禁忌宜知 凡火嗽忌用人参、陈皮、半夏等燥药，凡气嗽忌用罂粟壳、肉豆蔻等涩药，新病尤忌收涩。凡咳嗽日久咽喉有痰者，不可用南星、半夏，宜用贝母、瓜蒌仁。若饮水者，又不宜用瓜蒌仁，恐沉陷中不松快也。黄夏月似宜少用。

治气虚喘 人参一钱，胡桃不去皮，一个，姜五片，煎服，神效。如初感风邪邪盛，又久嗽郁热，不可用人参，宜以沙参代之。

治少气而喘 人参、五味子、麦冬，治肺虚胃汁之圣药，即生脉散。久嗽必用五味子，然兼用之，恐闭住其邪。

咳嗽喘急 宜生姜、沙糖同煎，同煎，常服之。

苧麻根，治哮喘，取根和沙炒^①，煮，时时细嚼咽下，永绝病根，神效。

马兜铃，去肺热补肺，治咳嗽喘促气急，坐息不得，兜铃一两，蜜炙^②，炙甘草一两，为末，每一钱煎，却或含末咽汁。

桑白皮，泻肺气喘满，然性不纯良，用之多者当戒，以出土者有毒^③故也。

胡桃，治痰喘，能敛肺，不可去皮。

梨，治热嗽。

鸭子，治哮喘，去风痰，最损，宜便浸一日，煮吃。

猪肺，治嗽高并痰吐血。猪肺洗去血水，切大段，用杏仁一个，去皮尖，将肺以竹竿穿眼^④，每段入杏仁一个，麻扎重汤煮熟，去杏仁，只吃肺效。

阿胶，治肺虚损极，咳嗽吐脓血，非阿胶不补，肺病须用阿胶。

妇人方

妇人胞为血室，冲脉、任脉皆起于胞中。冲为血海，任主胞胎，冲任气盛则月因时下。

月候形色。成块者，气之聚也。将行而重者，气之滞

① 出土者有毒：《本草纲目·木部·桑》：“时珍曰：古本草言桑根见地上者名马铃，有毒杀人。旁行出土者名代蛇，亦有毒而治心痛。”

② 眼：原作“暇”，据《万病回春》卷二《咳嗽》“不遗方”之“又方”改。

也。行后作痛者，气血俱虚也。色淡者，虚而有水渥之也。错行妄行者，气之乱也。紫者，气之热也。黑者，热之甚也。紫黑者，风也，四物加防风、白芷、荆芥。黑者，热甚也。成块色紫黑者，血热也，四物加黄芩、黄连、香附。淡白者，虚也，芎归汤加党参、黄芪、白芍、香附。淡者，有水渥之也，二陈加芍、归或八物。如烟少水者，如屋漏水者，如豆汁者，或带黄色者，皆湿痰也，二陈汤加秦艽、防风、苍术。云如豆汁者，四物加芩、连。成块色不变者，气滞也，四物加香附、延胡、枳壳。行后作痛者，虚也。少而淡者，血虚；多者，气虚也。其将行作痛及凝块者，滞也。紫黑色者，带而挟热也。时常作痛与经前作痛为血积，经后为血虚。发热之中，有常发热者，为血虚有积。经行发热，为血虚有热。临经行腹痛，此血滞也，气血俱实也，四物加黄连、香附、桃仁、红花、蓬术、延胡、丹皮。经行后腹痛者，乃虚中有热，宜八物加减。先期而来者，乃气血俱热，四物加柴胡、黄芩、黄连、香附、知母、阿胶、艾叶、甘草。过期不来，是血虚，宜通经四物加党参、黄芪、升麻、陈皮、蓬术、苏木、木通、肉桂、甘草、红花、桃仁。

血闭 月事不来 胞脉者，属心而络于胞中。今气上迫肺，心气不得通，故月事不来也。经闭有二：一者胃弱，名曰血枯，此中焦热结也；二者血海干枯，此下焦胞脉热结也；二者劳心而心火上行，此上焦心肝热结也。

湿痰枯住经闭者，不可服地黄汤，宜导痰汤加川芎、当归、黄连。

血崩血漏 忽然暴下谓之崩，漏与不止谓之漏。崩漏有：一者脾胃虚损，下陷于肾，宜大补脾胃而升举血气；二者^①富贵全势，心气不足，当先平其心而补气血，养脾胃，补阴泻阳，复加镇心火之药；三者^②悲哀太甚则胞络绝，黑药能止血，用五灰散。急则治其标，白芷汤调百草霜末服；甚则五灵脂半生半炒，各为末，酒调服，后用四物汤加党参、黄芪、黄芩、黄连、香附、半夏调理。

妊娠恶阻 谓呕吐恶心，头眩，忘食择食是也。妊娠六十日当有此证，多从痰治。然肥者有痰，瘦者有热。宜二陈汤加砂仁、桔梗、乌梅、生姜、大枣，又宜用竹茹、黄芩、黄连、陈皮、茯苓、麦冬、白术、厚朴、党参、甘草、香附、乌药、地黄、半夏、川芎、旋覆花、枳实。怀孕爱吃一物，乃一脏之虚，如血气弱不能荣肝，则肝心爱酸物也，但以所思之物与之，必愈。

忌食诸物 无鳞鱼及蟹主辟产，鸡肉、鸭主令儿伤，牛、豕、苋菜主中胎。又忌胎杀所游，如邻家修造，亦宜避忌杀物。

易产方 大腹皮、羌活、炙甘草、当归、白芍、党参、白

① 者：原脱，据《东医宝鉴·胞》“血崩血漏”条补。

② 者：原脱，据《东医宝鉴·胞》“血崩血漏”条补。

③ 肝：原作“用”，据《东医宝鉴·妇人》“恶阻”条改。

木、陈皮、紫苏、枳壳炒、葱白，服二十贴，易产可无病，名达生散。

妊娠将理法 衣勿太暖，食勿太饱。勿妄服汤药，勿令重劳高劳力，勿多眠卧，须时时行动为妙。

胎漏胎动 乃气不足之故。人参、山药、茯苓、麦冬、山萸各一钱^①，杜仲、甘草、当归、枸杞各一钱，白术、熟地各二钱，五味子五分，煎服。胎动者，下血有腹痛，宜行气安胎。胎漏者，下血无腹痛，宜清热安胎，用胶艾汤。熟地、川芎、阿胶、黄芩、白术、砂仁、香附各一钱，糯米一撮，空心服。又凡此证，八物加阿胶、艾叶皆宜。又白术、砂仁、熟地各一两，煎服，亦效。

胎动腹痛不可忍 砂仁炒，去皮为末，每服一钱，热酒下，须臾即安。砂仁能止气行气安胎也。胎动是热，用黄芩；不动是寒，用砂仁。砂仁亦不宜多用，多则破气，恐致难产。

佛手散 治胎动腹痛，当归二钱，川芎四钱，益母草一钱，煎服。

半产 属虚属热，宜急补之。人参、白术、茯苓、熟地、当归、杜仲。炮姜煎服。有以毒药打胎，致致血不下，冲心，面色青，汗发作，急解毒行血救之。用白扁豆为

① 二钱：原作“钱二”，据《石室秘录》卷四《产前治法》“论漏胎”条乙正。

2 各：原脱，据《石室秘录》卷四《产前治法》“论漏胎”条补。

末，新汲水调灌二钱。

苓朮汤 治怀孕四五月常堕者、内热甚故也。黄芩二钱，白朮一钱，水煎服。急则一日五服，缓则五日一服。安胎易产之良方也。

和痛汤 治小产心腹痛。当归、川芎、白芍药、熟地黄各一钱，延胡一钱，泽兰、香附、丹皮各八分，红花、桃仁各五分，童便酒煎服。

产前无白带也，有则有难产之兆，或产后有血暈之事，急用黑豆一合，煎汤二碗。入白果十粒，红枣十个，山萸、山药、薏米各四钱，熟地一两，茯苓、泽泻、丹皮各一钱，加水二碗，煎作三剂服，永不白带。亦治妇人诸带，无不神效。

孕妇不曾行动，舒伸忍痛，曲身侧卧，则子在腹中不能转动，致有横生逆产也。

保产法 切不可坐草早及稳婆乱用手。凡产时是方觉腹痛，不可惊动太早，令产妇恐怖。恐怖则气怯，怯则气结，下焦胀，气乃不行，以致难产，服紫苏饮。

欲产候 脐腹俱痛，连腰引痛，眼中生火，此是儿转也。入月腹痛或止或作，非正产也。胎尚未动者，非正产也。谷道未挺进者，非正产之候。水浆未破，血未出者，非正产之候。浆血虽出而腹不痛，非正产之候。且令扶行忍痛，不可坐草。直待胎气陷下，手通肩户，要重相按，眼中生火，谷道挺进，此正欲产，方可坐草用力。

临产不可喧闹，且进粥饭，令人扶策徐行^①。若不得凭物而立，阵痛转密，产候将至，然后坐草，且进催生药，直待儿过产门，方可用力一下，自然易产。坐草之时，忽然目翻吐沫者，急用霹雳丹。

催生药 坐产日久，产母困倦，宜服催生药。难产子死及矮小女子交臂不开，服加味芎归汤。炙龟板、当归各四钱、川芎二钱，生过男女妇人头发灰二钱，煎服。此方宜备，乃必用也。

米麴散，临产用力太过，气衰脉微，精神昏晕，口禁面青，不省人事，用木香、神曲、陈皮、麦芽、黄芪、白芍、阿胶各一钱，杏仁、甘草各二钱，凡米一合，生麦一片，煎服。连用为妙，或撬开口灌下。

麴散，用蛇蛻一条，全用，蝉蛻十四枚，男子头发一钱，俱烧存性为末，分二服，温酒调下，治难产及子死腹中。

黑神散 百草霜、白芷各二钱，酒、葱白各半斤，入麴香一分，同煎沸，作二服良。服此药后，外用葱白一片，打烂铺于小腹上，取急水滩头砂一斤，炒热，布裹，葱上擦之即产。治坐草日久，水浆流下，以致难产。

① 扶策徐行：出北宋抗金名将宗泽《早发》一诗：“伞帽垂垂马路沙，十人扶策一车多。晓行风雨夜行雪，此路行人奈老何。”清·顾炎武《日知录》：“扶策，犹扶持也。”

② 坐：原作“圭”，据文义改。

治产难 百草霜、附子、白芷^①，各等分炒研，以酒、
归煎汤^②，调下三钱效。

凡催生宜多用有利迅速之药，如兔_耳、鹿茸、龟头灰、蛇蜕之类。若水血多下，手道干涩者，如猪脂、香油、蜜、童便、蜀葵子、牛乳、滑石、榆皮之类。若风冷气凝滞者，土膝、葱白、桂心、生姜之类。若触犯心气，心烦闷者，麝香、朱砂、乳香、竹茹之类。

难产必效方榆白皮汤 难产日久、浆水多下、胞上几不得下，香油、白蜜各一匙，微温，地脂有木一两，搅服之。外以油、蜜厚母脐腹即产。又方榆白皮、冬葵子、瞿麦各二钱，牛膝、麻仁各一钱半，木通一钱，煎服。油、蜜、童尿和服，加益母膏，最治难产。

益母丸 五月五日、六月六日，益母草开花时，取未
阴干，不犯铁器。捣为末，蜜丸，白汤下。一名返魂丹，
治横逆产及产后百病，熬膏名益母膏。

催生丹 治难产及横逆产 用腊月兔 胆 1 个，炙甘草 1 斤，乳香 2 钱，丁香 1 钱，麝香 1 分，均细切，瓦器炙研如末，阴干，油纸包 1 句取 1 匙，温米泔化服，即产。

1 芷：原作“木”，据《丹溪治法心要》卷七《胎孕》“催生方”

2. 汤：原作“湿”，据《丹溪治法心要》卷七《胎孕》“保生方”

免：原作“兔”，据《普济方》卷三百五十七《催生》改。

原作“兔”。据《女科证治准绳》卷四《催生法》“催生丹”

胞浆者，乃胞内养儿之水也。胎元壮健者，胞拆即随浆而下，故易产也。其困弱者，转头迟慢，胞浆既干，污血团塞，是以难产，宜用催生散。黄蜀葵子一钱，研，酒调，葱去渣，温服。又方名乳珠散，用明乳香研细，猪心血和丸，如芡实大，朱砂为衣，晒干。每一丸，冷酒化下。黄蜀葵俗名秋葵，宜多种备用，用处甚多。

难产 由气血之亏，子无力转身之故。倘手足先出，急以针刺儿手足则必缩入。用人参一两，川芎一两，当归一两，红花一两，连酒之，少顷刺儿头直到门矣。倘久之不下，再将前药服之，不可止也。若儿头既已到门，久而不下，此交骨不开之故，速用柞木枝一两，当归一两，川芎、人参各一两，煎汤服之，少顷即儿头顺生矣。倘儿头不下，万不可用柞木。盖此味专开交骨，儿未回头而儿门先开，亦死之道，故必须儿头到门而后用此方。熟记！熟记！

难产不必惊慌，口中但念九十九圣化生佛百遍，儿之手足即使缩入，急用人参、当归各一两，附子一钱，川芎五钱，黄芪一两，煎汤饮之，立刻产下。治横生倒产，独参汤最妙。

外贴如神丹 巴豆二枚，蓖麻子七粒，去壳，入麝香少许，捏作饼子，贴脐中。既产，即以温汤洗去，不可迟緩。此方不可轻试，不得已而用之。

如圣膏 治产难及死胎不下，十分危急者。巴豆十六

粉，蓖麻子四十粒，去壳，麝香一钱，同捣如泥，摊布帛上，厚摊上，产下即洗去。一方蓖麻子一两，去壳，雄黄一钱，同研成膏，涂产妇右背心，才产即速洗去，否则捞出用此膏涂项上，肠自收入。

验胎生死 产母面赤舌青者，母活子死。面白「¹」赤，口中沫出者，母死了活。胎死腹中时，产母面青，唇里青，唇舌青，口臭。孕妇舌黑者，子死腹中矣。凡产皆以舌为证验。凡胎死，母舌必黑，心腹胀闷，口中极臭，为可验。如欲下死胎，用干芫散，苍术一钱，厚朴一钱，陈皮一钱，甘草一分，生姜一片，红枣五枚，一投，用朴硝五钱，酒水各半，煎服，其胎即化血水而下。若双胎一死一活，服此则死者出，生者安。又方，蟹爪一两，甘草五钱，干地黄一升，东流水一斗，煎至一斗，去渣，入阿胶一色，一升，再煎，令胶化，分三次顿服，胎即出。药灶宜东向，芦席为荐。

夺命丸 治死胎不下至妙。桂枝、赤芍、芍药、赤芍、桃仁各三分，为末，蜜丸，苡苡汤下，空心煎服亦可，治抢心闷绝欲死。

死胎着脊不出气欲死 脂白、白蜜各一斤，醇酒一斗，和温，分二服，服之即下。

胞衣不下 稍久则血流入胞中²，上冲心腹³，宜急断

1 各：原作“相”，据文义改。

2 中：此后原衍“胞”字，据《医学纲目·产后症·胞衣不下》删。

3 胸：原脱，据《医学纲目·产后症·胞衣不下》补。

脐带 以小物系带牢固，然后切断，使恶血不能入胞中，则胞衣自当萎缩而下。纵连延数日，亦不害人。只要产妇心怀安泰，饱进粥饭，终日下血，屡试有验。切不可令稳婆妄用手法探取，或因此而殁。切戒！

胞衣不下者，恶血流入衣中，衣为血所胀塞，故不能下，须臾即亡。亟心即生，急取存命丹。用陶子冠，^①钱，牙皮、干漆^②，各一两，方木，以醋一斗，入大真木一石，熬成膏，丸梧子大，酒下五十丸。又贴如圣膏^③。胞衣不下，宜服黑龙丹。

黑龙丹，治产难及死胎不下，胎衣不下，产后血暈血逆，一切危急重死者。雷药得下，无不活，神效不可言。五灵脂、当归、川芎、良姜、熟地各一两，土硫、煅瓦楞，纸筋^①捏泥封固，灰^②，煨，候冷取出，却入百草霜一钱，硫磺、乳香各一钱^③，花蕊石^④、琥珀各一钱，共研细末，醋面糊和丸梧子大。每服一丸，入姜汁、童^⑤尿、酒，煎服之。又一方灵脂、当归、川芎、良姜、生^⑥地黄各一钱，入奶子壳内，盐泥固济，火煨，加百草霜一两，硫磺、乳香各一钱。琥珀、花蕊石各一钱，制法同上。

牛膝汤，治胞衣不下，服此即堕下。滑石末一钱，木通、当归、牛膝、瞿麦各一钱半，冬葵子一钱，煎服。

① 筋：原作“巾”，据《济阴纲目》卷十一《胞衣不下》“黑龙丹”条改。

② 童：原作“重”，据《济阴纲目》卷十一《胞衣不下》“黑龙丹”条改。

蛻饮，治胞衣不下神效。蛇蛻全者一冬，蚕蛻纸方，蜂蛻四十九个，土并烧存性为末，煎流水调下，立出

一字神散，治胞衣不下。鬼白黄色者，研如粉，不用罗^①，以手指捻之。每服二钱，温酒一盞，同煎至八分，服之立生，如神。此方救人几万数矣！

胞衣不下，取产母裙覆井口上，勿令产母知之，立下。

有方治难产，用木匠凿柄上蓬头，烧灰存性为末，急流水调下。

花蕊石散，胞衣不下，至死，但心头暖，急以童便调一钱服之。取下败血如猪肝，或化为黄水而品，其胞衣即下，仙方也！好硫磺四两，花蕊石一两，俱为粗末拌匀。先用纸筋和盐泥固济瓦罐一个，候泥干入药于内，再用泥封口候干，安在四方砖石，上书八卦五行字。用炭叠四周周围，自巳午时从下着火，渐令土初，直至经宿。火冷又放经宿，罐冷取出细研，瓷瓶收储。胞衣不下，此药最要。又治跌仆金刃重伤，调服又掺之。

白带者，不能约束带脉也。带脉通于任督，任督病而带亦病。此由脾虚肝郁，湿火侵逼，以致脾精不守，不化

① 罗：此后原行“里”字，据《济阴纲目》卷十《治胎死腹中》“一字神散”删。

② 胞：《医学纲目·产后症·胞衣不下》“花蕊石散”条作“胎”。

③ 不下：原作“上冲”，据《医学纲目·产后症·胞衣不下》“花蕊石散”条。

附冷存性、屋梁上悬令干、候尽、切大如豆、各等分、研、入冰片、麝各1少许，每三钱，温酒下。

妇人有三十六疾者，七癥、八瘕、九痛、十二带下也。

带下三十六疾者，是十二癥、九痛、七害、五伤、三固也。

治法虚者不可攻，实者可伐。血虚者当归加攻，气虚则参、术、陈皮。男用血，女用气。燥者为先，湿甚者固肠丸。

相火动者诸药中加炒黄柏，滑者加龙骨、赤石脂，冷者加吴茱萸、炮姜，寒者加附子，血虚者加当归，寒月加姜、附。临机应变，先须断早味，带下与梦遗同法治之。

肥人有带，多是湿类，用白石、半夏、南星、炒柏、青黛、苍术、川芎。

瘦人带病少，如有多是热、用炒柏、蛤粉、白石、川芎、青黛、椿皮。

带湿俱是胃中积，流下渗膀胱，出于大肠、小肠。宜升提，甚者上必用升，以提其气，下用二陈加白术、苍术，仍用丸子。

带病以壮脾胃、升阳气为主，佐以各经见症之药。

① 各：原脱，据《女科证治准绳》卷一《赤白带下》“伏龙肝散条补”。

色^①白者属肺，用小柴胡汤加山栀、防风；暑热^②湿滞，小便不利，用龙胆泻肝汤；肝^③血不足，或属热风^④热，六味丸。色赤者属心，小柴胡汤加黄连、山栀、当归；思虑过伤，用妙香散等药。色白者属脾，用补中益气汤加山栀。色黄者属胆，用六君子汤加山栀、柴胡；不应，用归脾汤。色黑者属肾，用六味丸。气血俱虚，八珍汤。阳气下陷，补中益气汤。湿痰下注，加茯苓、半夏、苍术、黄柏。气虚痰饮下注，四七汤送六味丸。不可拘执人多痰，受人多火，而以燥湿泻火之药轻治之也。

胎前产后有积者，先攻后补。脉滑大有力为实，宜攻。或痢、或乱，或补，或泻，或凉，或温，或升散，或消痰，或针灸，不可妄治。

产后瘀血上攻，包内乳伸长，细小如筋，有不可忍，此危症也。用川芎，当上床头吹鼻，再用芎，归逐时烧烟，安在病人面前熏手，令病人曲身低头，将口鼻及病乳常吸其气，未缩再吹一料，如不复旧，则用妇科膏。吹上，收好急宜洗净。

妊妇胎气不和，动上心腹，胀满疼痛，谓之子悬。用佛手散治子悬，及胎产惊悸，气结难产最妙。紫苏一钱，人参、大腹皮、川芎、陈皮、白芍、当归各一钱，甘草五

① 色：原脱，据《女科证治准绳》卷一《赤白带下》补。
② 肝：原脱，据《女科证治准绳》卷一《赤白带下》补。
③ 风：原作“六”，据《女科证治准绳》卷一《赤白带下》改。
④ 妙：原作“炒”，据文义改。

分，姜四片，葱三茎，煎服。

妊娠下痢赤白，腹中绞痛，里急后重，名曰子痢，用当归芍药汤（白芍、白术、白苓、当归、泽泻、条芩、黄连、甘草、木香、槟榔煎服。

胎前白带 苍术一钱，山茱萸、白芍各一钱半，黄芩五钱，白芷各一钱，黄连炒、黄柏炒、枳椇皮炒，各一钱半，为末制丸，空心温酒下五十丸。

产前有子痛、子烦、子肿、子淋、子软、子崩、子疝、子悬、感寒不语、儿在腹中哭、孕如腹中钟鸣等症。

子痛 羚羊角汤加葛根、秦艽、丹皮、防风、细辛、竹沥。

子烦 竹叶汤、竹沥汤俱好。

子肿者，以胎中有水，多于五六个月，遍身浮肿，腹胀喘急，用鲤鱼汤（白术、芍药各一钱，白芍、当归各一钱半，橘红五分）先取鲤鱼二条，煮清汁一器半，入药及姜五片，煎至一盞服，以水尽肿消为度。

或头面不肿，两脚肿至膝，足指间有黄水出者，谓之子气。用平胃散加赤苓、桑白皮服愈（平胃散见上）胎前宜即治之，否则难效。

儿在腹中哭，令妊母曲腰向地拾物，其声即止，不止再拾。

孕如腹中钟鸣，取多年空屋下鼠穴中土烧之，或为末酒服。

归脾汤用术、参、芪、归、草、茯神、远志、枣仁、木香、龙眼、姜、枣，能引血归脾，圣药也。

产后血暈 有下血多而晕者，用清魂散。人参、泽兰各一钱半，荆芥五钱，川芎二钱半，甘草一钱，为末，温酒、热汤各半杯，调下二钱灌之，下咽即苏，口噤俱开灌之。下血少而晕者，破血行血，宜夺命散、花蕊石散。

血暈如神荆芥散 荆芥穗末，每服二钱，童便一盞，调热服。

醋墨法 墨半锭，烧赤，投醋中，研细，用五分，淡醋汤下，效。

醋破血暈法 取好醋煎热，稍稍含之即苏。又以醋喂其面，醒来与醋饮之妙。又以炭火烧红，醋滴炭上，使帐中常闻醋香为妙。产如房中常得醋气为佳者，酸益血故也，切记。

治血暈闷绝 红花一两，即煮服即醒。又以干漆烧烟，熏鼻即醒。醋炭一法，屡有神效，产前宜多备醋也。

产后忽然昏闷不省人事者，暴虚故也。生鸡子一个，吞之。如未醒，童便一升饮之。又不醒，竹沥服五合，日三五次，必醒。又半夏末或皂角末吹鼻中，令嚏即效。

产后血崩不止 当归六钱，川芎四钱，芍药五钱，煎服救之。又方四物汤加蒲黄、生地汁、阿胶、白芷、蓍根、陈艾煎服。

下血过多，唇青目瞑，其势危急，用济危丹。阿胶、

乳香、硫磺、五灵脂、大胡玄枰各、陈皮、桑寄生、苍柏各等分，将前五药俱，取火炒，共研匀，与入胡四味为末，以生地黄汁和丸梧子大，温酒下二三十丸。

产后血崩 取木耳一两，洗有汁、为末，大胡玄枰一钱、枳壳一钱、干姜，为末和匀，每服一钱，以乌梅煎汤，温下即止。

金命散治产后下血少而血晕者，用没药、血竭，各等分，为末，每服一钱，以童便、好酒，各半盏，煎数沸，用服效。即血竭散。

产后血晕因寒者，当归、牡丹、白芍、白术、芍药各一钱，童便煎服。

产后下血不止，用乱发一两，水一钟，煎服。又方，用干地黄，石器内捣为末，每服一钱，食前热酒调，连进三服。

产后或落胎，血不止，用桑白皮炙，水煎服。又方，用白芷一两，研细，酒调服。发热者，用干地黄汁饮之妙。

产后嗽血上冲，发为血晕，用陈艾一握，煎汤，入醋服，立效。

产后血迷晕绝，不省人事，心头温者，半夏末冷水丸如豆大，纳鼻中即愈。此扁鹊法，大效。

产后血风攻脑，头旋同笔，不省人事，用才出土苍耳苗名鸡心草，胡干为末，每服一钱，酒一盏，煎服即效。

小产血不止，用鹿角屑一两，干地黄二合，水一升，煮地黄去渣，下鹿角屑，再煮沸，温服，败血即下。

产后血不止，或一月之后黄如灰汁者，日久成带，用竹纸一握，麦纸各五张，烧灰，荆芥穗一两，干地黄二钱，酒、水同煎，食前服。

产后犹有余血水气者，用黑豆五升，熬烟绝，倾瓷器内，以酒一斗，乘热浇入，通散效。《千金》加独活，名独活紫汤。

产后血虚及中风，目上视，四肢强直，用荆芥穗末二钱，干地黄二钱，酒一斗，调下，良久即活，甚验。

产后恶物不尽，腹中疼痛，用生干地黄、当归各四两，干地黄一两，以酒一斗，煮取五斗，为末，每服二钱，姜汤调下。

产后口鼻黑色起，鼻血出，急用荆芥散五钱，内取红线一条，并产母顶心头发一握，紧系产母手中指中节，即止。

产后喘急 宜大剂芍药汤，即佛手散。用川芎四钱，当归六钱，煎服。

补土宁喘丹 人参一两，白术一两，麦冬一两，茯苓二钱，苏子一钱，煎服。又方，苏木一两，水二碗，煎至一碗，调人参末二钱服。

产后感冒咳嗽痰盛 旋覆花、赤芍、荆芥、五味子、夏枯、麻黄、小蓰、杏仁、前胡、甘草各一钱，生姜二钱，

大枣一枚，煎服。麻黄三分足矣。

产后气喘不得卧 宜服六味丸。

产后咳逆不止 肉桂五钱，姜汁一合，同煎，温服。合以手炙火，摩背上，令热时，涂药汁尽为效。如不效，服此方。

产后不语 由败血干心，心气闭塞也。人参、石菖蒲、川芎各一钱，细辛、防风、辰砂、甘草各一钱，为末，每服一钱，薄荷汤调下。

产后发热者，热入血室也。柴胡四物汤加桃仁，五灵脂煎服。

产后发热有五 有去血太过者，心脉虚大无力，腹内不痛，用当归、川芎、茯苓、白术、熟地、陈皮、香附、乌药、干姜、益母草、丹皮、甘草各八分，生姜五片，大枣一枚，煎服。有恶露不尽者，必小腹有块介痛，宜黑神散，用当归、白芍酒炒、熟地、肉桂、炙甘草各五钱，沉香、棕榈灰、蒲黄、没药各一钱半，乳香一钱半，赤芍一钱，血竭五钱，为末，每服二钱，温酒下。有恶饮食者，当消导。有感风寒者，宜发散。有瘀乳者，乳必胀痛，但揉去乳汁，必自愈。因风寒，宜竹叶防风汤、柴胡汤。热渴，熟地黄汤、人参当归散。大、小产热入血室，小柴胡汤加灵脂、黄连、赤苓，清心凉血。

产后阴户中下一物，如合钵状，有二岐¹，此子宫也。必气血弱而下坠，用升麻、当归、黄芪、人参二剂，半日已收。再用补中益气汤去柴胡，连进二大剂。再以四物汤加人参百余剂。

临产用力太过，阴户中垂出肉线一条，长三四尺，牵引心腹，痛不可忍，先服失笑散²。用生姜³数斤，洗净不去皮，捣烂；清油一斤，拌匀炒热，以酒⁴为度。却用熟绢五尺，摺作数层，令妇人轻轻盛起肉线，使之屈曲作一团，纳在水道口，却用绢袋兜裹油姜，令稍温，敷在肉线上熏之。觉姜冷，又用熨斗火熨之。如姜气已尽，又用新者如此重熨一日一夜，其肉线已缩一半，再用前法。越两²日，肉线尽入腹中，其病全安，再服失笑散、芎归汤调理。如切断肉线，即死矣。

产后儿枕块痛，生化汤。当归六钱，川芎四钱，桃仁去皮尖，研，五分，炮姜一分，冬青五分，炙甘草五分，益母草二钱，煎服，加酒⁵。如再痛用失笑散⁶，五灵脂、蒲黄⁷，等分，为末，每⁸钱和醋熬成膏，入水一盞，煎至七分，热服立效。

专治儿枕痛极苦，当归、白芍各⁹钱，川芎¹⁰钱，白芷、桂心、蒲黄、丹皮、延胡、五灵脂、没药各七分，水

1 岐：物有分支或事有分歧。《集韵·支韵》：“岐，分也。”

2 两：原作“雨”，据《医学纲目》卷二十五《奇病》改。

煎入醋，空心服。

凡枕骨，白药不效，蟹一只，烧存性，同药末，空心温酒下，立止。生男用尖脐黄，生女用白脐黄。

产时同胎，用砂黄芩、人参、当归、升麻、甘草煎服，外用硫磺、五倍子、乌贼骨为末涂。又国物加龙骨连用二贴，外以香油和汤洗，且贴如圣膏。

生肠不收 人物汤加防风、升麻、白芷煎服，外以枳根白皮、荆芥、升麻、香薷煎汤洗即入。又枳壳煎服，浸良久自入。

子宫大痛难忍，五倍子煎汤洗，又为末掺之。

鼻门不效，香油煎热盛器中，一食顷，以皂角木吹鼻，作嚏即收。

产后风 豆淋酒见上调荆芥、当归末饮之。

产后头痛 多是血虚或败血作梗，川芎、桔梗、白芷、赤芍、人参、青芩、甘草、当归煎服。或四物汤加柴胡亦效。

产后心腹腰胁痛 全是瘀血，用失笑散。

产后胸腹胀闷呕吐 赤芍、半夏、人参、泽兰、陈皮、甘草、生姜煎服。呕不止，丁香一分，吴茱萸一钱，煎

① 生：原脱，据文义补。

② 黄：此后原衍“芪”字，据《医医大全·阴器部·阴脱门主论》“产后生肠不收”条删。

砂六分，猪胆和丸，生姜陈皮汤服。

产后淋痛 茅根一两，茯苓、瞿麦、人参、葵子各一两，滑石、白石、桃仁、甘草各二钱，紫贝五枚，石首鱼石十六个，为末，每一钱，木通、灯心煎汤下。

产后渴干，人参、黄芩、四君加桃仁、丹、芍、猪羊脬煎汤代水煎服。

产后淋痢泄泻 荆芥穗焙于瓦器内，慢火烧存性，不得犯油火，入麝香少许研末，每一钱汤下。又四物加桃仁、黄连、木香主之。

大便小便不通 用苏麻屑、五仁丸、葱豉熨之。①
便方参之。

产后赤白痢，腹中绞痛，芍药、阿胶、艾叶各一两，甘草、当归各二钱，熟地黄一两，② 煎水煎，分三服，空心服，名救急散。

产后胎前痢疾，散化甲一枚，米醋炙，研为末，醋汤调下。

妊娠血痢，用阿胶二两，以酒一升半，煎一升，顿服。产后诸痢，煮藕白食之。③ 又方，羊肾脂炒藕白，食之甚佳。

产后血痢，脐腹疼痛，四物汤加槐花、黄连、御米壳等似又宜阿胶、芩。

① 各：原脱，据文义补。

② 各：原脱，据文义补。

产后下痢虚极，白头翁汤加甘草、阿胶汤主之。

血产痢疾，山梔不拘多少，烧灰为细末，空心下一钱，甚者不过五服即效。

产后痢，日五十行者，取木里蛀虫粪焙炒黄，急以水沃^①之令稀稠得所，服之即安。

产后诸痢，取苍耳叶捣汁半盏，日三四温服。

产后痢，津液竭，渴不止，用人参白术散。有用六味丸、四神丸、六君子益气温、十全大补等汤而愈者，宜细思之，辨症为要。

产后痢日久，津液枯竭，四肢浮肿，口舌舌燥，用冬瓜一枚，黄泥糊厚五寸，煨熟，去皮绞汁，服之即愈。

按：产后不得利，利者百无一生。故大、小便方，尤多备择。

产后浮肿喘急尿涩 黑豆^②、白芍、茯神各二钱，琥珀钱，为末，乌头^②、苏叶煎汤下。

产后风肿水脚，泽兰、防己为末，每二钱，温酒或醋汤下。

胎前多滞，产后多虚，宜大补气血为要。

产后血面加喘，蛇胆包^①一大团等，捣碎，入麝香^②，吴萸一分，为末，同麝掩在脐上，即不喘。上二再以当

① 沃：浸煎。《广雅·释诂二》：“沃，渍也。”

② 乌头：原作“黑豆”，据《医字入门》卷七《妇人小儿外科用药赋》“大调经散”条改。

归一两，白芍一钱，甘草一钱，枳壳、槟榔各一分，煎服二剂，后用独参汤调理。

产妇一身发黄 白术一两，苍术一两，车前子五钱，茯苓五钱，荆芥一钱，茵陈五分（如白术、苍术大者，可用一钱），为末，每服三钱，煎服。

产妇小阴肿胀，小便点滴不出，死证也。用白术、熟地、人参、苍术各一两，茯苓、车前子各一钱，山萸肉钱半，肉桂五分煎服。外宜以盐纳脐中，用意运法。

胎上冲心 葡萄一两，煎汤饮即下，其藤叶俱可，名紫白桃。

难产保生 陈麦草（即取路人陈麦柴更妙），每一两洗净剪段，煎汤服。又蟹爪一两，甘草一两，东流水一斗，煮取升，纳阿胶三两，服之。

产后阴肿 葱白研膏，入乳香敷贴。

产后中风 黑豆半升，炒令烟起，连根葱白，同炒，酒淋服。即豆淋酒，神方也。

女子转胞 小便不通，腹胀垂死，急用猪肝吹胀，以鬃毛管安上，插入溺孔，捻气吹入，即大尿而愈。立效之方也。

妇人难产，一日不下 吴葵山¹云：以车前子为君，

1 吴葵山：吴球，字葵山，明代医家，括苍（今属浙江）人。博学兼古，少时即研究经书，精于医术。尝著《诸证辨疑》，或称《诸证辨疑录》。又有《用药玄机》《活人心统》《万脉生奇》《食疗便民》，均未见行世。

冬葵子为臣，白芷、枳壳为佐使，已没半产。众议异，细问之，答曰：「本草：谓催生，以此为君，三诗经。米果直以防难产。药性须东向芦苇为薪。」

治难产，将历本同炙黄纸上铁入盐印剪下烧灰，滚水服下即生。

转胞尿闭 用四物汤加入参、白朮、半夏、陈皮各钱，甘草五分，姜一片，煎服，后探吐之。又与小叶，小便立通效。

一法将孕妇倒竖起，则尿自出亦妙。见便易门。

产妇临月之前一月，如有风邪感冒，皆作风寒治之。其临月之期，如有风邪，不可作风邪治之。用人参一两，当归一两，川芎五钱，柴胡一钱，甘草一钱，白芥子一钱，煎服。无论其六经传变，俱以此治之。忌桂枝、麻黄等。

产后诸症，俱用人参五钱，白朮五钱，熟地一两，川芎一两，当归一两，白芥子一钱。此方为主，有风加柴胡六分，有寒加附子一钱，肉桂一钱，其余不可乱加，此神方也。但可减分两，不可改药味。凡枕痛，加山楂一两，桃仁五枚，一两即去之。华仙卿又云，人参一钱，川芎一钱，当归一两，黑荆芥一钱，益母草一钱，有风加柴胡五分，有寒加肉桂一钱，如血不净加山楂一两，血晕加炮姜五分，量时

D 之：原作“功”，据《石室秘录·求治法》“产妇感中风邪”改。

加麦冬五钱，夜热加地骨皮五分，有食加山楂五钱、谷芽钱，有痰加白芥子五分。

千金方 治恶阻呕吐 竹茹、橘皮各八钱，茯苓、生姜各一两，半夏三十铢，煎服。一方加参、术、厚朴。

胎动叫呼口噤唇塞下痢 芡实，好酒煎服 亦治腹痛下血。

妊娠心痛 破生鸡子一枚，捣和服 又方烧枣七枚，为末，童尿服之。

妊娠腹痛 生地一两，艾叶，好酒煎服 又方 煎，顿服。

腹中满痛入心不得饮食 黄芩一两，白芍四两，白术二两，水一斗，煮取一升，分五服，半日服完 令易生，月饮一剂为善。

腹中结块，或如淋沥妙 麻子一斤，水五升，煮汁三升，分五服服之。

产难三日不出方 取鼠头烧作屑，并花水服方寸匕，日三服。

产难 烧大刀环，以酒一杯饮之，即散即出，收死不分娩者。

1 入：原作“义”，据《备急千金要方》卷二《妊娠诸病》“治妊娠腹中满痛入心，不得饮食方”条改

2 上：原作“止”，据文义改

3 匕：原作“七”，据《备急千金要方》卷二《产难》“产难三日不出方”条改

治产难累日，气力^①乏尽不得生，此是宿有病方 阿胶二两，赤小豆一升，水九升，煮豆熟，取汁纳胶令烊，每服五合，连三服即出。

产后寒热恶露不尽 柴胡、生姜、桃仁、当归、黄芩、芍药、吴茱萸，煎服。

产后三七日余血未尽绞痛 生姜、生地 人黄、芍药、茯苓、细辛、桂心、当归、甘草、黄芩、大枣煎服，日三次。

产后无乳汁方 石钟乳、滑石^②、白石英各二两，通草、桔梗煎服 又方、钟乳、通草等分，为末，粥饮服方寸匕^④，日三，后可兼养两儿。

乳少，用猪蹄^⑤ 二，通草一两，煮服 后用崔氏麦穗、穿山甲炮炙、麦冬、龙骨、王不留行各^⑥等分，为末，热酒调下。外用木梳，在乳上梳三十次。

鲫鱼汤 治乳少，用鲫鱼、木通煮服，则乳汁自多

① 力：原作“刀”，据《小品方》卷七《治妊娠诸方》“治产难历”条改。

② 滑石：《备急千金要方》卷二《下乳》“治妇人乳无汁方”条中“硝石（一用滑石）”。可参

③ 各：原脱，据文义补。

④ 匕：原作“七”，据《备急千金要方》卷二《下乳》“治妇人乳无汁方”条改

⑤ 瞿：原作“瞿”，据《济阴纲目》卷十四《乳汁不行》“罗氏涌泉散”条改。

⑥ 各：原脱，据文义补。

达生篇举要¹ 胎至半身后，胸腹不宽泰者，用老苏梗、砂仁各二钱，盐米略炒，研，洋糖泡汤，日饮之。

胎至八九个月及足月，宜多吃麻油不可食冰、腐皮鸡衣，及全一物难易产，二物解毒胎。又宜猪胰子²，俱易产。

忌吃椒姜煎炒、猪血猪肝、甲鱼蟹。忌见龟兔及一切宰杀凶恶之事。

有孕后，须要内边推拿，不可尽在一边，则易产。

八九月时，预买杜园四五斤去取气，置汤碗内，绵纸封口，作孔令透气，于饭锅上，日日蒸之极烂，候临产时用。

产前宜备加味芎归汤一剂，³，益母草二斤，生化汤一剂⁴，炭、烛、酒、醋、粥米、鸡蛋、裹儿绵花等物。

有临月先服宫中十二味药一剂者，方用黄芩六分，白芍、当归各二钱，川芎、菟丝子各一钱五，白芷、白芍一钱，熟地、川贝一钱，麦冬、羌活各八分，紫苏七分，醋炒，厚朴姜炒，桂枝五分，羌活五分，枳壳六分，炙甘草五分，姜一片，水一碗，煎八分，空心服。胎产服之即生，真仙方也。

临产要法 产妇须自家立定主意，不必惊慌。若临得

1 达生篇举要：达生篇，又称《达生编》，是清代早期间世的一部价值颇高的产科专书，刊行于康熙五十四年（1715），问世以后的百余年间曾多次重刊。

2 板：即原书的页码，原书为刻本，一板为一页。

慢則是試痛，只管安臥穩食，不可忙動。要有一連五七等痛，漸漸緊，此方是生產，乃可與人接生，以便伺候，此第一辨清。

臨產必要上床安睡，閉目定心，養和體力。若不能睡，暫時起來，或扶人腰背，或扶桌立坐。若少睡，又上床睡，忌以回睡為第一妙法，但小兒轉身不盡力，日久橫生、倒生之患。又立時宜立，坐時宜坐，不可將身左右擺扭。

切不可輕易臨盆用力，揉腹擦肚。不可听信主要兒頭已到產門、臨盆太早，用力太早，誤人甚多，可記。要知橫生倒產，皆是可候未此，用力太早之故。

倘若用力太早，致有橫生倒產者，急宜安睡，用人刮四味芎歸湯救之。此湯能助血氣，養精神，將兒手是輕輕托入，再睡一兩夜，自然生矣，切勿驚怪。又曰：倘托之不入奈何？曰：若肯睡，則无托之不入理。若吃四味芎歸，再无產之理。此時只怕不與飽睡，又或動手動脚，乱吃方药，則难救矣。

臨產時，只可老成曉事者一人安靜伺候，不用多人。其一切亲戚妇女俱勿令入房，恐有大惊小怪，致产妇不得安睡而誤事也。更忌求神许愿混鬧，誤人性命。

飲食宜與鎮少與食之，或鸡鴨甘肺清湯、粥湯最妙。湯宜多备。

冬月房中宜設火盆，夏月尤多設井水，仍須換之。

试痛 儿七八个月，或母腹中有火，或起居不节，令儿不安而痛，不足为奇。只有照常饮食，加意安眠，且自然平复。或痛之不止，则保产无忧散，一服即愈。

试生 最日上。此与近月数日生，无别。四月而产者，若不忌其故，轻伤胎气，终日坐立，不令捶卧，或揉或捏，或用手抱，或用药打，多致不报者多矣。但宜清静法，一阵又一阵，或午间午寝，皆试而已。若一阵紧一阵者，方是正生。

伤食吐乳者，当脐而痛，手按之更痛，或脐傍有一硬块也。

受寒肚痛，多在脐下，绵绵而痛，不增不减，得热则少减是也。

产冬天气，滴水成冰，贫家房中无火，以致怕寒而分娩艰难者，亦因临盆太早，先去衣久坐数斗。若令拥被安卧，待时而产，岂有此患。

若依此言，世无难产者矣。然亦有母体太虚，胎失所养者。又有母高伤寒之后，热毒伤胎者。又有跌火伤胎者。有平日过食椒姜煎炒，热毒伤胎者。以及跌仆损伤者，多令胎死腹中。否则更无难产矣。

用力不过。落茶时，小儿果到产门，则浑身骨节疏舒，肌肉陷下，腰腹酸软，异乎寻常，大小便一齐俱急，目中金花罩眼，真其时矣。当于此时，临盆用力一阵，子母分张，何难之有。若非正产而妄用

力，必有横生倒产之事。

产后上床，宜高枕靠垫，围紧腰间^①，勿令睡下。膝宜竖起，勿可伸直。随饮热童便一盞，继以益母草汤加入沙糖一块或生化汤一盞，时时以粥汤与之。只宜闭目静养，勿令烦躁。二三日，恐倦极熟睡，则血气上逆，因而眩暈。但不宜高声急叫，以致惊恐。逾一周时，方可睡下，宜时以手从心轻磨至下腕。

四宜避风，不问有痛无病，俱用热童便和热酒各半，每次一杯，一日三五次，间以益母草汤，酒亦不宜多。若无大病，不必服药。

产后宜用白石子，烧红入醋，令醋气入鼻，帐中常有醋气，可免血晕，且收敛神气、胆气，又能解秽。每日四次，亦三日而止。

产后恶血冲心，血晕不省人事者，急用韭菜一把切碎，放有青壶瓶内，以热醋一大碗灌入，密扎壶口，执起产妇，以壶嘴向鼻，远远熏之。腹痛甚者，用生化汤，一服即愈。

生男生女，人合所招，与妇无干。或连胎生女，能养之，人必怜而与之以子，不可喜骂怨言，令妇气苦成疴伤生，只宜好言安慰。又有将女溺死者，决然多闻，人耳不容。

① 密：原作“蜜”，据《达生编·产后》改。

饮食各处不同，只要粥时吃粥，饭时吃饭。二日内，只用鸡汤，吹去油，澄清饮之，未可食鸡。十日内，不可吃猪肉。一月内，不可吃猪油，恐其壅塞经络，气血不通耳。余无所忌。

鸡子能去瘀生新，但要煮得熟透方好，糖心者大忌。鸭子切不可食。

忌饮醇酒，食咸味，能烧干乳汁。只宜淡酒，食淡最好。

乳少者，血虚之故，用通脉汤。生黄芪一两，当归五钱，白芷七钱，七孔猪蹄一对，煮汤，吹去浮油，煎药服之。覆面而睡，即有乳，二服必效。

华佗愈风散 治产后中风，口噤血晕，心头倒筑，吐泻欲死，用荆芥¹、²、³、⁴，每服二钱，童便调服。口噤则灌之，牙齿咬紧则不研末，将荆芥、童便煎，灌入鼻中，其效如神。

一切胎前、血崩、死胎、胞衣不下、横生倒产，又见妇人方。

急救 有儿先露背者，令产妇平卧，以手徐推儿背，下体令其正直，复以中指撑其肩，勿令脐带缠住即生。有儿先露足者，令产妇正卧，以手徐推儿足，仍推儿转平即生。又有⁵，以鸡针破刺儿足跟，彼即上缩，令产妇安。

1. 七：原作匕，据《达生编》卷中《方药》“通乳散”条改。

睡忍痛片刻，即顺生矣。有儿头偏在一边者，令产妇正卧，以手徐摸儿头，扶正即生。或儿头后骨偏在谷道傍，徐推近上即生。有儿头虽正，但不能下，因旋转时挤伤肩也，用中指按儿两肩，理脱脐带即生。皆用力太早之故。

又有坐产，儿将欲出，因产妇疲倦，久坐横脊，抵其生路，急用巾带高悬，令产妇以手攀之，轻轻屈足良久，儿顺即生。

又有胞浆流，三日不产者，不必惊慌，切勿可动手，惟安睡，俟浆流渐少或流尽自生。有浆水流尽，胎上难产者，急用四物汤^①，加人参一两之多，以大锅在房内煎熬，使药气满房，口鼻吸受。内服加味芎归汤^②，一服，再服，至血余，连进两服，以生为度。

死胎辨法 又法儿若未死，少按其发，必退入，此法更妙。

胎衣不下 有临盆太早，筋骨开张，儿下即困迷，衣不下及者。有惊吓产妇，气逆血滞，瘀积不下者，治已见前。又法令产妇静坐，取桂调经丸二十个，煮汁于茶杯，敲下即落。此方和血暖胃，半时降衣，最为神效，无他杂物手取，致惊产妇。古方有用蓖麻子^③，捣余脐内，泡出，速即洗净，否则为害。

胎衣不下，有因临产太高者，有因急产长时停阳者，用艾叶烘热，自脐上至小腹，沿抹上百次，即下。内

服红花二钱，胀消衣下。

论难产之故 总因人欠主持，以致产妇惊吓，气血冲上，肝旺则胃灼不宁，即有横生停衣等患。瘀血入膀胱，则成血热血凝等患。又有本人自招者，平日惯于行动，以致气血不和谐，临产用力太早。胎将转，力过则逆；胎才转，力已则横；胎虽转而顶门未露，力过则手足先出。凡见此等，不必惊慌，速令仰卧，内服和血保产之剂，则顺生矣。

小产重于大产，其调养调理，须过正产十倍，方保无病。

小产后数日，忽然浑身大热，面红眼赤，口渴、比血虚之后，宜当归补血汤大补阴血，退血虚发热如神。分毫不可加减。当归二钱，黄芪黄芪一两，水二碗，煮一碗，一服立愈。若认作伤寒而用黄芩、石膏等，必死。

妊娠用药 凡生也用姜制，白芍用酒炒，鼠、兔二丸耗气损血，产时白脉解散，儿已出而香气未清，其损多矣。当归芍、大黄、红花大破刻血，多致血虚发热，遗患无穷，原不知保产丸无此三味，即保产丸之无弊也。

妊娠有忌药，勿可妄投。如丹皮、薏仁、牛膝、通草、枳实、干姜、茜草、干姜、桃仁、延胡、茜根、槐角、肉桂、皂角、蔓草、大黄、红花、芒硝、乌山、天雄、乌头、刀豆、三棱、莪术、干漆、麝香、巴豆，非洞明病症，切不可妄用。

临产六字真言，一曰睡，二曰忍痛，三曰慢临盆。按：六字真言，达生之纲领也。但不详产病之由，不知此六字，即可保全天下万世之妊娠也？故历详产病之论，使人熟此六字，即可免之。犹之先开脉案，而后以药救之也。

保儿举要¹ 凡生产艰难，若遇大寒，儿生下不哭，或已死者，急用软绵衣物包裹。或令精壮人解衣，将儿贴肉包住。或再用香油纸捻，将脐带慢慢烧断，使暖气入腹，可望阳回气转，渐渐作声而活。倘不急急偎抱，或先剪脐带，则不可救矣。又方将袍衣连带用火炙，令暖气入儿腹。取一猫，用青布裹头目，令一伶俐女人拿住猫头向儿耳边，以口重咬猫耳，猫大吼一声，儿即醒矣。初生无啼，是重门为脂皮所塞，用簪通开。吕氏搗生汁，入口即活。

儿初生，乘其未发声时，急为拭去口中黏血，可免胎毒。又看舌下，若连舌有膜如石瘤子，若伸不出，声不转者，以指甲摘断之，有血出即活。若出血多，用发灰同猪脂涂之。

断脐法 儿出胎，洗后方断脐带，则不伤水生病。断脐须待汁尽，否则新湿入腹作脐风。又距于近脐五六寸处，以线扎紧，以绢包裹，以手屈剪刀令暖，剪断之。

¹ 保儿举要：“稿本”卷四内封作“妇人所保儿举要”，可参。

略剪袍口在脐带上一用绸括软新绵合之裹脐，调其缓急，急则吐涎¹，二十日乃解。若十余日怒啼，必衣中有刺，或挤捍刺畏，当更裹脐。冬月须下絮垫火令暖，儿换衣亦然，仍以温粉拍之。

胞衣 儿胞衣乃儿性命所关，密藏好，置吉方，则儿长寿。若为虫蚁犬马食之，则令凶死。今俗用新瓶，多以石灰封好盖²，亦妙。但石灰宜多³，盖藏宜密耳。贫家有将胞衣卖钱合药者，儿必多病而夭，山崩钟应⁴，理或然也。锡医某好买儿胞合药，半家火死，人以为孽报云。

浴儿 儿生以益母汤洗之，再以光粉、明粉拍身上辟邪吉。朝洗儿，夏月则可，冬月严寒，断乎不可，洗则致儿百病。北方之人，儿生下不洗，但以旧绢拭净包好，放大人怀中，至一二岁出痘后方洗浴，故元气壮实。又古传壬午及丁未、癸巳三日，切不可浴儿，主凶。寅、卯、酉三日吉，切勿犯上三日。

开乳 先以和米汤¹喂之，以助谷神。再以川连五分，甘草一分，水煎成膏，与一二匙，以解毒。再吃朱砂枣儿²，白干³二匙，然后吃乳。有用大黄者，冬

1 涎(xian 现)：干呕，不作呕而吐。泛指呕吐。如《说文》“呕，不呕而吐也”。

2 今：原作“令”，据文义改。

3 山崩钟应：出南朝·宋·刘敬叔《异苑》第二卷：“北蜀郡铜山崩，有钟鸣应之耳。”比喻同类事物相感应。

月断乎不可，遗害无穷。

小 儿

小儿初生胎，急以棉裹拭，揩拭口中舌上恶血，则无他病。否则啼声一发，秽物咽下，致生诸病。

小儿初生，每日早晨，用薄荷汤或开水揩拭儿口，免生百病。

小儿初生，眼闭口开，由母食热物所致。以葱煎汤少许，蒸水洗眼上，一日七次。又方用灯心、黄连、秦皮、木贼、红枣煎汤澄清，频洗两目自开。

小儿下地不啼，不能饮乳，奄奄如死者，急看喉间悬痈前腮上有一泡，用指搗破，以棉拭去恶血，勿令咽下即愈。

小儿生下不食乳，乃心热也，黄连、甘草煎汤灌之。

小儿初生，遍身无皮，但是红肉，以白米粉扑之，生皮乃止。

小儿初生，遍身如鱼泡，如水晶，碎则水流，密陀僧为末，掺之。

小儿所脐后，脐汁不下，用车前子炒焦为细末，敷之。

小儿肚脐突出半寸许，此气旺不收也。急用茯苓、车前子、甘草、陈皮、灯心草煎汤，灌之即安。

小儿初生，大小便不通，腹胀欲死，葱白汁、乳汁各半调匀，抹儿口中，与乳大吮即通。或用葱白同盐炒，绢包运腹上。

小儿初生，外肾肿大，取硫黄、吴萸为末，猪乳汁调涂脐腹上。

小儿初生，发背，用木砂、雄黄为末，猪乳汁调抹口中。

小儿初生，若喉里、舌上有物，如芦箨¹，落水状者，若悬痂有血起者，可以细针长针，留置²如粟米许大，以刺法破令气出，反去血汁。若未消者，未日又刺之，一日即消尽。小者，一日即消。有苦舌如此者，名重舌。有在颊里及上唇如此者，名重唇。有在内眼上者，名重眼。皆刺去葱白包，刺后用盐汤洗拭。又朱砂、硃砂、冰片、朴硝为细末，煎汤，将葱蘸搽口内。凡赤眼、鹅口、重舌、重唇、口疮者，皆受胎时受热，上焦热极而生。刺出血后，急以鸡内金为末，干掺口内妙。

口中有虫 儿吃乳不稳，面色赤，鼻孔黄，恐作撮口。有虫似蛄牛，用竹沥和生黄少许服，或葱白捣碎，塞舌上。

1 芦箨(tuō 拓): 箨，本义为竹笋上一片一片的皮、笋壳。此处即芦笋。如《幼科心法要诀》卷二《初生门(下)“悬痂”条注:“凡喉里上肿起，如芦箨盛水状者，名曰悬痂(芦箨者，芦笋也)。”

2 出:《备急千金要方》卷五《初生出腹》“小儿出腹六七日”条作“刃处”。

撮口著噤脐风 一病最毒 如口噤不开，百药不效者，用生南星炮去皮脐研细末，龙脑少许，合和，以指蘸生姜汁于大牙根，擦之，立开。

脐风撮口，最难救。预防之法，宜时以软帛包指拭口中，牙根上有筋两条，使用剪刀轻轻割断，以猪乳点，再用黄连去须，五分，豆豉十四粒，甘草一两，葱白寸，用童便煎。以棉裹指，拭儿口中。按：二朝洗儿，不过俗例，如待满月后洗，不但可免惊风、脐突百病，而且元气不伤。

口噤 赤者心噤，白者肺噤。用马尿白如豆大一枚，绵裹水煮二沸，分两服。又方雀粪四枚为末，著乳头饮儿。

噤口风者，眼闭，啼声渐少，舌上聚肉如菜米状，吮乳不得，口吐白沫，一名鹅口，用辰砂膏。

辰砂膏 辰砂一钱，硼砂、马牙硝各一钱半，全蝎、珍珠末各一钱，麝香一分，为末，土纸封裹，自然成膏。每取一豆许，薄荷汤调下。或乳汁调涂乳头上，令儿吮之。字者，二分半也。

撮口外证，舌强唇青，聚口撮面不饮乳，用辰砂膏或龙胆汤。

龙胆汤 龙胆草、钩藤、柴胡、黄芩、桔梗、赤芍、炙甘草、茯苓各五分，蜥蜴一枚去尾足，炙用小半个，大贝半分，纸裹煨，红枣去核一个，防风、麦冬、心，各一分，水煎服。此方兼治肝胀青筋，吊肠卵疝引痛诸症。

初生撮口者，面目黄赤，气喘，啼声不出，乃胎热流毒心脾也。用白僵蚕二枚，略炒为末，蜜调，敷唇口即瘥。

脐风 脐风者，小儿断脐后，为风湿所乘，或尿湿裤裙而成。面赤喘急，脐肿突，腹胀满，日夜多啼，不能饮乳，甚则发搐，口出白沫，用宣风散。《千金》有脐风、脐湿、脐疮三症。

宣风散 全蝎 一个，炙为末，麝香五厘，以金银器煎汤下。

又有热在拘攣，伸引努力，亦令脐肿发风，宜千金龙胆汤见前。

脐肿 以荆芥煎汤洗净后，取葱叶火炙过，候冷，指甲刮薄，贴肿处，次日使消，用通心散。

通心散 连翘、木通、瞿麦、梔子仁、黄芩、甘草各四分，灯心、麦冬同煎服。

断脐后，为水湿所伤，或入风冷，脐肿不乳，用柏墨散或五通膏。

柏墨散 黄柏木、釜下墨、乱发灰等分为末，干糝或油调敷。

五通膏 生地、生姜、葱白、萝卜子、田螺水共捣，搽脐上一指厚，少时屁出而愈。此方通治脐风撮口。《医心方》见后。

脐突 旬日，外脐忽光浮如吹，捻动微响，间或惊悸

作啼，用白芍汤，又用外消散

白芍汤 白芍、泽泻、炙草、薄、桂。

外消散 大黄、朴硝各半钱，朴硝二钱，为末，入醋拌匀，用一钱，取田螺洗净，再以水半碗，沾过一遍，去螺用水，调涂印处即消。其药须仍浸水中，勿可干之也。此方专治感温热搏，致肌器以毒乎神，在自于单汤，候冷调敷。

脐湿 用枯矾龙骨为末，入麝香少许，拭脐上，粉脐上，避风。

夜啼有四 寒则腹痛自啼，面青白，有冷气，手足冷，腹亦冷，曲腰自啼，用六神散。热则心躁自啼，面赤小便赤，口中热，腹暖，或有汗，仰身自啼，用导赤散。又心气热也合面卧，实则仰卧也。口疮重舌则吮乳不得，口到乳上即啼，身皆微热，急取灯照，口若无疮，则舌必重也。治法详见于后。

有客忤者，小儿神气软弱，忽有非常之物或面生人触之，其状一吐青黄白沫，面变五色，腹硬似惊，但眼不主窜耳。看其口中悬痂左右，若有小核，即以指爪摘破。用钱氏安神丸或苏合丸姜汤化下。中恶者，卒然心腹刺痛，闷乱欲死，口中青黑，即服苏合丸。未醒，以皂角末，吹鼻取嚏。

六神散 人参、茯苓、山药、白术、白扁豆、甘草炙，各等分，为末，每服一钱，水一盏，枣一枚，姜一片，煎至

五分，服。

导赤散 生地、木通、甘草各二钱，竹叶七钱，煎服。

钱氏安神丸 麦冬、人参、茯苓、山药、芡实、白芍、甘草各二钱，朱砂一钱，冰片五分，为末，蜜丸，芡实大，每服半丸，沙糖水化下。

凡生一子，母血虚，乳汁之时，乳汁不止，用葱叶一两，各一两，为末，打成膏，贴胸上。又方，槐叶一两，为末，煎服。厚朴一两，亦佳。

凡生中，母血虚，白芍、甘草、乃邪热垂心也。用乳香、没药、木香各二钱，乳香、没药，乃心、肝、胆、脾、为末，煎服。如中子大，每服一丸，石脂、芍药、甘草汤下。

治小儿惊风，状如抽搐，亦治惊风，柏子仁一两，为末，粥饮调服，一日三四服。

凡生中，多惊风，此误人命，宜用此方。黄芩、花二两，为末，入白芍、黄连、黄柏、冷水调下，立效，神方。

小儿夜啼，忽然惊悸不识母者，是梦中见母去之，故哭母去也。但令人抱中子，令母从外把火火照入，唤之，谓母来也。此方人下未之知，隐言效方。

治小儿惊风夜啼，咬牙咬牙，及疳积、腹痛、疳方，蝉花、白芍、甘草、黄芩、炙甘草各一分，红胡五分，为末，一岁一分，蝉壳汤下。

夜啼方 取村中草，着户上，立止。又方，取黄麦并

中败草，悬户良。右脐下书甲字，瘥。

小儿患后声不出，用酸枣仁一钱，白茯苓半钱，朱砂钱，为末，人参汤下。

小儿惊退而声哑不能言，用入南星炮，为末，雄猪胆汁调下，咽入喉中，即能言。又方，牛胆星少许，薄荷汤下。

小儿初剃头，以杏仁一枚去皮尖，研细末，薄荷一两，研细，牛麻油一两滴，赋粉拌和，头上擦之，免生疙疥热毒。其后剃头，亦宜此法。

养子十法 一要背暖，二要肚暖，三要足暖，四要头凉，五要心胸凉，六要勿见怪物，七脾胃常要温，八啼未定勿使饮乳，九勿服轻粉、朱砂，十少洗浴。

小儿乳后，不得使与食。食后，不得使与乳。不慎，疳病从此起也。凡鱼肉、水果、湿面、烧炙、煨炒皆不宜。

过暖生热，热生风，提抱生痈，喂饲生瘤。

乳母须每日摸儿项^①后风池，若壮热者，即须熨之，使汗即愈。

儿两月后，目瞳子成，能笑，能识人。百日任脉生，能反复。半晬^②尻骨成，当教学坐。二百日外掌骨成，教

① 项：原作“顶”，据《幼科证治准绳·证治通论·杂将护法》改。

② 晬（zuì 最）：古代称婴儿满一百天或一周岁。如“三月能行，晬而能言”。

之旬旬。一曰筋骨成，教之独立。周晬膝骨成，教之行步。若哺抱过时，必致损伤筋骨。

脉 热则脉疾，寒则脉迟，实则有力，虚则无力。

五脏 心主惊，实则叫哭发热，饮水而搐，虚则卧而不安。肝主风，实则目直，大叫呵欠，项急烦闷；虚则咬牙多欠，气热则外生风，气温则内生风。脾主困，实则困睡，身热饮水；虚则吐泻生风。肺主生焉，实则闷乱，喘促；虚则哽气，长出气。肾主虚，无实也。惟逆疹，肾实则变黑。肾弱，无精光，畏明，体骨重。

面上证 左腮为肝，右腮为肺，额上为心，鼻为脾，颊为肾。赤者热也，又为积。黄者积也，又为热，或成疳，或作痞。白者寒也，欲吐利。青者惊积也。黑者痛也。

目内证 赤者心热也，用导赤散。青者肝热也，用泻青丸。黄者脾热也，用泻黄散。无精光者，肾虚也，用六味地黄丸五钱，可也。面上浮肿，主久咳嗽，乃脾受疳积也。

泻青丸 当归、川芎、梔子、羌活、防风、竹叶、龙胆、梔子、大黄。

泻黄散 梔子、藜蘆、藿香、甘草各一钱，石膏六分，防风六分，薄荷一分，煎服。或为末，每服一钱。

口唇证 唇白，主吐涎涎逆、吐血便血。唇红，渴饮烦燥，如久渴唇唇红者，是虚证也，忌用凉药。唇黄，主脾受积后发肌。唇口紫及吐涎者，主虫痛；不吐涎者，是

积病。唇白而黄如橘，置之似血，主口变青，主脾虚脾寒，不能食也。

胎毒者，小儿壮热时，心忪不安，握拳握车，咬牙，牙关强直，遍身发冷，或面青眼合。凡胎风胎毒，不可认作慢惊，误用温药必死。视其唇白气色，赤白时碧者，可治。虎口指纹出入半者，可治。先言惊风邪，利惊化痰，凉气及贴脐法。如其此证，急取生薑一两，香少许，细研，猪乳调抹入口。

小儿未满月，惊搐似中风欲死者，用桑叶，以新汲水磨浓汁，涂五心上，最效。若面青全背，口眼喎斜，用全蝎散。

全蝎散 全蝎四钱，天麻、白僵蚕各二钱，川芎、羌活、甘草、杜枝、赤芍、麻黄各一钱，大麻六钱，南星二钱，以桑叶洗，切，焙干，一钱，共为末，每服一钱，姜七片，煎服，日三四服。忌羊肉。

贴囟门法 葱白二条，姜一片，捣烂纸上，令置手中令热，急贴囟门。少顷，鼻利搐止，则去之。

惊有四证，惊、风、痰、热也。有八候，搐、搦、掣、颤、反、引、窜、视也。

惊生于心，风生于肝，搐始于气，治搐只以枳壳、枳实为主。

① 二钱：原脱，据《保婴撮要》卷二《偏风口噤》“钱氏全蝎散”条补。

身有力，身热为大者，为急惊。身冷为小者，为慢惊。仆地作搐，身目开张者，为痫。头目仰视者，为入吊。角弓反张者，为瘈。治各不同也。

急惊者内有热，即生风，或因大厚衣发更潮搐搦，身体与口口气皆热，及其发尔或一起，则了了。故，用药利下祛热，心神安了即宁。上慢黄移之气，无复出于小儿，犯之令儿急惊。

小儿发搐，不可一值重铺之凉地，使儿扑其上，但任其搐，风力自能渐渐自止，不可伤人。切不可搦捏掙扎，恐风气流入经络，手足拘挛，半身不遂也。急惊搐时亦然。

急惊似其搐势稍减，服抱龙丸或辰砂丸。

抱龙丸 治惊风搐搦，身热昏睡，牙关紧闭。

利惊丸 治身热口赤，口中气热，大小便黄赤。黑日麻黄、石膏、天竺黄、青黛、轻粉各一钱，方木、蜜丸豌豆大。一岁儿一丸，薄荷汤下。此方不可轻用。

嚏惊散 治急惊慢惊，昏迷不省。生半夏一钱，皂角五分，为末，吹少许入鼻中，即醒。

又钱氏安神丸，治急惊风及心热惊悸等症。

治急惊人忌防风丸，防风辛温之药，必杀人也，切记。

老医常言，小儿惊搐，多是热证。若先用凉风药白附

子、全蝎、僵蚕、川乌之类，便是坏证。后有《幼科》¹⁾，只用导赤散，加地黄、防风送服，其搐即止。次服了却散，神效。青堂先生曰：此方救人多矣，切勿轻易。

仓卒之间，惊与风证俱作，只用五苓散，少解其证。若稍热之剂，则难用也。

病即急惊之证，但搐发时仆地作声，昏而不醒，惊则不作声，不吐沫也。四体柔弱，发而时醒者，为惊。若身强硬，终日不醒，则为痉症。

病证将作，耳后高骨间必有青纹弯弯如线，急为风破，须令出血点滴，气乃通。搐发不能言者，南星炮为末，雄猪胆汁调和少许，涂之效。又方，苏合丸治惊要药也，每用猪心汤下。又方，古钱²⁾，煎诸药服之。黄清心丸、竹叶汤下亦妙方未载，有卖。

天钩者，头目仰视，惊悸壮热，两目反张，涎出不流，手足抽掣，不可忍笑如鬼哭声，甚者承浆皆生。因乳母厚味，积毒在胃，致儿心脾生热痰郁结，外挟风邪为患，法当解利其邪，用钩藤饮，又乳香丸，又余顶片。

钩藤饮 钩藤、僵角、天麻、全蝎、木香、甘草、生姜煎服。

乳香丸 治内钩腹证惊悸。乳香、没药、沉香各钱，麝香十四个、胡椒一钱，为末，蜜丸桐子大，薄荷

1) 幼科：《幼科释谜·惊风·急惊风》作“医幼科者”，可参

2) 者：此后原衍“尔”字，据《本草纲目·金部·古钱》删

钩藤煎汤下。

涂顶膏 治人钩风备急方，生乌头去皮脐、芸苔子各一钱，为末，每用一钱，新汲水调，敷儿顶上，愈即去之。

以上诸惊，略各急用，惊退之后，须请名医看视，或六君、或逍遥、或越鞠诸方调理，又当视其乳母素有何病，兼治乃效。

唇口歪斜，腹胀少食，目胞浮肿，面色赤黄，肢体倦怠，皆是肝木乘脾之证居多，当审五脏相胜而旺之一。更有心肝风火乘脾者，当补中益气和钩藤治之。若执用祛风导痰之药，则死矣。

慢惊者，由于大病之余，吐泻之后，及过服寒凉之药，中气大亏而得身冷，口鼻中气寒，大小便青白。最虚者眼半开半合，似睡不睡也。此脾虚则生风，风盛则筋急，宜贞芪汤、白术散、益黄散加防风、冬瓜仁。凡泻青色者，防慢凉，木克土也，且先治泻。若急惊传来，只可截风调胃，均平阴阳为要。

黄芪汤又名保元汤 治慢惊，大便泻青色。黄芪一钱，人参、白芍各一钱，炙草五分，煎服。

白术散 治吐泻日久不止，烦渴引饮，欲成慢惊。葛根一钱，人参、白术、茯苓、木香、藿香、甘草各一钱，煎服。泄泻加山楂、炒扁豆、肉豆蔻各一钱，已成慢惊加大麻、细辛、全蝎、白附子。凡此症皆津液内耗，不问阴阳，多煎取足饮之。

益黄散 惊儿泻青色，大便泻如丸，宜多服此。黄芪一钱，人参、陈皮、白芍各一钱，牛草、炙甘草各五分，茯苓四分，黄连二分。

辨证 慢惊证者，属胃虚也。慢惊身冷，元气加温不出也。慢惊鼻孔壅闭，真筋关了，与快证同也。慢惊面色青黄及白，气口无脉也。慢惊口重而冷，手足已慢惊大小便青白，皆亡与人物全无人已。慢惊脊背脊痛，什气不足也。慢惊手足搐搦，止不住者，急投温。慢惊角弓反张，而脉筋急也。慢惊乍寒乍热，男则泄少，女则泄多也。慢惊汗出如油，非身自表不同也。慢惊于中无痰，而不足以养筋也。慢惊因胃下泄，而泄也。慢惊身虽少热，口唇焦裂出血，偏不喜饮冷浆水，以及当年之乳。慢惊之物皆不其消化，胃中无火可也。慢惊之焦黑，与真阴之不足也明矣。

慢惊之证，不拘何因，皆当急用温以救胃气，不至伤食当急救之。即伤寒一伤寒，亦当急救。其尤以有邪者实邪，一经吐泻，业已全除。脾胃全虚，仓廪乏，若不急救，恐虚痰上涌，命在顷刻矣。

人凡因发热不退及吐泻而致者，也属胃虚，然必以慢惊；并非感冒风寒发热可比，故不宜发散。宜首温以救

1 抑：原作“揭”，据《慈幼便览·惊风辟妄》“庄在田《福幼编》治慢惊风神效二方”改。

2 肾：原作“臂”，据《慈幼便览·惊风辟妄》“庄在田《福幼编》治慢惊风神效二方”改。

本，加姜一钱以引火归元。凡同辛热中开寒痰，再进温补方为得治。

逐寒荡惊汤 伏龙肝^①一钱，丁香^②1钱，炮姜、胡椒、肉桂各一钱，共研细末或煮成浓汁，不可见火，茶一酒杯送下，吐泻立止，接服后方，定获奇效。

加味理中地黄汤 熟地五钱，党参一钱，知母一钱，白芍一钱，白术一钱，茯苓一钱，黄肉一钱六分，白杞子一钱，炮姜一钱，条芩一钱，炙甘草、肉桂、五味子各一钱，补骨脂一钱，白术四钱，姜三片，红枣三枚，胡桃一个，打碎，灶心土一两，煮水煎药，取浓汁大半杯，加附子一分，煎水掺入，凉儿大小，分数次服之。如大热不退，加白芍一钱。泄泻不止，加丁香六分。只服一剂，即去附子，只用丁香一钱。附子一日，只用白附子一分。若吐泻不至已甚，或微见惊搐，胃中尚可受药，吃乳便利者，并不必服逐寒荡惊汤，只服此一剂，风定神清矣。如尚未成惊，不过昏睡发热不退，或时热时止，或日间安静，夜间发热，以及午后发热等证，总属阴虚，甚宜服之。若新病壮热之小儿眼红口渴者，乃实火之证，方可暂行清解。但果系实火，必大便闭结，气壮声洪且喜多饮冷茶水。若吐泻交作，则非实火可知矣。倘大虚之后，服一剂无效，必须大剂多服为妙，寒热断不

① 次：原脱，据文义补。

② 只：《慈幼便览·惊风辟妄》“加味理中地黄汤”条作“又”，又胜。

可误。

凡抱龙、生肌等丸，皆疏风热痰之药，急惊最为对证。慢惊系寒痰夹风，下咽即死。兼按：大约宜六君加减，以白附子定风，柴胡平肝，则不至成坏证。薛九生屡言之。

发热 小儿之热，有心肝脾肺肾，五脏之不同。虚实温壮，四者之不一。及表里血气、阴阳浮陷与夫风湿夹杂，各当仔细辨之，对症下药。但患一证，杀儿反掌，辨之慎之。

辨证 凡伤寒，男体重面黄，女口赤面急，各皆寒，口中气热，口欠颊间青色。若身疹则口欠项痛，腮赤唇多，目胞亦赤，午凉午热，须视其两耳尖冷、尻冷、足冷、鼻尖冷，又视其耳后有红筋赤缕者，为真疹将发也。

歌诀 五指稍头冷，惊风不可安。若还中指热，必定是伤寒。中指独自冷，麻与痘相干。男左女右引，分明仔细看。

凡疹痘皆发热，若寅卯辰时潮热者属肝，当出水疱。巳午未时潮热者属心，当出点。申酉戌时潮热者属肺，当为脓疱。亥子丑时潮热者属脾，当出疹子。

白日内咳嗽痰壅，用贝母一钱，甘草（白炙）二钱，

① 炒：《本草纲目·草部·贝母》作“炙”，义胜。

② 二钱：原脱，据《本草纲目·草部·贝母》补。

为末服。

胎毒瞎眼 儿有产小兒，两目红涩、赤闭肿胀，以蚯蚓屎捣涂两目，上则再换新者。或以生南星、大黄为末，醋调涂两脚心，神效。丝瓜连蒂取一寸，连皮子纳砂锅内，以桑柴火烧存性为末，用沙糖捣成饼，时与儿吃完，能稀痘解毒。

发热 身热不饮水者，热在外。身热饮水者，热在内也。用六一散最妙。凡热症流利后，或和留后，无虚汗而勿温补，热必随生。

小儿急惊热，或凡毒、惊风、痰热、呕吐、泻痢，用天乙丹最妙。

天乙丹 茯苓、茯神、白茯苓、滑石、猪苓、薄荷各一分，泽泻、麦冬各二分，人参一钱，灯心一握，同煎，加朱砂三厘冲服。

小儿有疾，其面色必异。以鼻之上眼之中间，中正精明穴上谓之山根。色红者，心热也；红筋横直，现于山根，皆心热也。色紫者，心热之甚，而肺亦热也。色青者，肝有风也；青筋直现者，乃肝热也，风上行也；横现者，亦肝热也，风下行也。色黑者，风甚而肾中有寒。色白者，肺中有痰。色黄者，脾胃虚而作泻，黄筋现于山根，

①：原作“咸”，据《保幼新编·稀痘法》“独圣散”条改。

②：《保幼新编·急惊》作“胎”。《医学入门》卷七《妇人小儿外科用药赋》“天乙丸”作“瘟”，义胜。

③：原脱，据《石室秘录·岐天师儿科治法》补。

不论横直，皆胃中之虫也。小心之虫，十有九情。不补脾而用消剋，不能救也。

通治小儿脾胃弱病 芩芩一分，白术一分，茯苓二钱，甘草一分，陈皮一分，神曲一分，半夏一分，水煎服。如伤肉食，加山楂一分。伤木食，加麦芽一分。伤面食，加莱菔子一分。吐者，加丁香一分，藿香一分，去甘草。泄者，加干姜三分，猪苓五分。

治小儿伤风伤寒，形寒发热，或头痛，或鼻塞，或咳嗽多，或喘急，用柴胡一分，枳实一分，甘草一分，半夏、黄芩各一分，白芍、焦术各二钱，陈皮一分，神曲、茯苓各五分，煎服。头痛，加蔓荆子一分。心主用手不可按者，乃实火也，加栀子二钱，炒；按之不痛者，乃虚火也，加甘草八分，吴仲一分，木香一分，乳香一分。脐痛者，加芍药二钱。腹痛者以手按之，按之而痛，乃食也，加大黄二钱；按之而不痛，乃寒也，去食也，加肉桂、干姜各一分。有汗不止者，加桑叶一分。眼疼面红赤者，乃火也，加黄连一分，白蒺藜一分。喉痛者，加山豆根三分。

岐天师传儿科秘法 山根之上，有青筋直现者，乃肝热也，用柴胡一分，白芍二钱，当归一分，半夏一分，白术五分，茯苓二钱，山楂一分，甘草一分，煎服。青筋横现者，亦肝热也，用前方多加柴胡，加麦芽二钱，干姜一分。方有红筋直现者，心热也，前方加黄连一分，麦冬五分，去半夏。加桑白皮一分，花粉二分。红筋斜现者，亦心热也，前方加

连一分，言热极于腕中也。有黄筋现于山根者，皆脾胃之痛，或泻，或吐，或腹满，如反黄者，即黄筋也，方用白术一分，茯苓各一分，陈皮、人参、麦芽各一分，神曲、甘草各一分，竹叶五片，水一盅，煎半盅，分三次服。有寒，加半夏一分，或花粉一分；有热，如口渴者，加麦冬一分，黄芩一分；有寒，加干姜一分；吐者，加白豆蔻一分；泻者，加猪苓一分；腹满者，如小儿自家捧腹，是须用手按之，大叫吁号者，乃食积也，加大黄一分，枳实一分；如按之不痛不呼号者，再加干姜一分。如发热者，不可用此方。

治小儿发热者神效 柴胡、当归各一分，白芍一钱，白术一分，茯苓一分，甘草一分，山楂一分，黄芩、神曲各一分，苏叶一分，麦冬一钱，水一盅，煎半盅，分三次服。冬加麻黄一分，夏加石膏一分，春加青蒿一分，秋加桔梗一分。有食加枳壳一分，有痰加白芥子一分，泻者加猪苓一钱，吐者加白豆蔻一分。小儿诸证，不过如此，方不可作惊风治之。有惊者，此方加人参一分，即定惊如神。有痘者，用前脾胃方加蒲黄、黄芩各一分。儿科妙法，尽于此矣。

长沙张真人传小儿感冒风寒方 柴胡五分，白术一钱，茯苓一分，陈皮一分，当归一分，白芍一钱，炙草、半夏各一分，水一盅，煎半盅，热服即愈。

腹痛 腹痛者，邪正交攻，与脏气相击而作也。挟热而痛者，必有赤或壮热，四肢及手足心热，见之热症，四时清凉饮。加青皮、枳壳。挟冷而痛者，面色或白或青，

手足冷者，见之冷甚则面黧唇口俱黑，爪甲青冷证，七气汤加肉桂调苏合丸。

邪正交攻，冷热不同者，桔梗枳壳汤加青陈皮、木香、当归为妙，内品钩藤散，其余则芍药甘草汤为安药。

腹中口中气冷，不思饮食，脾土虚寒也，用调中丸。口中气温不食，大便艰涩，秘结也，无治积滞，后调脾胃。面赤壮热，或手足并热，实热也，用泻黄散。面黄微热，或手足并温，虚热也，用异功散。若作渴饮汤，胃气虚热也，用白术散。身重连两胁，肝木乘脾也，用四君子汤，并加柴胡、芍药。若腹气重坠，脾气下陷也，用补中益气汤，虚热加升麻。手足振冷，或吃乳而泄，寒水侮土也，用六君子汤加炮姜、肉桂，如不收，急加附子。若服起死回生之药，致腹中作痛，按之则不痛者，脾气复伤也，用异功散。中脘痛者属脾，少腹痛者属肾。按之痛者为积滞，宜消；不按者为里虚，宜补。口开不思饮食者，为胃冷则下利，补黄散；不利而泄，用调中丸。面目唇焦便黄为热证，面黄白大便艰涩为积滞，口开而沫自出为虚证。又有吐衄、腹痛、腰痛、腹痛、背痛、腰痛、肾痛、偏坠痛、寒疝痛，各有治法。

调中丸 白术、人参、炙草、炮姜。

小儿腹中曲腰、啼哭无泪、面青白、唇黑最冷，又人

D 吃：《古今图书集成医部·小儿心腹诸痛门》作“吃”，又胜

使色青不实，为盘肠内吊，急煎葱汤淋洗其腹，揉葱白熨脐腹间，良久尿自出，其痛立止，次服乳香散效。

乳香散 乳香、没药共研细末，木香汤服之，白汤亦可。

小儿腹疝，乳食所伤者，宜消食散，又消积丸。

消食散 白术^{一两}，^{一钱半}，麦芽炒、砂仁、焦楂各^{一钱}，橘红、香附、神曲、青皮各七分，甘草五分，为末，每服一钱，姜汤下。

消积丸 治乳食伤积，吐泻腹胀气急。丁香、砂仁各^{一钱}，乌梅、巴豆各^{一钱}，使君子五粒，为末饭丸，橘皮汤下二分。

微腹痰喘四症，大同小异，治法亦无大分别。

小儿未能语，啼哭不能解者，以手按其腹，如有实硬处，即是腹痛。治之用生姜取汁令温，调面成糊，涂纸上，贴脐心，立定。

腹痛由脾胃气虚攻作也 小儿热结于内，腹胀壮热，大便赤黄，躁闷烦乱者，用泻青丸^一。脾胃虚寒者，用六君子汤。喘而气短者，脾肺气虚也，用异功散^二。若面色青者，木克土也，六君加木香、柴胡。大抵寒胀，多热胀少。

浮肿 四肢手足头面俱浮肿，以至喘急，此气血俱虚，营卫不^和也，用当归、人参、白茯苓、熟地、川芎、白术、炙甘草、枳壳炒、白芍、蜜炙黄芪、陈皮各等分，

煎服。

水肿 其状目胞上下微起，肢体重着，咳嗽怔忡，肢间清冷，小便涩黄，皮青面光，手按成窟，举手即满是也。证有七种，又有七证。惟阳水证者，脉必浮数；阴水证者，脉必沉迟。气若陷下，用一陈汤加升提之药，如腹胀少加木香。若芤宽若急，用调虚。朝用四物加参、术，夕用肾气丸。闭若皆急，用八珍汤。若肚腹壅满，肢体肿胀，手足重冷，饮食难化，或大便非黄，呼吸气冷者，此真阳衰败，脾肾皆俱虚寒，不能司摄而水泛行也，急用加减肾气丸，否则不治。一生调补脾土，多有生者。

加减肾气丸 熟地八两，山药、山茱各四两，茯苓、丹皮、泽泻各一两，肉桂、附子各二两，车前子一两，牛膝各两^①，米丸，空心白汤下。

身面皆肿尿多方 炒山栀一两，桑白皮各一钱，茯苓一钱半，白术、苏梗各一钱半，煎服。

腿肿散气方 赤小豆、陈皮、莱菔子、炙甘草各一钱，炮木香七分，加姜、枣煎服。又方，各药散入丁香、茴香，加木香、莱菔子为末，米饮调下。

① 肉桂（炮）……各一两：此16字《保婴撮要》卷五《肿胀》“金匱加减肾气丸”条作“肉桂、附子（炮）、车前子（炒）、牛膝（酒微炒，各一两）”。

② 空：原作“穴”，据《幼科证治准绳》集之七《水肿·薛氏治法》“《金匱》加减肾气丸”条改。

心痛 小儿心痛，当于大人心痛门参之。但觉儿将手按腹等心处即痛，是心主不可忍也，用芍药散，又金铃散。

芍药散 芍药、芫参、白术、黄芩、大黄等分，当归各二钱，为末，每服一钱，以水一小盏，煎半盏，量儿大小，加減温服。

金铃散 金铃子一两，醋炒，蓬、莪术各半斤，各一两，茴香、木香、枳实、芍药，各二钱，为末，每服一钱，热酒调下。前方补，此泻。量儿虚实用之，不可妄治致不救。

虫痛 凡虫痛之证，腹中有块起，以手按之不见，往来腹中作痛，或更心痛，身寒畏风，聚吐清水或清水，梦中惊悸，口吐黄涎，舌黄，唇上有几条血丝，如蟹爪分叶，饮食虽多，不生肌肤，面上白而唇红，能食心下虫痛时作时止，当见咬心，口吐清水，人中常唇一吐青黑，肚大青筋。

胃中冷则吐酸，不可用冷药，宜理中丸加乌梅。

虫痛之证，得食则痛减，或酸梅汤试之。饮下面痛即止者，乃虫痛。饮下面痛增重者，非虫痛也。

其证水泄，不可与冷水，不可与冷水，忌。

蛔厥心痛 使君子一两，半斤水煎取半升。又方，每日吃使君子一钱，以水化之。又方，生甘草一钱，使君子

1 末：原作是，据《幼科证治世统》集之三《心痛》“金铃散”条改。

子十粒，榧子十八，为末，饭丸，饥时下一钱，五日虫皆便出。

小儿全仗胃气，胃气一虚，则四脏俱失所养矣。乳哺入胃，脾能克化，然后水谷分传，变得宜，岂有吐泻之患？凡小儿吐泻，皆因六气未完，六淫易侵，兼以调护失宜，乳食不节，遂使脾胃虚弱，清浊相干，蕴作而然。当分别治之，不可妄用。

不乳食 若面色㿔白，作渴饮汤，卧而露睛，手足冷，口中气冷，不食吐水，肌瘦腹痛者，胃气虚寒也，用异功散或六君子汤。若大便不实兼脾虚也，加土姜；中满不利，脾不运也，加木香；喜冷便秘，胃实热也，用泻黄散。面青搐搦，食少者，肝乘脾也，用秘旨补脾汤；若面赤凉悸昏睡，心乘脾也，用秘旨安神丸；若面白咳嗽，肢体倦怠，肺乘脾也，用补中益气汤；若唇黑泄泻，手足指冷，肾乘脾也，用益黄散。若伤于热而吐泻，口鼻中气热而成慢惊者，乃胃中风热也，宜用人参安胃散。病后津液不足，口干作渴，用七味白术散。脾实者，以枳实泻之，又以桑白皮泻其子。肺者，脾之子也。胃气不足，脾土虚寒，食而不化，腹脐疼痛，夜多泣涕者，宜八味丸桂附八味丸也。

异功散 人参、茯苓、白术、甘草、陈皮各1分，姜

① 各：原脱，据文义补。

五片，枣二枚，煎服。一方加木香。

秘旨安神丸 人参、橘红、半夏各包、酸枣仁炒、茯苓各一钱，当归白朮、赤芍药各，各七分，五味子五粒，炙草一分，为末，麦门冬丸芡实大，每服一丸，姜汤化下。

人参安胃散 人参、陈皮、甘草炙各半、白芍、茯苓、黄连煎服。

脾胃虚弱，多因少气，中满痞满呕逆者，常服参、苓、白朮、芩肉炒。胃虚气逆，吃乳不食，用克参、丁香、木香煎服。

宿食伤脾消食快膈方 砂仁、陈皮、枳实、莪术、神曲、麦芽、香附为末，白糊丸，食后紫苏汤或白汤下。

方无积不可用也，枳、莪性猛烈。

痰多者，风热壅肺，积聚而成。由于肺气不足，当补其肺气。如去之不已，必成虚证，宜白朮散。

吐泻 吐泻之作，即名霍乱。有心膈而先吐者，有腹满而先泻者，皆由中焦之作。脐上一寸，有分水穴，失于传导所致。若由脾土者，脾胃虚冷也，其候先泻白水，吐亦不多，口气微而神色慢，腹前有汗，六脉沉迟，此为冷证。若由胃火者，胃中有热，气促唇红，身未由汗，脉红而数，渴饮水浆，此为热也。

吐泻皆由虚证，胃虚热证，用白朮散。和中散。吐泻皆由不洁物者，宜宜热证，用丁香散。手足指冷者，胃虚寒也，用异功散加木香。伤风吐泻者，不克土

也，用育方①。饮热乳有污黄者，是热也，用四苓散。如不愈而转甚者，元气伤也，用白术散。行而腹中重者，脾气下陷也，补中益气汤。若服育方之药而腹中重者，脾气虚寒也，用六君子汤。因重而食，服育方乘之也，用六君加柴胡、升麻、木香。多痰黄者，心脾气也，用六君加枳实、升麻。凡见生者在十月旬内吐者，宜调治其乳母。

和中散 人参、茯苓、白术、炙草、干葛、黄芪炙、白扁豆、藿香各等分，白术、每服一钱，枣二枚、生姜五片煎服。

小儿初生在十日以内吐者，上实下虚也，先泻其实，而后补其虚。如属脾虚，用益黄散。此证见于夏秋间最多。

夏季后吐泻壮热者，此热也，用玉露散。大暑后吐泻，身大热而似热，脐腹中六分热、四分冷也。日服乳食不消，泻黄白色，似渴，或食乳，或不食乳者，食前少服益黄散，食后多服玉露散。立秋后吐泻身温，脐腹中一分热、七分冷也，食前多服益黄散，食后少服玉露散②。钱仲阳曰：凡吐泻五月内，九分下而一分补。八月内，九分补而一分下。先补脾用使君子丸，后退热用石膏汤。秋

① 散：原作“饮”，据《幼幼新书》卷二十七《吐利》“钱乙论夏秋吐泻”条改。

② 阳：原作“阳”，据《医学纲目》卷三十八《脾主湿·吐泻》改。

身自汗，身冷无阳也，当补阳，用益黄散。

玉露散 煎水有汗，泄一服，无汗，有汗反者，用甘草一钱，石膏半斤，为末，每服一分，或五分或一钱，食后温汤调下。

凡小兒寒者身凉，邪热在下焦则身凉，在上焦则身凉，中焦凉，用玉露散身凉与之，一日必愈。

身冷手足，手足身热，为阳欲冷者，宜清凉之药。手足指冷，为阳欲热者，宜温补之药。凡因证手足青紫，用寒凉则死。

仲冬吐泻，先服大青膏。

大青膏 大枳实一分，白芨子半斤，一钱半，蝎尾五分，白芷一钱，朱砂一分，一钱，青黛一分，一钱，丁香一分，马蛇和芍药散，一钱，朱砂一分，大竺黄一分，一钱，同再研细，蜜和成膏，每服半匙子大人一匙子大。月中凡瘦米大，同生黄芩、薄荷汤化服；五岁以上，同甘露散服之。

有风而泻，风搐而急者，兼肝风也，用羌活、防风。有热而泻者，兼心风也，用黄连、黄芩、大黄。有寒而泻，身冷或足胫寒冷者，用附子。凡吐泻四五日后，困弱者，用异功散。

小兒月岁，吐乳腹泻，用白朮、滑石、干姜、陈皮、炙甘草煎服。

〔上〕：原作“匕”，据《医学纲目》卷三十三《续增小儿伤寒》“大青膏”条改。

吐泻心腹痛，用四君加茯苓、厚朴煎服，或加藿香、陈皮、当归。

吐泻禁忌 小儿只吐不泻者逆，其母必有块，惊者死。只泻不吐，或吐泻俱发，日久不良，小变闭塞，治宜节乳。一日但乳一次或五次，乳母不可过饱，可以稀粥和其胃气，其吐自减。若儿大能食者，全断其乳。凡小不能食者，节之可也。

吐症 胃弱脾虚，用人参二钱，茯苓一钱，白术二钱，五分，茯苓一钱，陈皮一分，半夏、干姜各一分，麦芽五分，山楂二分。夏月加黄连三分，冬月加干姜三分。

吐 脾虚则泄，胃虚则吐。吐者有声无物，泄者有声有物。若喜饮热汤，或睡而露睛者，皆胃气虚也，用异功散。若喜饮冷，或睡不露睛者，胃气实也，用芍药散。

冷吐 乳食不消，多吐而少出，脉息沉微，面白眼慢，气安神昏，额上汗出，此风邪入胃，或食生冷，或伤宿食，胃虚不纳而出，宜温胃去风，除寒冷，用当归散。加煨姜、陈皮，或参香饮。

热吐 目赤唇干，吐乳少而黄多，乳片甜而色黄，用小柴胡加姜汁，或香薷饮方见后。

积吐 眼泡子肿，口酸舌黄，足冷身热，吐乳酸水，食乳不化，用三棱散。嗽吐痰，宜去风化痰。

凡吐不止，伏龙肝末一钱，以芦稷¹米炒黄，煎汤调下，立止。或用白扁豆炒煎汤调下亦好，若白扁豆嫩苗更好。

验儿手指，热则胃热，用泻黄散；冷则胃寒，用理中汤；不热不寒，用异功散。小儿疳积肚痛，可用艾加药作兜肚治之。

秋夏伏暑，吐泄无物，用香薷饮，又宜葛根、半夏、竹茹、白芍、竹沥、人参、甘草、藿香、陈皮、芦根、姜汁辈。

香薷饮 香薷、茯苓、炒扁豆、厚朴姜汁制，每服二三钱，水煎，加酒冷服。

积吐宿食不消，宜砂仁、陈皮、山楂、麦芽炒、神曲炒、麦芽炒、香附辈。

风痰吐，宜半夏、茯苓、僵蚕辈。

吐沫水者，虫痛也。口中吐沫水者，后必虫痛，吃使君子。

吐沫及痰或口绿，皆胃虚冷。吐稠涎及血，皆肺热。吐水不止者，心痛胃冷。

小儿吐泻 人参一分，白术五分，茯苓一钱，半夏一分，砂仁三分，神曲五分，陈皮一分，车前子一钱，治之。

泻症 专责之脾。泄而不止，且先治泻，后治风。

1 芦稷：高粱的一个变种，又称芦粟。高及丈余，与甘蔗一样可做饮料，品种有“甘蔕”芦稷、“糖心”芦稷、“高粱”芦稷等。

慢惊风。

火泻则小儿身如火热，目与舌红，当饮冷而不喜热饮，乍用了一钱，茯苓、白术、麦芽各一钱，泽泻五分，枳壳二分，黄连、猪苓各三分，煎服。

寒者则投以白术、干姜，日本土用石膏，喜热而不喜冷饮，人参一钱，白术一钱，茯苓一钱，甘草五分，肉桂、干姜、砂仁研，各二分，神曲五分，煎服。

热泻 大便黄色，如鹑卵水，或有沫，泻利即止，一日复然，当以小便赤少，心下满为验，先用五苓散，桂，次用白术散去木香，或香薷散。

冷泻 多是白水，泻室居多，腹响自鸣，甚则自白。初有汁，用冲和饮或用守中汤，或用五香散和丸。按：冲和饮内麻黄，止可少用或不用。

冲和饮 苍术、麻黄、人参、白术、桂枝、枳壳、川芎、陈皮、白芷、半夏、当归、白芍、赤苓、干姜、厚朴、炙草、煨姜、红枣煎服。

守中汤，桔梗炒、苍术制、炮姜、炙草煎服。

水泻 谓之洞泄，水谷不分，泻黄水而小便利，赤白相杂而无膜，用五苓散加苍术，车前子，干姜，又香薷散、白术散、六和汤俱好。

便补，当先用消积药。

积泻 泄注不止，诸药无效。宜先去积，后止泻，再实脾，用三棱散，或沉香槟榔丸、白术散。

惊泻 粪青如苔，稠若胶柱。和脾胃，消乳食为治，先用钩藤饮、五苓散，次三棱散用陈仓米煎服，或沉香槟榔丸，或不惊丹。

风泻 三棱丸内所有之，其粪稀黄褐色，或大不消乳食同下，此脾虚也；大黑如色者，属肝。用五苓散加苡仁，或泻黄散、白术散。

脏寒泻 粪如青竹色，不稀不稠，或下青水，未泻时腹中雷鸣，五更方泻，用冲和散加葱白，再用理中汤。

疳积酿泻 其片青色萎黄，肚胀脚弱，头大项小，发稀目昏，肌肉消瘦，不思饮食，昼凉夜热，或腹内有块，泻则五色不等，其臭异常，其泻有时，或一日、半月、旬日一泄，十二泻自止。先以当归散加三棱、陈皮、生姜煎服，次投乌犀丸、沉香槟榔丸。

其或青色青，其面黄而面白，或多热少，先用守中散加芍药，后以当归散加陈皮、芍药、姜、陈仓米煎服，或理中汤加白芍药、姜、枣煎服，次投南星、陈皮、姜煎，和脾胃，去阴邪。

若泻不止，色青，时有沫或秽，热多而少，用五苓散

1. 自：原作“白”，据《幼科证治准绳》集之七《泻》改。

加苡仁、车前子、生姜煎服，仍用茵陈、栀子捣五苓散末温服，后用当归散。

泻青亦是寒，用苏合丸、平胃散各等分，蜜汤调服。又因惊风内脏脾气不和^①，宜白术汤。

久泻大法，要在补脾虚，消食积。

久泻痢泻，用红枣^②，勿令皮破，纳胡粉令满，于炭火中烧如炭，瓷器中倒细，米饮和服。一岁以下分服之，三服愈。

药后下不止，用龙骨汤。

龙骨汤 龙骨五分，炙草、干姜、当归、黄连、赤石脂、前胡、附子炮，去皮脐，各一分，水四盏，煮一盏，分为五服，旦服，至午令尽。

脾肺滑泻，四君子加诃子五分，米饮调下。

痢疾 赤白相杂者，当先去其热积，须用大黄、枳实之类，然后黄连、黄芩解其热，枳壳、芍药、当归、木香皆要药也，或香连丸。

手足指热，喜饮冷者，为实热，用香连丸。手足指冷，喜饮热者，为虚寒，用异功散送下香连丸。小便不利，阴阳不分，用五苓散。若湿热退日久稍不愈者，用补中益气汤倍加升麻、柴胡。若泻痢兼取，或腹中作痞者，脾胃虚寒也，用异功散加炮姜、木香。或变为痢者，非

① 脾气不和；原脱，据《幼科证治准绳·泻·冷泻》补。

② 四：原作“使”，据《医学纲目》卷三十八《脾主湿》“泄泻”改。

克脾也，用四君子送下香连丸。

扶表证者宜发表，制防败毒散加陈仓米、生姜、薄荷。

赤痢 用四君子加赤芍、当归，入粟米，同煎服。

小儿肠热，即痢下鲜血，黄柏去皮、赤芍，为细末，饭丸麻子大，服一二十丸，米饮下。

华佗治老幼下痢，柴豆、食入口即出，命在旦夕，神效。黄连末、乱发灰、苦酒、蜜各半两子量，白蜡方寸匕，马子黄一枚，于六寸于铜器中炭火上，先烟酒、蜜、蜡、马子黄搅匀，乃纳黄连末、发灰又搅匀，视可取出为丸。久困者，一日一夜尽之。

热痢黄人痢、老人、产妇、虚劳人、小儿，宜服黄连阿胶丸。

黄连阿胶丸 黄连去心、干姜、白茯苓、白芍、阿胶以桑白子，同捣为末，各半两，米泔熬膏，入口和方下，丸如绿豆大。每服白二十丸为始，至于五十丸，食前米饮下，日二三服。小儿者，丸如黄黍大可也。

香脯散 治小儿疳积下痢，常以不食，用银合子、丁香各一钱，用猪肉二两，捣匀为片，炙一两钱，将肉丁灰火一浸火炙，细研粉，炙令灰拂，每以少许与吃，如不知吃，以散量与，自然要吃。此方治胃口有虫，全奇全妙。

① 两：原作“片”，据《婴童百问》卷七《诸色痢》“香脯散”条改。

② 一钱：原脱，据《婴童百问》卷七《诸色痢》“香脯散”补。

泻痢兼渴证 千金方 单捣冬瓜汁饮之

当归散 治小儿疳积，腹中不止 当归、黄连、黄芩各一钱，炮姜、炙甘草各半钱，为末，每服一钱，白米

鸡子粥 治小儿疳积不止，腹中不止，将一钱，糯米一合，煮粥，临熟，破鸡子，相和搅匀，入醋少许，食之

通治小儿疳疾神方 当归一钱，黄连一分，白芍一钱，枳壳、槟榔各五分，甘草一分，水一盅，煎半服，加黄连一分；白痢，加芍药一分；腹中，加甘草，多加芍药；小便赤，加木通一分；下如豆汁，加白朮一钱；伤食，加山楂、麦芽各三分；气虚者，加人参三分。神效。

食积痢 食饱伤胃，脾气停滞，物难消化，留而成积，积败为痢 先调胃气，次理积，却止痢，则病根自除 用和中散 又守中汤 仍忌生冷油腻等物。

小儿疳积，遍身发肿，宜调气，食不可大饱 用白芍、白牵牛、甘草、木香各一钱，为末，每服五分，紫苏汤下。

通治小儿疳疾方 柴胡六分，归身、白朮、茯苓各一钱，白芍一钱五分，半夏、青皮、厚朴各五分，水一盅，煎半盅，露一宿，再温之与服 热多者，加人参、黄芩各五分；寒多者，加干姜一分；痰多者，加白芥子一钱；夜发热者，加何首乌、熟地各一钱，日间发热者不用 如腹痛，加槟榔三分，煎服。又便易方，参看。

积 直上腹胀是积 若病后此并，则是虚中积 面合地卧是积，伤冷啜食得之 腹胀是积在肺，先宣肺气 小便如油，是积在小肠 发黄是积伤心 赤白痢是积在胃 内黄赤青，是积在脾 若传里，其人口苦，不安吃物，宜厚药 寸身浮大，是积在胸，只宜下，取虚中积药，然后补之 多污白粪，是积冷在胃，宜先转，后热药补之。

凡积必以调胃为主，可以前导佐之，庶谓补土松胃除也。

凡积，胃乳吐不节，过餐生冷坚硬之物，或因夜卧失盖，致头疼面黄身热，即腹微肿，腹内膨胀，是冷引热，喜睡神昏，不思饮食，或呕或哕，口多酸气，大便酸臭，此为陈积所伤也。

小儿食积寒热，因脾胃虚寒，乳食不化，其症至夜发热，天明复凉，腹痛膨胀，小吐吞酸，是冷引热，喜睡神昏，大便酸臭是也 若食在胃之上口者，吐之；胃之下口者，下之；腹结痞聚，按之而痛者，下之；下后仍结，按之则止者，补之。

食积伤寒者，先散之，用参苏饮 热甚便秘者，先利之，用柴胡汤 如无外感，但只伤食，不至于甚，用保和丸调之方见下。

凡脾病者，至夜必热 食未消者消之，既消者补之，则寒热自止 若手足并冷，喜热饮食，此中州虚寒也，宜

温之。大便欲去不去，脾气下陷也，宜升之。若夜卧或清晨泄泻者，脾胃俱虚也，用胃脾丸。手足并热，作渴饮水者，脾胃实热也，用白黄散。手足虽热，口不渴，大便不实者，用白术散。一切多食生虫食原，积高而之。

四神丸 肉豆蔻、五味子各一钱，补骨脂二钱，吴茱萸一钱，为末，生姜煮红枣丸，送下一钱。

凡食不消，气冷，四肢冰冷，胃中无气，此胃气不和，用使君子丸、益黄散。

宿食不消，肚腹热或夜多泄，夜卧不安，用保和丸。

保和丸治饮食停滯，胸膈痞满，暖气吞酸，或吐或泻。炒神曲、山楂、制半夏、茯苓、陈皮、连翘、莱菔子为末，粥丸或煎散。加白术一钱，即大安丸。

宿食大泄泻，水谷不化，吃食不饱饥饱。炒神曲、炒麦芽、山楂、青皮、香附、山楂、厚朴、甘草、枳壳、地黄、砂仁、黄连、枣子等分，为末，调服。

饮食不进，用四君子汤，加姜、枣煎服。

痞症 乃胃热也。黄芩一钱，黄连、薄荷各一分，茯苓一钱，甘草一分，桑白皮一钱，半夏一钱，为末，每服一分，水煎服。

疳者干也，瘦弱少血也。二十岁以下小儿，有气少血虚，且面无肉，其证头皮光色，毛发焦稀，腹中硬，口

淡唇白，两眼昏烂，揉鼻揉目，焦渴自汗，涎²白污酸，肝胀肠鸣，结胸潮热，或身多疮疥，多饮水者是也。大抵疳病，当察冷热肥瘦。凡凡大便色白，小便浊如米泔，此疳病已。凡疳皆依本脏补其母，假令日中发潮热，是心虚热也；肝为心母，法当补肝母，肝实而后泻心，心得母气则内平，而潮热自愈矣。余仿此。

疳有五疳，又有冷、有热、有冷热，及蛔、疳、脊、无辜³、丁癰、疳露⁴、口疳、舌疳、高疳、劳疳、泻疳、利疳、疳疳、疮疳⁵之不同，各有治法，且有专家。惟疳疳又名包疳，俗名走马疳者，其土法露根，则口疮出血臭气，甚则齿根溃烂齿黑。

走马疳 先去积热，用当归散合一散散、姜、枣煎服，次投芦荟丸，上药饮，又以温盐水漱口，以内金散等救之。

内金散 治牙根肉见黑黑色，有虫。取内金¹、白芷、白芷、白芷各一钱，丁香、胡椒、研末，擦患处。

使君子丸 治疳疳下疳，腹内胀满，不思乳食。常食安虫补胃，清血明肌。厚朴、使君子²、陈皮、炙草。

1 自：原作“口”，据《幼科证治准绳·疳》改。

2 涎：《幼科证治准绳·疳》作“尿”，义胜。

3 无辜：《幼科释谜》卷二《疳积》“疳病原由证治”作“无辜疳”。

4 疳露疳：《幼科释谜》卷二《疳积》“疳病原由证治”作“疳露”。

5 干疳……疮疳：此14字据《幼科释谜·疳积》中干疳、渴疳、劳疳、泻疳、疳疳、疳疳、疳疳、疳疳改。

诃子半生半煨，为末，蜜丸，米饮下。

又治走马牙疳，干姜、白矾、枣子烧焦存性，为末敷之。又方，人中白一分，煨，麝香一分，敷之立愈。又方，熟地黄一分，轻粉、麝香，为末，敷之。

小儿口疳流水口烂神方 黄柏一分，人中白一分，为末，敷口内，一日三次。

小儿一切疳气等症，用此散，以水调服，神效如神，良大矣。小使利，不忌食。用土硫一分，煨，干姜半生，细墨二两，一两火煨，一两生用，黄丹二两一两炒紫，一两生用，为细末，每服半钱，倒流水送下。

诸疳通治药肥儿丸 胡黄连一分，使君子肉一分，人参一分，黄连一分，神曲一分，麦冬一分，茯苓各一分，干木茯苓、炙甘草各一分，草决明一分，神曲一分，为末，黄米糊丸，如绿豆大，米饮下三十丸。

五疳消食丸 使君子一分，干姜一分，麦冬一分，陈皮一分，神曲一分，黄连一分，茯苓一分，为末，陈米饭丸，黍米大，米饮下二三十丸。

按：疳，坏病也，有用坏药治之者，杀生养命，儿岂能活？似宜以他药代之。好生之心，或可希冀。

渴 小儿唇红如丹，即发渴，甚焦黑者危。胡黄连、麦冬、干葛、玄参、炙甘草、枇杷叶炙去毛，各等分，为末，每服一分，加姜一分，同煎好，入蜜一分饮之。此方

治小儿诸渴及疳渴，解诸般¹热。

又方，芦根、黄芪、人参、炙草、麦冬、知母、竹叶、粳米，以水煎。此方治小儿壮热不止，宜。芦根须用活者。

烦躁 大人于胆为病，人于肾则躁，不可发汗以下，用竹沥汤。主重者，加麦冬、白芍、炙草、白芷、羌活、姜，水煎服。又宜栀子、豆豉。

黄疸 身黄目黄者，重也。新得之为无，不消克伐。若因吐下者，下其重利，其余依前小发方也。

初下及百日十年之间，不因吐下身黄者，当从胎毒也。长大好吃泥土，与甘草，不作药方服，用石膏散。小便不利者，用茵陈汤。

茵陈汤 茵陈二两，大黄一两，栀子一握，水一斗，先煎茵陈取半，次纳二味，再煮分，日三服，黄从小便出也。

小儿一身尽黄 犀角尖一分，茜草、干姜、升麻、芫花各一分，水有升麻、芫花。又方，药浆扬汁、和蜜饮之。一方用生小麦苗捣汁，服之立效。仍忌酒白丸子热物，免变青风。如治，则服却成白。又有胃虚发黄者，当治其脾胃。

黄疸 六月十八日，黄、白、赤、青、黑，黄者最

¹ 般：原作“殷”，据《幼科证治准绳》集之八《渴·实热》“胡黄连

小便不通有阴阳二证 阴闭者为冷湿乘虚入里，用白芍汤加南木香，及炒盐熨脐，并五苓散入灵砂末，盐汤空心服。阳闭者因暑热所逼，涩而不通，用五苓散加车前子、灯心之类，及木通散、益元散皆可，或姜葱饼于脐上，并与万安饮，尤效。

木通散 木通、滑石、牵牛子炒，各一两，为末，每钱，灯心、葱白煎服。

冬葵子散 冬葵子一两，木通半两，为末，每服一钱，水煎服。

大小便不通 由乳食失节也。凡原病同，证异，怒胀而不乳，若痛，刺连脐，其面色青黄，用大连翘汤加紫草五分，大黄、川芎各三分，水煎服。

大连翘汤 连翘、防风、稻麦、荆芥、木通、车前子、当归、柴胡、芍药、滑石、蝉蜕、黄芩、山栀、甘草各五分。

掩脐法，用通根葱一两，水浸半日，生麦一两，淡豆豉一两，同研烂作饼，烘热掩脐口，以绢扎定，良久气自通。一方用导赤散加山栀。

胆导法，用猪胆一枚，以鹅毛管内头截齐，一头入脐中，用线牢扎定，吹气令满，纳谷道中，气行气通取出，治大便闭。

1. 痛：原脱，据《幼科证治准绳》集之八《大小便不通》补。

肺俞穴入也。以所吐一分注之，如有热证者，兼用不利者，兼甘桔汤。

治痰大法，经即下之，久则补之。是年虚寒，以所吐损。大抵秋冬则实，春夏则虚，更宜五运推之，以定虚实。

肺虚则咽干，火射金也。以水母热，火泄者，即不利，即下不利，加戟附子散食，以当利。肺用甘草汤，与泻白泻青丸。若咯血者，以麦冬，用白土人。若面色白脱色，少气不寐，尿中有虫，宜麦冬和，以甘草散升之。见上。若亡津液，用白术散。

清肺饮。治肺受风邪客热，嗽声不出，气促喘促，身重鼻寒，流涕无音，又肺内行水者，用桑白皮一两，人参半两，桔梗炒、杏仁去皮尖、赤芍、荆芥、桑白皮、枳壳、五木子、甘草各一两，麦冬各一两，旋覆花五钱，甘草一两，方长，每服一钱，煎服。

嗽而内肺痛者，属肝，用小柴胡汤。嗽而外水者，属胆，用黄芩半夏汤加炙甘草芍药。大寒者，服嗽而喉中如梗者，属心，用甘草桔梗汤。嗽而失气者，属小肠，用芍药甘草汤。嗽而有物者，属脾，用升麻汤。嗽而取长虫者，属胃，用乌梅丸。嗽而常吐血者，属肺，

① 泡：原作“炮”，据《幼科证治准绳》卷九《咳嗽·发表》“清肺饮”条改。

用麻黄汤^①。咳而遗尿^②者，属太阳，用大汤，亦有^③脂禹余粮汤。咳而按背满者，属肾，用黄耆汤^④。咳而遗尿者，属膀胱，用茯苓甘草汤。咳而腹满不欲食，有肺气逆者，属三焦，用异功散见前。

小柴胡汤 柴胡、黄芩、人参、炙甘草、半夏，煎服。

咳嗽之初，未有不因感冒而伤于肺也，用清肺饮^⑤，或五拗汤。

五拗汤 治感风湿及形寒饮冷，咳嗽咳逆，连声不已。麻黄不去心、杏仁去皮尖、荆芥不去心、甘草各一钱，桔梗蜜炙、枳实一钱，为末，每服二钱，煎服。按：麻黄非小儿所宜。

和解汤 治小儿四时感冒风邪，壮热烦躁，鼻塞多涕，咳嗽自汗，肢体疼痛，及疮疹已发未发，皆可服。羌活、防风、人参、川芎各一钱，升葛、升麻、甘草、芍药、荆芥、杏仁各五分，桔梗、薄荷各一分，姜、枣煎服。

橘皮散 橘红、桔梗、薄荷、人参、杏仁去皮尖，麸炒，各五分，贝母、灯心各等分，煎服。

① 尿：原作“尿”，据《幼科证治准绳》卷九《咳嗽》引“洁古法”。

② 赤石：原作“石赤”，据《幼科证治准绳》卷九《咳嗽》乙正。

③ 遗：原脱，据《幼科证治准绳·肺肾脏部·咳嗽》补。

④ 拗：原作“拘”，据《幼科证治准绳》卷九《咳嗽·发表》“五拗汤”条改。

⑤ 各：原脱，据文义补。

治小儿咳嗽神方 苏叶五分，桔梗、甘草各一钱，有痰加白芥子一钱。

治肺受风寒喘热痰嗽 苏叶、桑皮、青皮、五味子、杏仁、麻黄、炙草、陈皮各一分，人参、半夏曲各一分，生姜一片，水煎服。

治小儿咳嗽喘急喉间如水鸡声 射干、麻黄、紫苑、甘草、生姜各一两，半夏一钱，朴心一钱，大枣十五枚，为末，每服二钱，煎好，入蜜少许服。

治小儿惊风，五脏积热，上焦蕴热，手足心热，多涎涎，面色或红或白，鼻流清涕，气急^①，目赤咳嗽，惊悸夜啼^②，或伤寒渐安，尚有余热，宜服此方，化痰退热 用硼砂、马牙硝、芒硝、人参各一两，甘草一钱，辰砂、麝香、冰片各五分，共为末，以瓦瓶收储。遇有此证，麦冬薄荷汤调下二钱。气喘咳嗽，桑白皮汤下。

秦艽汤 治小儿骨蒸潮热，食减肌瘦 秦艽、石膏、甘草。

小儿肺胀喘满，胸膈起色，动肋扇动，鼻下作坑，两鼻窍开张，嗽声哑而不鸣，痰涎稠浓，俗名马脾风。若不治，死在旦夕。白牵牛、黑牵牛各一两，半生白术、大黄、槟榔各一两，为细末，每服二钱，白至冷浆水调下。涎多，

① 急：原作“息”，据《幼科证治准绳》卷九《喘·喉间有声》“梅花饮子”条改。

② 啼：原脱，据《幼科证治准绳》卷九《喘》“喉间有声”补。

加膩粉一分。

药引 煎小儿嗽药，心嗽面赤，或汗流，加干葛煎；肝嗽眼中泪出，用乌梅、糯米煎；脾嗽不思饮食，或恶心，入生姜二片煎；胃嗽吐逆酸水，入蛤粉煎；胆嗽令人不睡，茶清调下；肺嗽上气喘急，用桑白皮煎；肠嗽出痰如同块，淡姜汁调下；劳嗽杂证同煎；冷嗽入晚则嗽甚，葱白煎；血嗽当归、枣子同煎；暴嗽涕唾稠黏，入乌梅、生姜煎；尸嗽青中疳，入甘草、黄蜡煎；气嗽肝痛胀满，青皮同煎；哮喘声如拽锯，半夏、白前同煎；肾嗽时复两三声，入黄芪、白饴糖煎。

以上十六般嗽疾，依法煎服，无不效验。

疝者谓气积于内，复为寒气所伤，故令腹绞痛也。先用五苓散泔汤调服和解，后用白芍药汤、乌梅散、钩藤膏为治，重者全茱丸、散气丸，未有不愈也。其证先喘急而后痛疝，其状有如李者，亦有稀软并肾肿大者，亦有大便脐下痛楚者，皆不能忍，用药以行心气，逐肾邪，利其大小便为主，更无补法。凡疝多属肝肾气虚，及坐卧寒湿之地而起。

白芍汤 治疝气。如脐下痛者，加生姜、钩藤及盐同煎，空心温服。若误下误汗，加入参、木香各钱。疝又见痛门。

1 茱：原作“某”，据《幼科证治准绳》集之二《疝》改。

乌梅散 治腹疼，及小儿脐下冷，疝气与口 方枳实核、延胡索^① 各二钱，各五钱，乳香、没药、钩藤各一钱，枳实、木香各一钱，上除枳实、木香不过火，余焙末，每半钱，用炒茴香煎酒下。

金茱丸 金铃子肉 二钱，吴茱萸五钱，为末，酒丸，盐汤下。

小儿与疝核原者，由元阳怒气逆不^②，乘虚而有，疝核偏大 又因脾胃生冷，或伤暑，或受冷地，从胃流入胃中，用桃仁丸。

桃仁丸 桃仁二钱半 捣末，去尖，去双仁，去苦，去油，丹皮、白茯苓^③ 各二钱，石心各二钱，郁李仁一钱半，为细末，蜜丸如黍米大，酒下。

脱囊肿大，坠下不收，用紫苏为末，荷叶包之，煮烂移之，上则香油调敷 又用紫萸^④、杉木行^⑤、白芷，煎汤熏洗妙。

阴囊肿痛，因肠风、气^⑥、水^⑦、即^⑧、便曲瘦^⑨，冷汁出，阴囊 子疝吊入腹，痛不可出，名为内疝，急用乌梅散、金茱丸^⑩ 又宜用川楝子、枳实、青陈皮、木香、全蝎、当归、苍术、桃仁、枳实、白芍、钩藤、砂仁、茴香等药，以宽小肠气，疏风为治。

① 各：原脱，据文义补。

② 桴（fu 浮）炭：轻而易燃的木炭。宋·陆游《老学庵笔记》卷六：“浮炭者，谓投之水中而浮，今人谓之桴炭，恐亦以投之水中则浮故也。”

③ 芍：原作“苟”，据文义改。

外肾肤囊光大，光气如吹，此气虚所致。外肾肤囊赤即通明，及女子阴户肿胀，乃心热之传，皆以木通散导赤散方但里前为治。或用车前子，改仁加入五苓散，外敷立消散。

立消散 赤小豆、赤芍、生枳壳、商陆、风化朴硝另研，各一两，除朴硝，炒不过火，轻焙，共为末，柏枝煎汤，调三钱，涂肿处。

阴处疮胀水不下及痒，海螵蛸、枯矾、黄丹为末，糝之。又方，牛尿煎汤淋洗，或研末糝之妙。

肾硬肿，先用葱椒汤洗，次以蚯蚓粪津唾调敷，须避风冷湿地。

女子阴户肿胀，用海带搭于阴户上，立消。

阴囊肿大，用甘草煎浓汁，调蚯蚓粪涂之，神效。

阴子肿大，用鲜鳊鲙苏叶捣软包之。尿如米汁，六一散调服一钱半^①。

淋症皆肾虚所致，水不下，加黄连。川有热，加柴胡、梔子。五脏治法不同，凡淋俱以五淋散为主。五淋方，宜参看。

五淋散 赤苓去皮、赤芍药、生甘草、山梔、当归炒、黄芩、车前子、木通去皮节、滑石水飞、葵子炒、葶苈子、竹叶、灯心、葱白，水煎，入车前子捣取汁，用五苓散调

① 半：原作“文”，据《验方新编》卷十九《遗精白浊》“遗精白浊各方”改。

化，食前服。或硝石末调化服。

白淋，茅根灯心汤下。气淋，小腹脹滿，尿后有余沥，木通汤服。石淋，茎内痛，尿涩有砂石，令人闷绝，滑石四钱^①，方^②，葵子煎^③汤服。血淋，紫草、连翘、车前子各^④等分，煎服。

导赤散 治小儿血淋，生地、木通各一钱，黄芩、甘草各^⑤一钱，灯心煎服。

咽喉初起疼痛，发汗即愈，用尾甘桔汤^⑥。方^⑦：用尾一钱五分，桔梗一钱，山梗^⑧，葛根、芍药各一钱五分，大力子一钱，连翘、心^⑨一钱五分，贝母一钱，^⑩，橘^⑪一钱五分，玄参一钱，薄荷五分，土甘草一分，白菊花叶十片，取汁和药服，煎时加葱白三茎。

凡喉症初起，切忌寒凉，白芷、防、羌、薄、甘、桔、大力、橘、贝等。

咽喉痛 先洗去口中舌上白苔，其次扫去风痰，以通咽喉，然后解其热毒。小儿口内无患，扣其喉间则哭者，此喉内作痛也。用立效散^⑫掺之，服牛蒡子汤^⑬。

立效散 硼砂、薄荷、雄黄、朴硝各一钱，为细末，干掺。

牛蒡子汤 牛蒡子^⑭、玄参、桔梗^⑮、黄芩、木通、

① 煎：原脱，据《幼科证治准绳·肝肺部·淋》“五淋散”条补。

② 各：原脱，据文义补。

③ 各：原脱，据《幼科证治准绳》卷之二《淋》“导赤散”条补。

甘草半斤，炙、连翘、梔子、薄荷、荆芥穗、山豆根各一钱，煎服。

赤舌吐舌者，脾肌微热，令舌络微紧，时时舒舌也。勿可用冷药，当少与泻黄散¹。或欲饮水者，脾胃津液少故也。又如白黄肌瘦，五心烦热，即为疳，宜加胡黄连辈。

重舌附舌，下近舌根，生形如舌而小，谓之重舌。其舌颊里及上唇如此者，名重舌。其舌齿龈如此者，名重龈。皆刺去恶血拭干，用苦竹沥渍黄柏末点舌上，如不愈，后用真蒲黄略炒，铺于地上出火气，研细，糝土二次愈。又重舌急证，用膏去爪，先于舌下筋上擦至根，渐深深擦入，如此一次。又用指取项后燕窠土坑中间，自上赴下至小指，深深擦入，亦一次。小儿若饮乳胀前，则病去矣。

绿袍散 治重舌及满口内外疮毒、咽喉不利。薄荷叶去根、青黛各一钱半，玄明粉、荆芥穗各半钱，硼砂一钱半，白芍药²、甘草各一钱，余玄明粉、硼砂，各焙为末，再同研细，点舌上，或蜜调点。

木舌者，舌渐渐肿大满口，不急治即杀人，此风热甚

1 散：原作“散”，据《幼科证治准绳·心脏部一·舌》“重舌”条改。

2 百药煎：为五倍子同茶叶等经发酵制成的块状物，出《本草蒙筌》：“一新鲜五倍子十斤，捣烂，细磁缸盛，稻草盖愈七昼夜，取出复捣，加桔梗、甘草末各二两，又愈一七，仍捣仍食，务过七次，捏成饼，晒干任用。”

也。用当归散或泻黄散一、二茶匙，外搽内服。

当归散 当归一两，赤芍各二两，生地黄、炙甘草各五钱，人参一两，白术、川芎、制麻黄各七钱，为细末，每二钱，加姜一片，煎服。

玉露散 寒水石中有白霜者，一两，石膏一两，各四钱，甘草一两，晒干，为细末，薄荷麦冬汤下二钱。

硝黄散 真硝黄、风化朴硝为末，搽于上下。

舌者心之管，心热则生疮，肝热则出血，脾热则白疳如豆，热则津消，风则不强，口合不开，四肢壮热，气喘语重，即其候也。治宜凉解，上焦肝脾心经邪热，疏风化痰。又法用紫雪一钱，和竹沥时时抹入口中，即消。又百草霜、白石、芒硝，同捣散。服生芩子汤，用当归散入生地、生姜煎服。

舌肿满口，不能饮乳，用黄芩竹沥，拭患处。又方，黄芩、黄柏、青黛、牙硝、薄荷、僵蚕为末，以薄荷汁拭口，以末糝之。

脾之络脉系舌傍，肝之络脉系舌本，心之络脉系舌根。

舌上生如微粒，桑白皮汁敷之，三次妙。

口疮用柴胡、地骨皮、薄荷、生地、甘草煎服，外用炙甘草、藿香、石膏、梔子仁，为末搽口。又方，野蔷薇根

煎汤，治口中百病。即残花^①也。

小儿口中白病，及喉痹肿塞等症，宜半黄散，^②方口舌部。

牛黄散 牛黄、片脑、硼砂各一分，辰砂、雄黄、青黛各二分，黄连、黄柏各八分，焰硝一钱，为末，用少许掺之。

眼目 赤甚者，心热也，用导赤散方见前。又赤芍、羌活、防风各五钱，人参、甘草各一钱，灯心、黑豆同煮，食后服。凡眼赤涩之初，只用自己小便，张口吊出，用一指接抹眼中便闭目，少顷效。又见痛门。

目赤肿痛 昼夜不开，惊悸不已，用九仙散

九仙散 柴胡、制苍^②术、赤芍、荆芥、甘草各六分，川芎、麻黄去节、汤泡焙干、薄荷连梗、各半两，旋覆花去老梗，一钱，为末，每服二钱，姜一片，葱一根，水煎温服；次以小柴胡汤去半夏加大黄、薄荷、竹叶、生地，水煎服。小柴胡汤，柴胡、人参、黄芩、半夏、姜、枣

小儿面疮，通面坏烂无全肤，脓水淋漓，百药不效者，陈年腊猪油不入盐者，敷之神效。又白杨木枝烧，取沥，敷之亦效。

耳后疮 疳蚘黄烧，以猪油和敷。又竹叶烧末，猪油

① 残花：野蔷薇，又名“白残花”。

② 苍：原作“疮”，据《幼科证治准绳》集之二《眼目·目赤肿痛》改。

和敷。

耳内出脓 龙骨、枯矾、胭脂研 麝香、海螵蛸为细末，以棉卷拭去耳中脓，吹入耳中，仍服化毒退热等剂。

耳内脓汁出久不瘥 红花、黄柏各一钱，海螵蛸、贝母各一钱，雄黄水磨细研，一钱，麝香半分，研细，以棉卷拭药入耳中，一日两换。又方，白矾灰、土胭脂各一钱，麝香各一分，研匀，先以棉裹杖子捻净，搽之。又枯矾、龙骨炒、黄丹、麝香为末，吹入耳中。

耳中痛 附子炮，去皮，菖蒲二味，裹灰之。

癰头疮 用防风通圣散酒制，除大黄，共研，再用酒拌，晒干，为末，每服一钱，水煎服，日四五服，至一十贴见效。

蟠攻头 龟板炙为末，飞白和油，调涂头上，不可调得太柔，留孔出毒气。

鼻内生疮及鼻下赤烂，用青金散敷之。调青、明矾为末敷。

蟠攻头 用铁钉小罐敲下为末，先以此灰²批入³疮内，外再用府油，调涂疮上。

鼻下赤烂瘡 青黛一钱，麝香、熊胆为末，即调敷鼻下。

1 搨 (wèn 问)：擦，揩拭。如宋·秦观《点绛唇·桃园》“背灯偷搨，拭尽残妆粉”。

2 些须：亦作些许，意即少许，一点儿。如些须小事，何足挂齿。

3 入：原作“人”，据文义改。

鼻下湿痒疳疮方 大枣一枚，去核，以白矾纳枣中煨存¹性，研涂，或麻油调敷。

小儿牙齿黑蛀，气臭²出血，用雄黄、麝香为末，饭丸，安在牙内。

齿缝出血 苦参一钱，白矾灰一分，为末，日三次，揩牙上，立验。

齿间出血 苦竹叶煎浓汤，入盐少许，含漱。

齿根肿 生地、独活、石膏一宿，含³之。又松叶、盐，好酒煎，含。妙方，扣齿一百下，日一夜，即终身无齿疳也。

齿黑⁴脱落，遇有穴者，谓明热气上奔如马也。若下伤肠胃，则下痢肛烂，其证甚热肌削，手足如冰，爪黑面黎⁵，甚者入杜骨间，治宜舒气丸，乃六味地黄丸加五味子也，再加使君子、川楝肉治之。又用立效散，或尿白散。

立效散 青黛、黄柏、白芷、白胡椒、五倍子各一钱，为末，

1 存：原作“有”，据《幼幼新书》卷二十五《鼻疳》引《朱氏家传》“治小儿鼻下湿痒疳疮方”改。

2 臭：原作“息”，据《幼科证治准绳》卷九《齿·齿痛》“雄黄丸”条改。

3 含：原作“舍”，据《千金翼方》卷十一《齿病》“齿根动摇方”条改。

4 齿黑：原脱，据《医学入门》卷五《五疳》“肾疳”条补。

5 黎：通黎，黑色，《说文·黑部》：“黔，黎也。秦谓民为黔首，谓黑色。”清·段玉裁注：“黎……俗作黎。小徐本作黎，乃用俗字改许也。”

先以米泔漱口，糝之。

尿白散 人中白、白枯矾、枳壳烧存性，各一钱，为末。先用黄芩根、陈艾叶浓汁，以鸡蛋白调敷，刮去腐肉，洗去鲜血，然后敷药，日二三次。

走马疳方 牛黄星、吴茱萸为末，用鸡蛋清飞面，加雌雄雌雄同下，同搽，同敷，手心心是心，是雌雄也。

恶疮疥发痒 春用柳条、荆芥，夏用冬瓜、槐枝，秋冬用苦参、煎浓汤，以酒调洗更衣，名曰外宣，不须服药。一岁生疮起身，先服五倍化毒丹，次服一服。外用父亲热小便，鸡屎黄洗。湿者，青黛末搽之，妙。

小儿疮疖 未出之先，微见有红头点了微起作痛者，急用不洁唾，夜半时涂，即消散。欲消者，不可用。若已结成，用天乌散。

天乌散 天南星、皂角、草乌、黄柏各一钱，为末，用米醋调，贴患处。再查外科门。

胎热、血热、风热者 疮起身痒痛，用人参、连翘、甘草、四物汤。

大连翘饮 甘草二钱，柴胡、黄芩、荆芥各一钱，连翘、车前子、藜麦、薄荷、桑白皮、小蓟、地丁、木通、当归、防风、蝉壳各一钱，白芷一钱，灯心草，水煎服。

1) 湿者：原脱，据《医字入门·小儿门·丹毒（附胎疮）》补。

生料四物汤 黄芩、薄荷各二分，生地、赤芍、川芎、当归、防风各三分，煎服。

小儿脐烂 男子头发斑秃 枯矾各等分，研细燥

浸淫疮 初出甚小，后有脓浸淫不已。若从四肢渐向
去面者，难治也。用猪胆一斤，一合，豆豉一合，杵为膏，
涂之。此方又治马骰疮。又方鸡冠血和黄连涂。

红丝疮 多生于两手中指节上，其状似一水泡，其底
下数十小针孔，不痒不痛，泡边当有一丝脉如红丝，隐隐
在甲，具有其主，循臂向上，至心则死。急以针迎头挑
断，或刺耳中听，或刺白梅时之，丝即不行。

瘰癧 夏枯草捣膏敷，或用白梅时之，或用打马
草，尤妙。

王烂疮 初起一日肉色变，一日泡上浆出，或四畔时
时生长。若破穿漏身，即不可治。其状如汤火烧，用黄
芩、白粉为末，生肌散。或膏上日月丸灸灸，煎败猪头
头效。

天泡 状如水泡，肺与二经风热也，用大青散青散
又金黄散，或用黄柏、野蚕屎敷。或用石、甘草为末，
敷之。

胎毒奶癣天泡等疮 蛤粉、白芷、轻粉、黄柏为末、

1. 瘰：原作“癰”，据《幼科证治准绳》卷之三《癰疽》“王烂疮”
改。

2. 天：原作“天”，据下文改。

麻油调敷，神效。

天蛇毒 手指头生疮，初起仙方活命饮。

时毒 感四时不正之气，鼻、面、耳、项或咽喉亦肿，寒热头痛。初起用葛根牛蒡汤煎服，或加羌活、黄芩、升麻、犀角、栀子。大便闭者，加炒大黄。

葛根牛蒡汤 葛根、贯仲、甘草、豆豉、牛蒡子各半炒，研，各一钱。

丹毒 小儿欲发丹候，必先见于外。无故而眼生眵者，欲发丹也。更微喘急者，毒已上乘于肺也。急以水调蓝根、犀角等药，滑消其毒。如身上已有赤处，便以芸苔等外敷之。

火丹 由风毒热毒，入腹入肾则杀人，用葛根白术散。

葛根白术散 葛根一钱，甘草一钱半，茯苓一钱，白术、枳壳、木香各一钱，煎服。又丹毒方，犀角、豨薟穗、防风、甘草、牛蒡子少研，煎服。宜用山栀、木通、麦冬、天花粉、防风、蝉蜕、竹叶、石膏等药。

漏芦汤 治一切丹毒。漏芦、麻黄去根节、连翘、升麻、黄芩、白芷、甘草、芒硝、赤芍药，各一分，大黄以一两，煎服。

丹入腹及下至卵不治方 麻黄炒、升麻各一分，硝石五分，大黄半分，为末，井水服方寸匕，日二服。又地龙炙，水调涂之。

月痛，捣扁竹汁一升，作一服，只一二服，神效。并丹，又见外科。

月疔，捣甘草入盐与香油，以手摩热，于月上指之，立效。

小儿赤痢，至心即死，以苦楝浓汁拭之。又大黄末涂之。马兰头与白根捣汁，调六一散搽，立救。并治大人两腿赤肿流火，湿热疼痛，大效。

走马胎赤肿走入腹则不救。方用牛槐叶一握，生瓜蒌大皮，同槐叶捣，以小豆末一分，和涂患处，其效如神。

腮痛。用清咽利膈汤，治心脾蕴热，或咽喉肿舌肿痛。

清咽利膈汤。玄参、升麻、桔梗炒、炙甘草、茯苓、黄连炒、黄芩炒、生葛子炒、防风。芍药炒，各一钱，煎服。仍参口疮治之。

肺痛辨证。其证见风咳嗽，鼻头项强，呼吸不利，甚则四肢微肿，咳吐紫血。若寸口见移，胸中隐痛，脉数而实者，为肺痛。咳吐涎沫，脉数而虚者，为肺痿。大要补脾益肾为善，如重方并相照。孔目七情治之，各证仿此。方又见外科。

疔毒。疔多生头面四肢，或如小疮，或如水泡，或如麦粒，或麻木不仁。疔疔要热，疔疔要心，肢体拘急，用隔蒜灸法，并解毒之剂。并方见外科。

隔蒜灸法。治一切疔疽，初起即消。每日灸。十

壯，其法將葱切二文錢厚薄片，着肉一面略刺少孔，均艾
 燎蒜，小兒且肉柔脆^①，且不能言痛合，須先置大人臂上，
 試之冷熱得宜，然再移着危上。又別用蒜片均艾，如前法
 試之，以待相易，令回欲

尿大。

流注結核胸腹腰背，或結塊漫漶，悉用同法灸法，以
 葱熨之。

葱熨法 治疳積及大小便不通 又治疳積 傷寒

① 脆：原作“胞”。据《保嬰撮要》卷十二《疔疮》改。

卷 四

痘 疹^①

辨痘 伤寒则咽干壮热、口中气热、呵欠烦司项色作食则身热、口中气、孔不闭、腹中痛。若出之则面燥腮赤、目胞赤赤、呵欠烦闷、至凉至热、形微喷嚏、是初冷、夜卧惊悸多睡、耳尖冷、眼望^②。总以耳冷、尻冷、足下冷及耳后有红缕赤脉紫之、然须见心窝可结声如栗起、乃为真也。

看耳筋法 未出之先紫筋者不治，急服凉血解毒药救之，亦有舌者。大红者可治，水红者不药而愈，桃红者各分轻重治之。

治法 或发、或泻、或解肌、或化毒。凉血清肺、调其脏腑、平其饮食、泽其禁忌、严其摄养、适其寒温。使出无不快、或无不痲^③。既愈之后、不致遗毒流注虚劳、目疾翳膜、疮疖疔毒、喉闭喉肿、潮热汗泄、此大

① 痘疹：原无，据原书目录补。《稿本》卷五内封作“痘症”，可参。

② 增：原作“增”，据《幼科释谜》卷二《伤寒·伤寒原由证治》改。

③ 撮：原作“揖”，据《幼科证治准绳》集之四《痘疮·初热证治》改。

④ 使出……痲：此9字《幼科证治准绳·心脏部二·初热证治》作“使出无不快之经，成无不痲之溃”，可参。

略也。凡见出迟发慢者，根窠欠红活者，便当忧虑调治，切勿袖手待毙。惟用温平药治之，不可妄下及妄攻。顿与乳食，不受风冷可也。温平者如荆芥、薄荷、防风、甘草、牛蒡之类，非热剂也。鼠粘子汤、解毒防风汤，速而用之，保毒和中安表而已。有大热者，宜利小便，用导赤散、四苓散。有小热者，宜解毒，用消毒饮、四圣散。

日数 除初热三日不算，盖有热发二五日或十余日故也。自报痘至收靥，首尾十一日，中间有不守禁戒，以至淹缠。又有气血和者，不及十一日即愈。属虚寒者，十数日后方死。属毒甚紫黑者，不过七八日死。盖毒不能出，过六日毒反内入脏腑。故六日以前，急服凉血解毒之药救之。六日以后，医无及矣，故死。最急六日内当日夜服药，毋或姑息。

发热三朝 痘欲出时，热动五脏，则五脏之症俱见。其呵欠频问者，肝也；目发惊悸者，心也；乍凉乍热，手足冷者，脾也；面与腮颊赤，咳嗽喷嚏者，肺也。惟肾无候，以其在下也。发热似伤寒，不可疑似问之，且与升麻葛根汤、参苏饮、升麻解毒散。热甚发停，用尊化汤化下抱龙丸。发热欲出而作痒者，急服神犀汤出之，

1 毙：原作“弊”，据《医学正传》卷六《痘疹》“论”改。

2 发热……似问：此10字《张氏医通·婴儿门下·丹溪参补陈氏痘疹论》作“证似伤寒，疑似未明，先与惺惺散、参苏饮”，可参

以腹痛止为度，免出肾经之病。发热之初，急宜表汗，使邪毒汗散，则痘出稀少。然表药必在红点未见之先，乃可用也。伤寒疮疹，疫疔潮热，五日已衰，疑似未解者，宜用四物解肌汤。五日已内，发出即出；五日已外无者，非痘也。

发热吉凶 身无大热，腹虽痛而腹不痛，过二日后，才见红点坚硬碍指者，不须服药。发热时，一日遍身即生红点，稠密如蚕种样，摸过不得手者，凶。头面上有一片色如胭脂者，凶。

照痘法 以纸捻蘸清油燃火照之，凡灯光影与痘根同星相为周旋，根窠红活，浆影深厚，则皆可调治。若根窠不起不红，血死不活，浆无影者，虽轻难治。故白日亦必用麻油纸捻照之，全在眼法神巧。又以手指摩面颊，如红色随手转白，随白转红，则血活而生意在矣。如指之不自，举之不变，是为血枯，虽轻勿治。又看目睛神光了然，口唇尖上红活如常，无燥白之色，乃吉。

见点 初出时若蚕种之疑空也，如蚊蚤之迹隐也，薄如麸片，密如针头者，不起发而死。粘聚模糊，肌肉虚浮者，不收靨而死。

报痘 热甚烦躁同见，面色不食，一齐突出，红紫黑色，难治。

报疔 时颊腹背，腰大痛，口臭，出紫点或青斑者死。

报痘时色白皮薄而光，根窠全无红色，或根带一点红，三五日即长如绿豆大，此决不能灌浆，后泡清水，擦破而死。

报痘时全不起顶，又顶如汤泡及灯草烧之状，十日并塌死。

报痘时，起红斑如锦纹者，六日死。遍身如蛇皮者死。黑斑如炭状，肌肉成块黑色者，即日死。

色红紫焦枯，肌肉不起，皮厚而黑者，名铁甲痘，八九日死。

出痘三朝 发热一日即出痘者，太重。二日即出痘者，亦重。微微发热，三日二乃出痘者，为轻。四五日身凉，乃见痘者，尤轻。自正痘一日至二三日方齐，九乃出至足谓之出齐。

如发热过一日，痘不出或不快出，即微发之，用消毒饮、化毒汤、犀角消毒饮。如痘发后不多出，即加药发之，如一日二三服可也。

如加药发后不多出，即其根本稀，不可再发也。

如出来日密，胸背尤多，此毒盛也，急服消毒饮，加青防风汤以防毒入里陷。出甚稠而外有热，痘则愈狂，用猪尾膏。

痘出未齐，乃再快出，用透肌汤。痘出时疫风重发入者，用加味四圣散或快瘟散。凡痘出不快，宜用圣散。五圣散、紫草饮及丝瓜汤之类。一发表密过，头，形势

重者，连翘升麻汤。疮稠密，身表热，急服鼠粘子汤，防其土青黑陷。痒出大落，恐入眼为害，煎药每饮加芩、连酒炒，外加护眼膏。头面上忽生三五个，或止一个高大紫黑，似丹毒者，名曰飞丹。此最轻，或只此一丹，再不生痘。

出痘时吉凶 丹出如粟米大，或如绿豆大，似水珠光泽明净者，吉。一出即变黑者，痒痒也，保元汤加紫草、红花散之。紫黑斗大，以手拉过，皮软不碍指者，名曰靨子，过一日变成水疱，急以保元汤加紫草、蝉蜕、红花散之。已成水疱，用保元汤加四苓散利之，此一千全妙法也，不然则死。出痘时发疹，所知部纹者，六七日后决死，急用化毒汤加红花、黄芩、升麻散之，变黑斑则死。

部位吉凶 面属心火，鼻梁以上及日月角位，先见点者，凶。左面肝木，右面肺金，如为疹先见点磊落者，吉。若相掣作块，其肉便即者，死。须臾唇，口唇四围，先见点地阁先见者，吉。鼻属胃土，准头先出，凶。一出红点，发于山根之上，为毒害之气，急用凉血解毒药，以防危急。耳轮先见，凶。

痘色 灰白色者，气虚也，保元汤加木香、芍药。肉色最妙。紫色不润者，血毒也，保元汤加当归、赤芍、升麻。血热者仍加生地、玄参，倍黄芪以散。皮上厚粘痒者，忌逆起浆，用桑叶白芍洗患处，以

井花水^①渍之，使湿气凝于疮上，顷间光泽易起，又能消秘。由红面白，白而黄，黄而黑，此出形、起发、成浆、结痂之正色也。出面带紫，起发而灰白，此色之变也。能辨形色，可知死生。

色之红者，乃初出也。白者，青未解也。黄者，青将解也。干黄者，青尽解也。灰白者，气衰而血不附也。紫者，青盛而血滞也。黑者，热极而基化水也。焦黑者，气血枯也。

发热二日之后，热退身凉，大小不等，作一次出，淡红色如水珠光泽者，不须服药，不可妄治。如皮肉昏黑或赤肿，根苗上枯青紫或灰白者，此青盛也，急以消青饮、夺命丹合服。

托痘秘方 菟丝子一味，醋浸一宿焙干，勿令焦，为末。于发热时，每岁儿用七分，量儿大小加減，好酒调服。此方托之，使痘易出、易发、易浆、易靥，且保无他症，真仙方也。但气血弱者，未出之先可用。若既出之后，断不可用，用则恐托出太多也。若保婴丸则又解青，而使痘稀少。各有其用，各成其妙也。

保护咽喉 痘未有不咽喉者。初出之，急用甘草桔梗牛蒡子汤，其者射干鼠粘子汤，早令毒火解散，免生

① 井花水：亦作“井华水”，清晨从井里第一次汲出来的水。如北魏·贾思勰《齐民要术·法酒》：“秬米法酒：秬米大佳。二月三日，取井花水三斗三升，绢筛翻末三斗三升，秬米三斗三升。”

喉症。

保护眼目 痘方出时，使不入目，以神应膏涂眼四周，或只以胭脂取汁涂之，或以牛蒡子为末，蜜调贴内眦上，神效。

神应膏 黄柏一两，绿豆粉一两半，甘草一两，红花一两，为细末，用胭脂水和蜜，调涂两眼四周之疮上。

眼中流泪或多眵，目中红赤，用洗肝明目散加蝉蜕见效。眼病人忌吃鸡、鸭、鸭子，并忌其气，触之即伤眼。

脉 痘疹脉静身凉者生，脉躁身热者死。七岁以上，五至为平。七岁以下，六至为平。过则为数，邪气实也。不及为迟，正气虚也。

起胀三朝 痘出二日后，当渐¹起胀，先出者先起后出者后起。至四五日，毒气尽发于表。观毒虚实变毒浅深，全在此间。面上红者，终不起胀。额脸乃一身之主，若额上先胀者，四肢必²。若上不胀，遍体皆不胀。上体已胀，下体缓慢者，无害。下体已胀，上体缓慢者，逆起胀时，浆带不行，顶陷不起，或风寒所克，俱宜水杨汤浴之。按：浴时冒入风邪，其害尤大，不如不浴。须看天时，不可

。凡起胀时毒尽³在表，须趁甲寅，则可无虞。苟略有⁴，则内气虚脱，毒乘虚内攻，而身陷伏矣，宜用固真汤。

以不起胀，灰白顶陷，皆虚寒也。宜内托散加丁香、

1 渐：原作“朝”，据《古今医案·痘疹·起胀三朝证治例》改。

或酒调紫草膏。若紫黑陷伏不起，乃火盛血热，宜紫草汤调四生散或独圣散。起胀时有丘长大的紫黑者，名曰疔疔，把住疔疮令不起，失治则死。急用保元汤加鼠粘子、荆芥穗及酒炒芩、连，外用银针挑破疔头，令父母吮去恶血，或绵裹指甲，揩去恶血，使疔破而毒气发泄也。仍用雄黄一钱，调胭脂汁成膏，点疔头上，立见红活。此以毒、胭脂活血。

起胀吉凶 五六月，疔尖高起如鼓钉，摸之得指，光泽明润，肥满红活者，吉。出不快，自得起胀时陷，结出如粟米，于疔空隙处同争者，吉。起胀时，根窠全不起，头面红肿，如匏瓜之状者，凶。起胀时，疔顶皆黑，其中有眼如针孔者，凶。遍身陷伏不起，腹胀气促神昏者，凶。

凡疔密者，多难起顶，以灯影之，苟牛皮毒水炮光润，虽平，亦无妨。

但红活不甚长大者，气不足也，用四君子汤合匀气散，加入中黄。如焮肿色带红紫者，血热也，用四物汤合消毒饮，加入中黄。不润泽有干者，血弱也，用活血散加消毒饮。如不起发，不红活，平塌灰白者，十全大补汤加入中黄、牛蒡子。如有青土者，内服快班汤加入中黄合夺命丹，外用四圣散合胭脂涂法，或用胡蔓酒，或用水杨汤浴法，务求光壮红活而后已。如中间有成水疱者，防其塌痒，宜先补脾胃，使肌肉实不作痒可也，十全大补汤加防

风疏风、大力子泻火。

①至四五，仔住不甚起者，少后力也。用生黄芪、人参、当归、鹿茸煎服，少加木香。

表虚，则一齐汗出，不能收敛，必生痒塌。里虚，则留伏壅遏。

贯脓三朝 贯脓一日，胃气升也。是以胃气为本，胃气升焉，化毒成脓，自口肌肉上贯起，直至顶尖，充满光润者，此气血大振，毒聚已清，将欲收敛之时也。当结聚而不结，由血热留搏，毒气内外争注，必复入心，宜用猪尾膏。

贯脓时，尤当慎守时忌。饮食为鲜。切忌寒凉渗淡之物。若伤脾胃，则清气下陷，不能贯脓也。出后历七日，当贯脓之时，外若起脓，而中平下陷，无脓血者，死。若略有清水，根窠红活，犹有生意，用内托散倍人参、黄芪、当归煎，入好酒一大乳各半盏，温服。此贯脓之巧法也。九日十日，出水之时，元气重聚，真阳运化，其水自然消烁，此循环之妙理也。若未曾解毒，则至此时水不能化，反归于胃，胃气则不能贯脓成脓，或致吐泻陷伏，宜用定中汤。至七日后，壮热毒盛，气弱声哑，用宣毒防风汤。

贯脓吉凶 浆行疮甲犯毒，黄色，或苍蜡色，或黄绿

① 自：原作“目”，据《医学入门·小儿门·痘证》改。

色者，吉。若色淡者，虚也，保元汤加干姜、肉桂、糯米煎服。头面先回浆，四肢方才起胀者，吉。贯脓时，或吐泻不食，乳食不化，腹胀声哑，寒战咬牙，皆无脓，肌肉黑者，凶。贯脓纯是清水，皮白薄如水泡，三四日脱身，搔破而死。贯脓时满身抓破，其中干枯，全无血水，皮白干如豆壳者，凶。

收靥三朝 收靥三日，浆老痂结，自上而下，按之坚硬，苍蜡色，或黄黑，或似紫红葡萄色者，佳。如当胎不胎，谓之慢。有青盛不结痂者，猪心龙脑膏妙。寒战咬牙，足膝如冰，耳尻反热，于起尿。贯脓。收靥时俱忌，乃气血虚极，宜保元汤加桂；甚者，量攻散救之。痘痂不焦，是内热蒸于外，散漫而行故也，宜风散导之，生牛角磨汁服之，必着痂矣。当胎不胎，发热蒸蒸，用甘露回大饮，即可热退。痘痂外清不结痂，谓漏，散疹之。发脓穿不青蜡，但调沙糖汤与吃，即结痂。胀而不焦，此失清凉之气也，须察症候而清凉之，如清凉饮、猪尾膏、龙脑膏并佳。

收靥吉凶 痂落从头下至胸、背、手、腹、腰、足，节节缓落者，吉。谢后斑红者，吉。白无血色者，过后亦死，急用消毒饮，二剂后用补气血、养脾胃药预防之。

① 甄陶：烧制瓦器。出汉·桓宽《盐铁论·力耕》：“使治家养生必于农，则舜不甄陶，而伊尹不为庖。”此处为方名。《万病回春·痘疹》：“若痘疹时湿漏，乃外清之痘淋漓粘沾者，宜以甄陶散敷之；新瓦不拘多少，为细末，筛过，绢袋包，扑患处。”

引囊及足上先痲起者，凶。将临时，其痘一时尽黑，乃火极攻里也，即凶。当靨时，遍身臭烂如腐塌，目中无神者，凶。

落痲 痲落后，面颊突起成凸者，此热毒未尽，解毒防风汤。如陷下成凹者，脾胃虚不能长肌肉也，人参白朮散加黄芪主之。

痘科方 如初发热，未见广丘，未能痘其何痘者服

升麻葛根汤 升麻 一钱，干葛 一钱，甘草 一钱，白芍 一钱，赤芍 一钱，加羌活 一钱，麦 一钱，煎服。或服参苏饮方见便易二十六页、小柴胡小儿。

发热鼠粘子汤 鼠粘子 一钱，羌活、荆芥穗、炙草、连翘、黄芩 各五分，地骨皮 一钱，空心服为早，勿与乳食。

又鼠粘子汤，鼠粘子四钱，荆芥穗、甘草各 一钱，防风五分。

解毒防风汤 防风、荆芥、地骨皮 黄芩、白芍、枳壳、鼠粘子，煎服。

导赤散 人参、麦冬去心、生地、木通、甘草、竹叶、灯心，煎服。

四苓散 泽泻、猪苓去壳、白朮 各一钱去支、木通，煎服。或为末，白汤下。

1. 赤：《幼科折衷》上卷《诸泻》“四苓散”条作“茯”

消毒饮 鼠粘子一钱，以、荆芥一钱，生甘草五分，防风五分，连翘、升麻、紫草、山豆根一方无山豆，各五分，煎服。或加犀角汁、酒芩、山楂。

四圣散 治痘出不快及倒陷 紫草茸、木通、炙甘草壳麸炒，各五分，煎服。一方有黄芪。

加味败毒散 荆芥、羌活、独活、防风、荆芥、薄荷、川芎、枳壳炒、桔梗、天麻、地骨皮各一钱，升麻、紫草、蝉蜕、紫苏、犀角、葱白煎服，表证之 徐参苓，恐助火也。

神解汤 治发热，欲出汗，微痛者 柴胡一钱，升麻一钱，白茯苓、麻黄、升麻、防风各八分，甘草一分，煎服，温覆出汗，不汗再服 免出肾经之病，此法甚奇

四物解肌汤 升麻、葛根、白芍、黄芩，煎服 凡伤寒病症不能解者，以辛凉调之，即此汤也

化毒汤 治痘出不快，且令稀少 紫草茸一钱，升麻、生甘草各五分，糯米五十粒，煎服 凡用紫草，必用糯米五十粒以防泄泻。

犀角消毒饮 治痘不快透，或已出热尚未解 荆芥穗、防风、黄芩各一钱，鼠粘子一钱，以、甘草、犀角屑各五分，水煎服。

猪尾膏 治痘陷伏，倒陷不起，发毒气入里黑陷者

① 痘：原作“症”，据《古今医鉴·痘疹·发热三朝方药例》“神解汤”条改。

龙脑一钱，剥取小猪尾尖白，和丸小豆大，紫草饮或淡酒化下。热甚，则酒浸水化下。一方加辰砂一钱，木香汤化下，可调于药内。

透肌方 治身不快甚 紫草、白芍、升麻各一钱，糯米五十粒，煎。

加味四圣散 治身出不快，或陷伏倒陷 紫草茸、木通、木香、川芎、黄芩、人参、甘草各一分，蝉蜕一分，糯米百粒，煎服。

快痲散 治身出不快，反被风复入 紫草茸、人参、蝉蜕、白芍各六分，木通三分，甘草二分半，煎服。

紫草饮 治身出不快，三四日隐隐，将出未出 紫草茸，以白沸汤一大碗沃之，当好，不令三气一伏温，服半杯，并即一治时，紫草皆当用茸，乃有发出之功。今人用根，反利大便，大便泄者，万不可用。

丝瓜汤 发疹疹最妙 取丝瓜连皮子，烧存性，为末，用少许温汤调下。或以紫草、甘草煎汤调服，尤妙。

连翘升麻汤 治疮疹，发便密如蚕种，或如糠枇，甚甚者 即升麻葛根汤加连翘也，升麻、葛根、芍、草、连翘。

鼠粘子汤 消毒饮 四圣散俱见前。

保托汤^① 人参一钱，黄芩、甘草各一钱，姜一片，水

① 保托汤：《万病回春·痘疹·痘出齐宜》作“保元汤”。

煎服。

四苓散 化毒汤见前方。

胡蔓酒 治疔出不快 胡蔓 一两，以酒一升，同煮沸，盖好，勿令泄气 候温，用酒喷一身令遍，勿喷头面 以衣温覆须臾，乃出快也 无刺发则用了可也 又方：胡蔓，以酒煮，治疔出不快，葡萄酒饮之 又食之 尽出无复者，则用葡萄酒七升名曰葡萄酒 又方：蜂窠二十个，煎服。山楂肉为末，汤点服。

起胀固真汤 治痘泄泻 黄芪、人参、白朮、茯苓、白芍药、木香、陈皮、诃子、肉豆蔻、炙甘草各一分，糯米五升，煮服 糯米止泄泻 养元气最好 疔不起胀，煮粥和糖服，且解痘毒。

内托散 活血行气，调胃补虚，内托疮毒，使之尽出 治疔不起发，根窠不红灰白，咬牙寒战等症 人参、黄芪、川芎、当归、白芍、甘草、防风、白芷、厚朴、木香、肉桂、姜、枣，煎服 色红紫者，去桂、木香，加穿山甲、蝉蜕 色淡白者，去防风、白芷、厚朴、糯米 当黄脓出不快，倍参、芪、当归，煎服，入人乳、好酒服

紫草膏 治疔不起胀 白附子、雄黄、紫草茸 甘草各五钱，麝香一钱，全蝎一钱，酒煮二小时，为细末 另将紫草 煎熬成膏，入白蜜一两，酒半盏，炼过，同紫草茸搅匀，调药末，丸如皂角子大 一岁儿半丸，二岁儿一丸，用之 红紫黑者陷者，紫草汤化下 淡白灰陷者，好

酒化，热服。

痘不起胀肥绽 黄狗蚘四五枚，温酒研服 未^①绽，再服。冬月，蝇在狗耳内取用。

四齿散 治疗不红不起，黑陷焦枯 人齿、猪齿、狗齿、猪齿各^②二分，火煨，研为细末 一、二岁儿服二分，五、六岁儿四五分，热酒调下，如神。

独圣散 治黑陷气欲绝 穿山甲取前足及嘴^①上者，炒，研末，木香煎汤，入酒少许，调五分，入麝香少许，服妙。

活血散 川芎、当归。

十全大补汤 参、苓、术、草、芎、归、芍、地、黄芪、肉桂也。

快癍汤 人参五分，当归、防风、木通各一钱，甘草二分，木香、蝉蜕各二分，紫草茸二分，煎七分服。

夺命丹 林黄、升麻各半两，山豆根、红花子、大力子、连翘各一钱半，紫草茸一钱半，蝉蜕、人中黄各一钱，共仙术、酒蜜和丸，厚纸为衣，薄荷煎黄汤下^①；^②，作煎汤，服之亦可。

定中汤 收敛胃气、止泄痢，神妙 取真正黄色土不杂砂石者一斗，用白沸汤泡之，盖好，候温 用两酒杯和水飞朱砂一分，水飞雄黄一钱，少加沙糖，温服，二服

① 未：原作“末”，据《医学纲目》卷三十七《痘出不快》改。

② 各：原脱，据文义补。

立止。

猪心龙脑膏 治方未透，心胆狂躁，气高妄语，或见鬼怪，或已发回倒置，虽有一不更言，必先以白化磁子煎冰水，一钱，细研，调猪心血和丸豆大，每服一丸。心胆狂躁，紫草茸汤化下。黑陷，蜜化下。服毕少时，心神便定。得睡，痘复透活。

异功散 治痘疹之际，头温足冷，肢寒身凉，或寒或热，腹腹足冷可睡者，用此救之。丁香、白芍各一分半，桂皮、白茯苓、白术各三分，陈皮、厚朴、人参、肉豆蔻、丁香各一分，附子五分，每服一分，麦冬、枣一枚，每服一匙。此方痘疹多时，不可不备，有甚可用。

宣风散 治痘青土黑陷，烦渴，腹胀而喘，大便赤涩，乃热毒于内。黑且咽闭，或大便不通，用甘草、陈皮、甘草各一钱，松萝一两，方寸末。一岁儿服五分，四五岁儿一钱，蜜汤下。

甘露回天饮 沙糖局半盏，入白沸汤一钟，调服。

浴法 水杨汤，治一切气血虚弱，或为风邪所克，不能起胀成浆，或枯痒陷伏。杨桐五斤，冬用枝，夏用叶，洗净捣碎，取长流水一锅，煮六七滚，去渣，将三分之一注盆中，先用保元汤加川芎、桂皮、糯米煎服，乃乘热洗浴。良久，以油纸捻点灯照之，累累然有起势，陷处有回晕红丝，此浆影已。如浆不满足，又如前浴。弱

者只浴头面，手足及背。如灯照面无起势，则再添汤，使透背肌肉，盖由内外，令身气随暖气而发也。此药升提，升药力弱，和者转弱，白者转红，陷者自起矣。冬寒，则温房内浴之。

按：浴法之妙，尤妙在先服保元汤而后浴也。切勿可冒风。

洗肝明目散 川芎、当归、防风、梔子、柴胡、羌活、独活、木贼、密蒙花各等分，为末，每服一钱，以糖汤下。

通治 言此宜保元汤。本方以补为主。不出，不出长，有里证，不收浆，通用猪尾膏救之。此方治：凡出方、起尿、目赤、眼胀、眼痛不起、浆浆不行、俱以水汤浴之。

保元汤加减法 人参、黄芪、甘草 钱，姜 片、煎服。一日，初出时少时，加白芍、当归 活血，陈皮 匀气，玄参 大力子解毒。二日，根窠虽回而陷陷者，加川芎、白芷。四五日，根窠虽起，色不光润，加白芍、白芷、糯米。五六日，色昏红紫，加木香、芍、丹。六七日，不能成浆，加白芷、糯米。八九日，浆不上清，气弱，加糯米。十一十二日，血尽浆足，湿润不饮者，内虚也，加白术、茯苓，助其收敛。十三四十五

① 各：原脱，据文义补。

目，或有杂症，只此加减。方不可用者，大寒、大热之品也。

解毒 痘密则有毒，急用凉药解之，虽数十帖无妨，早勿害眼为要。酒炒芩、连，宜解痘毒。一痘初出，痘前秘密，急用消毒散①，加山楂、酒芩、甘草片。一痘出人多，以犀角地黄汤用丹皮、白芍、生地三好，各犀角一入服②，一服即止。一痘青攻暗腮鼓汗津，攻一肚则目睛，攻舒则目暗，攻肺则咳嗽。初出状如蜈蚣，色紫者，用四散散，猪尾膏③。一痘郁于咽，或甚，或毒，四散散加蝉蜕。黑痘惊狂不安者，宜加珠八④散，滑石一两，水飞，甘草六钱，辰砂水飞，三钱，片脑三分，灯心汤调下。一五岁儿服一钱，十岁一钱，能解痘毒。一或时禁草灯心汤磨犀角，取地汁服。一不消，则声哑而死矣。一轻痘宜解毒汤，一豆饮三服，丝瓜汤。一服朱砂去，至两朱砂一分散。一毒入胃则腹中胀多，青红紫色，不痛目角气涎者，死。

辨痘吉凶 痘欲固而发实，不宜太软。一痘自咽喉上起目暗者，凶；然通身发坏，独顶额上不发，则吉。一痘发时，变成水疱，惟额上不破者，可治。一收痘时，收痘悉具，惟顶额上未靥如旧者，可生。

① 攻；原脱，据《幼科证治准绳》集之六《痘后余毒证治》补。

② 如；原作“好”，据《医学入门》卷五《痘症》“初出黑色状如蚊”条改。

不须服药 痘脚稀疏，根窠红活，不泻不渴，乳食不减，四肢温和。

七不治 一痘齿黑陷，喉中涎喘；二憎寒困倦，痘子缩伏；三疮作坑，肉无浆血，或作黑泡；四口臭牙根烂，牙落；五声嘶气喘，或咽药腹中噎；六痘初出，半在皮肤，带紫黑色不出；七误于疏转，气喘。凡痘出，前后心窝，及两手心，皆是心窝者，皆不治。又有四不治：一痒塌寒战，咬牙烦躁；二头面足冷，乱乱欲饮；三灰白色，头面腹胀暗弱；四目上视，气促，泄泻不止。又初出明证，出如蚕种，虽出随没，如蚊虫咬及倒出者，不治。鼻燥有黑气，以手扒鼻孔者，必死。

痘之轻者 作一次出，大小不一，头面稀少，根窠红活，肥满光泽，耳中无，眼中无，脐中无。

重者 齐升出，稠密无缝，身热腹胀，头面足冷，渴泻不止，耳中有，脐中有。

轻变为重 犯房室，不忌口，先曾渴，饮冷水，吃凉药。

重变轻 避风寒，常和暖，大便稠，不燥渴，忌生冷、外人。

轻者 出毒与痘，俱从头至足，身体温暖，能食，大便实。

1 不治：原脱，据《万病回春》卷七《痘疹·认痘法》补。

重者 头上未出未端，脚上先出先空；身体寒凉，不能食，大便秘，出以秋冬，耳及尻反热，一发便出。

险症 头脚齐出齐陷。大疹者，十轻十重。

身黑而忽污，便胀而开燥皮者，逆。水谷不化者，邪虚，逆也。疮端黑如针孔者，热剧也。

痘只出一般者善 痘密若芥子者，大疹也，用黄连解毒汤。黄连、生地、白芍、甘草、木通、车前、银柴、桔梗、连翘、荆芥、牛蒡子。热甚加柴胡、地骨皮，便胀加冬瓜子、枳实。由热入胃者，不忌食、六、七日，合消毒饮煎服。若皮肉红肿成片者，大痘也，用人参白虎汤合消毒饮煎服。

人参白虎，人参煨、石膏、知母、甘草、粳米。

辨痘形色吉凶 以红黄绿色为佳。淡红者，毒始出也；鲜红，则为血热初起；紫者，大热也；全白者，气虚也；灰白者，色衰而气竭也；黑者，毒深而血干也。初出淡红，红变白，白变黄者，吉。一出出色不久即者，毒盛而空也，用紫草饮，外用芥子末涂胸口。黑为血热，凉血为主，四物，加黄芩、黄连。红花。白属气虚，保元汤，参、芪加紫草去甘草。

辨痘虚实 吐泻少食为里虚，陷伏倒陷灰白色为表虚，二者俱见，用异功散救之。不吐泻能食为里实，红活凸绽无汁为表实，用凉局散加升麻、石膏、紫草、荆芥解之。

凉膈散 梔子、连翘、黄芩、甘草、薄荷、竹叶、大黄、芒硝、白蜜、水煎服。表里俱实者，难出易陷。表里俱虚者，易出难陷。气不足者，自汗声不出，疮顶塌陷，宜保元汤、四君子汤。血不足者，灰白色，根窠不红不光泽，宜四物汤加紫草、红花。

辨阴阳痘 足胫冷，腹虚冷，黄青色，面既白，不乳食，目睛青，脉沉数，以上属阴证，不可服凉药。足胫热，两腮红，大便秘，小便赤，渴不止，口气急，脉洪数，以上属阳证，不可服热药。凡痘疮虚寒用木香异攻散，实热用凉膈散，有起死回生之效。寒热宜辨别，异攻散必脉虚细，四肢身体冷者，方可用之。有热用此，是杀之也。

痛 痘出烦躁，用五物木香散。与木香一两，丁香、零陵香各一两，白矾一两，麝香一分，每服四钱，煎服。热毒者，加犀角一两，无犀角以升麻代之，轻者，只一服大效。身后痛，膀胱经已，用羌活荆芥甘草汤二味等分。身前痛，肺经已，用升麻、葛根、紫草二味。身侧痛，脾经已，用柴胡、山栀、连翘、防风四味。四肢痛，胃经已，用防风、白芍、甘草二味等分，以急止之。恐叫痛，伤血而变狂也。若热甚者，用东垣治斑消毒散，又名消毒救苦汤。用麻黄根、羌活、防风、升麻、黄柏酒炒，各一分，柴胡、川芎、细辛、藁本、葛根、黄芩酒炒、苍术各二分，归身、黄连各一分，苏木、白术、生甘草、陈皮

各一分，生地五分，吴茱、红花各一分，连翘一分，初生者减半，大者倍，每服五钱，水二盏，煎至一服。斑疹者，因内伤必出斑，大禁巴豆、牵牛、葶藶、干半夏、枳实、大黄、苍术等去药止吐。若耳尖冷、呵欠、睡惊、喘、眼望、知必出斑也，化斑。按：此方专治斑疹悉具，能令不出。若已出稀者，再不出斑。如五麻、葛根、白芍、甘草、荆身、连翘各二分，煎服，此是去也。如非斑疹，先见咳嗽或气高喘促，少加大黄、黄芩；如心口小红斑，必先见喘上惊悸，身热肌高肿，脉弦洪，少加黄连。如合口出斑疹，必先身热，其脉主不敢动振，少加生地、黄柏。此治热毒斑疹之一法也，或用他方活命饮。如食毒、白、葡萄酒物白痢者，用东垣清胃散、生肌汁；若发热饮冷，大便稠白，用四物汤、生芩、芍药；若发热饮冷，大便秘结，用青凉饮；若发热作渴饮汤，用七味白术散，乃四君加藿香、木香。主药也。凡食毒物，必作痛。

痛 痧症发作有二：一则青邪欲出，肌肉细急而痛，宜九味二气散合活面散主之。九味二气散，白术、茯苓、青皮、白芷、陈皮、马勃、人参各五分，炙草一分，木香一分，又名匀气散。活面散又名芍药汤，乃芍、川

① 各：原脱，据文义补。

② 各：原脱，据文义补。

③ 疹：原脱，据《幼科证治准绳·心脏部二·证治大法》补。

少入红花也。一遇皮肤厚，为外寒相搏而痛，桂枝葛根汤主之。乃桂枝、葛根、芍药一升、防风、甘草各一钱，姜三片，豆豉一钱也。

青黛散 合病未作脓，痒甚心烦，用真青黛如枣核大，水磨服之。一遇将结脓，主涩面痛，以猪油调之，随可搽去，则去之。以苦药和猪胆涂疮上，令动，唯落九斑，仍用黄土抹之良。

痒 初出时使痒者，可发之，使邪气泄，痒得出而痒去矣。有将收而痒者，其脓已成，邪气散也，与痒而将痒面痒者同论，不必服药，但痒护之，勿令搔抓，以改中。有水壮泡浆面痒者，当面已化水，水未成脓，尚未化而浑身痒，此患候也，与伤寒时母经皮肤中如虫行者同论。所谓风外搏，邪气内乘，痒自不生，为事风者是已。此候宜之止之，以风药佐之，必令痒去方佳。若痒其发时，不能论矣。大抵出形而皮肉红艳，起发的皮嫩多水者，后多痒也。凡痒红于血色者，如同红活光壮，忽然痒者，此秽气所留也，内服十全大补汤，外用背脊重法。用干艾陈何木，枣子丸如鸡子大，晒干，烈火烧烟熏之，其破者，以白龙改。一吸之。如本于又添痒者，火其也。如疮厚带水，皮肉嫩薄又痒者，湿热也。摇头扭颈，

1 疮：原作“疮”，据《幼科证治准绳》集之六《痘疮·痛》改。

2 拊（xiōu 咸）：拉，拔（毛发）。

3 风：原脱，据《幼科证治准绳》集之六《痒渴》补。

昏闷者，死。

痒 如何治痒者，与发之，药枝药最多加升麻、大力子^①之一起发身痒有二，曰气不足者，与合人补加防风、大力子；有不能食法，以致发痒者，^②与身止之。用四物汤^③、当归、防风、甘草、芍药、羌活、独活、升麻、白芍^④，为末，蜜丸灸实大，每服汤下。如疮上痒者，以四物汤合消风化毒汤^⑤，用羌活、独活、防风、薄荷、荆芥穗、桂枝、大力子、升麻等分，甘草、薄荷、夺命丹^⑥麻黄、升麻、山豆根、红花子、连翘、牛蒡子、紫草茸、蝉蜕、人中黄^⑦主之，外用陈氏法。如疮痒而痒者，用消风化毒汤、夺命丹，外用陈氏法。凡以药散，包作痒抓破者，四君加芪、桂，外以败毒散^⑧。如以药利脾胃虚，致痒者，陈氏木香散^⑨、异攻散^⑩。疮痒又同痒，以犯破损不止者，白龙散^⑪。或云忌生炭灰，宜败毒散。

丹溪法，实则脉有力气壮，虚则脉无力气馁。实痒则势盛，虚痒则势怯。实痒以实表之剂，加凉药。实痒以大黄少许，下其结粪。有因食毒物而作痒者，一物汤用犀角、炙甘草、白蜜，或四君加解毒药。痒并皆因气血虚弱所致，须为调，使气血和平，则无此患。又必察其外痒，色白者用四君之类，色赤者用四物之类。蝉蜕

① 各：原脱，据文义补。

② 下：原脱，因下“厥逆”条有“陈氏木香散、异攻散”，据文义补。

头足、羌活、独活、地骨皮、白芍、为末，每服一匙，水酒调下，一服神效。作蜂蛰破，皆能治之，名蝉花散。

凡疔脓成形，或痒，或犯破者，皆燥，不能成肌。若脓未成之时，不可犯破，必致疔毒内死。

陷落后，毒不尽，要成痼，披开者，用陈年豕猪油敷，神妙。

腫者，邪氣實也，當去血以平其邪。汗者，正氣虛也，當補氣以厚其血。血不榮肌膚，所以作；血和肌膚，痒自不作。又見后世。

① 是常指动物者，将发汗也。因食毒物及食诸物而
 病，因于子午。② 用羌活、独活、麻黄以参、芪、人黄微煎之。
 ③ 身多旧多，身痛同治，及从凉来者，用白芍为末，每
 钱，淡盐下。④ 治心火，用生地黄、当归、白芍、甘草、麦
 冬，煎服。⑤ 如神效。水杨汤治之。⑥ 又云盐和甘草煮，
 水拌，略炒，烧烟熏之，立止。⑦ 又云水煎骨节木，鸡羽
 同烧上，下亦上。⑧ 治难任，宜以败草煨炙之。

麸麦粉亦好。因时发片，遍身抓破，汗内托散。去程，信口早，薄荷、木香，气行血运，痒止。

痛 用马宝之善者，初以甜酒调服，名者清
毒饮 起时共煎内作饼，不妨 凡马宝不为外寒所折

面赤，则必肉·腠厚密，难出为汗。宜折，宜参苏饮；腠密，宜小活血散。白芍木一钱，白芍六钱，炮加白，宜何胆膏。用真硫末泥猪胆汁煮之，仍用真黄土制木炒之良。立将胎，土硬有瘠，宜净猪脂同之。收膏时遍身发，抓破无脓，如豆壳者，死。

大法灰白者气虚，宜参芪；土厚者血滞，宜芍药。气过则泡，血过则；气不及，灰陷不起；血不及，紫青不附。凡市决白灰，不坚实，不偃指，不起脉，宜保元多加酒炒黄芪、肉桂、丁香、川芎、人乳。好酒服之。根黑不红，或红而散乱，以手摸过即转白，灰土如寒毛，不起，枯涩不活者，保元汤和川芎。当归、红花，加山楂以消参、芪之滞，加木香以行滞气。

凡发热作渴，手足逆冷，大便自利，喜饮热汤，皆阴盛阳虚也，薛氏用大异功散，八味丸膏之。如大便秘结，手足身热，喜饮冷水，皆阳盛阴虚也，用四逆散。

地黄丸治之。若身热作渴，面青睛白，此肾经虚寒，亦宜地黄丸。

辨症 呻者，身有异也；自汗者，津不固也；喘粗者，内热也；身重者，湿也；掌中不仁者，心火也；脐中不止者，惊也；摇头者，风也；搐搦者，肝风；咬牙者，咽痛也；咬牙者，心肝热也。

1 肉：原作“脾”，据《幼科证治准绳》卷之六《痘疹》“身痛”改。

2 毛：原作“并”，据《幼科证治准绳》卷之四《痘疹》“痘哭”改。

疮十者，宜退火，荆芥、升麻、葛根、连翘之属。疮湿者，宜泻湿，防风、白芷之属。

有大热者，利小便，四苓散之类。小热者，当解毒。若出不快，勿发，勿下攻，止用抱龙丸治之。疮疹若起，能食者，大黄丸下一二行即止。

凡气虚之症 未见点，用保元汤加紫苏、防风、白芷。见点后，保元汤加川芎、桔梗。见点四日之后，重用参、芪。七八日浆足之后，保婴百补汤，即八珍汤以川芎换山药也。

凡血热之症 未出之前，用十神解毒汤，乃四物汤、红花、丹皮、桔梗、木通、大腹皮、连翘也。见点四日，热症悉平，势将行浆，用大乙保和汤：人参、紫草、桔梗、川芎、山楂、木通、人参、红花、生地、甘草、糯米、灯心也，加減用之。八九日浆足之后，用保婴百补汤。如七八日间，有些黑干枯及青灰土黑陷者，用夺命丹、猪尾等。如泄泻后，则木香异功，此秘法也。

凡热毒壅遏之症，未见点时，须升麻葛根汤。服，随服羌活散郁汤。羌活、防风、白芷、荆芥、桔梗、地骨皮、川芎、连翘。甘草、紫草、大腹皮、鼠粘子、灯心煎服。至见点一日之内，诸症悉平，则用益元透肌散，即大乙保和汤去生地、红花，加蝉蜕、牛蒡、陈皮加減。浆足之后，服保婴百补汤调养。

才发热一二日，即便一齐涌出者，此表毒毒盛，邪热内陷，不能约束于外，故出太速也，宜用发表解毒汤，人参、黄芪、甘草、归尾、地骨、白芍、地骨皮、胡荽、薄荷、玄参、升麻、薄荷、竹沥煎服，可无壅遏之患。

大焦黑者，毒极由壅也，用七物升麻丸，升麻、厚角、芒硝、枳实、大黄、芍药、或当归丸，煎服。得利后，以紫草饮用紫草、白芍、麻黄、当归、甘草各1等分，加味四圣散。仍²用胭脂涂法。

胭脂涂法 升麻煎浓汤，用胭脂浸出红汁，拭疮上。

皮微薄者，脾胃气虚也，用十全大补汤去生地，加防风、白芷。外用六一散蜜水调拭疮上。

疮出与地骨皮相似，无起发之毛，乃是红班，急用羌活散，羌活、独活、川芎、枳实、独活、前胡、柴胡、地骨皮、炙甘草、枳实、防风、炙天麻各2等分，加紫草、红花、蝉蜕、木通、糯米，连进数服；或以六一散紫草膏、保婴丹随症用之；亦可俟疹退，以升麻汤加木香、豆蔻煎服，以解壅遏之毒，防其再发。若有人也同此治，如治稍迟则变黑班，不可救矣。

痘若稀疏者切不可妄治。若稠密发不透者，宜引透之。但痘不甚长大者，气不足也，用四君子汤补人中

1 各：原脱，据文义补。

2 仍：依照，沿袭。《尔雅·释诂下》：“仍，因也。”

3 各：原脱，据文义补。

僧道看经^①等，犯之则闷乱，疮痛如割而死。房内忌沉、檀、降真香、麝香、冰片，燥血故也。疮落，又忌早浴，切记。

禳法^② 痘触秽气痒痛，以苍术、细辛、白松、川芎、乳香，烈火烧之。更以胡荽浸酒，化下苏合香丸。胡荽酒喷床帐衣被，能去秽气。

救药误 过用参、芪而腹胀喘急，宜枳壳汤。误用五苓、木通而大便秘塞，宜宽中散、麦冬汤。过用辛热之药而咽痛，烦躁闭渴，皆用药过深，致虚而变实也。切勿过于疏利，再成脱症。又如泄泻之后，调理失宜，以致津液暴亡而渴，气虚而喘，皆虚极似实也。治渴用参、苓、白朮、木香散，治喘用人参定喘汤、独参杏仁汤。然此等症，有实热而渴，气壅而喘之理乎？

实极似虚 壮热肥红，烦渴腹胀，便秘喘急，皆实症也。而热毒壅遏，或上攻而呾日，或下陷而泄泻，或内攻而腹胀，不思饮食，则实极似虚矣。治宜升提发散，以达其毒，使热气伸越，则脏腑和平。切勿误用干、朴、半夏等热药于呾吐不食之症，误用参、朮于不思饮食之症。药入口，立见杀人。然亦有虚胀而必以参、芪救之者，疑似之间，关人性命，不可不辨。

① 外人僧道看经：《痧疹辑要·禁忌》作“生人往来……勿使僧道师巫入房”，可参。

② 禳（ráng 攘）法：祈祷消除灾殃。

热症变虚 疗症血热，只宜清凉发散，不宜用苦寒如升麻、芍药及泻下之药，必致内伤脾胃，致食渣泄，外冰肌肉，留伏不聚，五六日后，变成虚症。但一见虚，便从虚治，木香异功亦可，半用之。总要辨清，方可用药。盖热证古宜升提发散，然散之大过，则肌表全虚，元阳托散，内里清冷，自汗昏至一六七日后见之，虽木香异功亦当止。其热之后，七八九日，曾经泄泻，皆从虚治。有木香异功之症，使用木香异功。如无泄便之症，切勿误投泻药。无泄泻之症，切勿误用木香异功等药，用猪尾膏或上、枣变百祥丸或加味宣风散治之。

凡冬令及大风不可用香药，感冒风冷，必致杀人。

声音 声出肺与心，或感风寒，或多停气喘，不同乃已出，而不出。失音者，身热则用解青防风汤，身冷则内托散倍桔梗。如痰喘声哑者，肺气绝也，厚唇不好，声哑亦死。

咽喉痛 声出甘苦，宜消毒饮，或如圣饮。用麦冬、桔梗各二钱，大力子、甘草各一分，竹叶一片，煎服。如喉上痛，为肺热也，心胃热也，宜如圣饮。水浆不入，宜用消毒饮。如喉有毒，饮食如锯津咽，水浆不入，或一出，或不出者，急用消毒饮。如喉上见此证，便秘者，用消毒饮入煎药，加一分，宜用猪尾膏。如生肌散，不能充托，用消毒饮。用大力子二钱，甘草一分，防风、升麻各一分，地骨皮、芍药、麦冬、

宜用蝉蛻汤治之。

和解汤 二日前后服之，可免内证之险。治二日前后
发汗，汗已内湿，治无及矣。用升麻、白芍、葛根、人
参、川芎、甘草、防风、羌活各四分，姜三片，煎服。

出不快而腹痛者，用活血散，即一味白芍，姜汤、
陈青入膏，使血无度，腹痛啼哭，生苗一分，郁金
四，为末。每服半钱，以浆水半盏，煎至二分，和掌记服
量儿大小增减，日二服。

温药治寒痛例 作葛饮汤，手足并冷，六脉虚细者，
宜苈黄散或理中汤，^①加白芍、肉桂。

凉药治热痛例 作葛饮冷，手足并热，脉洪数者，宜
升麻汤、连翘升麻汤、双解散之类倍加芍药、甘草。

收靛时忽然腹痛 有饮食也，丁香脾积丸重物，汤
送下。

丁香脾积丸 二棱子、去核七、莪术去皮、^②、神曲各
各七钱，青皮、小茴香、陈皮各五钱，巴霜^③五钱、丁香
木香各二钱，为末，醋和神曲，为丸绿豆大。每服五七丸，
姜汤下。

腹胀 脾胃虚气攻作也。胃虚则腹，饮水多则厚，
有伤生冷有胀者，用木香散。木香、丁香、枳皮、陈
皮、半夏、赤苓、人参、大腹皮、诃子皮、南胡、甘草。

① 巴霜：即“巴豆霜”。

各一分，姜一片，煎服。有青筋者，宜用白芷。有毒气内陷而胀者，宜入齿散。用小儿肉白落者一个，火煨为末，每肉末五分，入羌活一钱，穿山甲炮，少许，紫草汤下。月蚀用桔梗枳壳汤、一陈加枳壳汤。若虚弱自利，四肢厥冷，腹胀发喘者，甲气虚也，姜附理中草急救之。

溃烂 紫叶方，败草散。或黄土细末掺之。若月蚀烂生蛆，以带叶柳枝铺地上卧之，或芭蕉叶。又水杨汤浴之。疔疮广，不收口，坑深，用蒲扇膏、芒硝末调猪胆涂之。疔烂成片，脓水不干，宜白龙散。用深山黄生食蛤土，火煨成灰。取中心白者，绵裹拍之。移气冲能发痒，抓破溃烂，宜服内托散，外用祛秽散。苍术、细辛、川芎、甘松、乳香，为末，焚熏。擦破周身不能回水，宜麝香散。用新瓦研细末，拍之。上癰堆积，内有血胀者，鸭卵清此散。又方，荔枝壳、草纸、败草二味，为末掺之，自能收水结痂。

痘抓破出血黑虎丹 丝瓜连带、连皮、连黑子，烧存性，掺最妙。

寒战 山出秽密，有转动艰难者，不可使作寒战，妄投热药。寒初出，寒战自出乃定，宜柴葛桂枝汤。用柴

1 山：原作“白”，据《医学入门》卷七《妇人小儿外科用药赋》“人齿散”条改。

切、葛根、甘草、桂枝、防风、人参、白芍各四两分，姜一片，煎服。身已出，皮已成浆而寒战者，宜秦艽化毒汤。用人参、炙黄芪、桂枝、甘草、当归、熟地、滑石、附子，或发寒战，能令病子蛰伏，用木香异功。有用白术、芪、归加芩，治寒战而愈者。如身密汗出，身战振动者，不可谓之寒战，张氏有去白术。收湿之时，身皮固静，但身战慄者，须从自定。有经络之血，为身战慄，肌肉战动者，不可谓寒战，十全大补汤主之。七日身战者，表寒也；咬牙者，内虚也，用保元汤加桂。七日后身战者，气虚也；咬牙者，血虚也，保元汤加芍、归。

咬牙 如发热之初使咬牙者，身热也，用无舌汤。日久重咬牙者，心热也，予小散；不可妄用热药，予与微加前胡黄连、牛黄子之。咬牙甚者，身战，予散为甚，宜地黄丸。咬牙而黄饮汤，引气引血，引水引功。身战，用木香。咬牙而赤，身战最重，予小散。身战也，小量用交冬散，后用四物汤。

人参归脾散，治咬牙而黄，煎服作散。人参、白芍、木通、赤苓、甘草、紫草。

枣变百祥丸，用大戟去骨，一两，大枣去核，二十枚，水煎，用酒下。水煎，去大戟不用，将大枣丸煎于水。十丸，煎服。治变百祥丸。治变百祥丸，治变百祥丸。

1 各：原脱，据文义补。

2 脂麻：即芝麻，又称胡麻、油麻。

代之见上。

无忧^①散、治临危^②疳，寒战咬牙。人牙、雄黄、珍珠。先用人牙^③二枚，^④雄黄、珍珠各五分^⑤，共研，每服二分，荔枝煎汤下。一方加牛黄一分。又紫草、甘草、当归、防风、陈皮、赤芍，煎服。

催蛰丹。疳^⑥八九朝，脓浆不允、倏^⑦然寒战咬牙，以此治之。虎牙、人牙各一枚炙，研，和人参、丁香木、人乳，和酒服。

七日以前寒战咬牙者，心胃热也。七日以后寒战者，气虚也。七日以后咬牙者，血虚也。七日以前属热，凶。七日后属虚，亦有可治者。

惊搐。心肝热也。宜泻风，用泻青丸。利小便，用导赤散。

发^⑧，先身热惊搐搐，非惊风，宜红程散。用麻黄、羌活、独活、全蝎、天麻、薄荷、紫草、甘草、白芍、川芎、白术、以散之。先序后^⑨者，轻。先^⑩后^⑪者，重。

① 忧：原作“曼”，据《幼科证治准绳》集之六《痘疹下·寒战切齿》“无忧散”条改。

② 不拘多少：原脱，据《幼科证治准绳》集之六《痘疹下·寒战切齿》“无忧散”条补。

③ 雄黄珍珠各五分：原脱，据《幼科证治准绳》集之六《痘疹下·寒战切齿》“无忧散”条补。

④ 倏（shū 书）：极快地，疾速地。《吕氏春秋·决胜》：“倏忽往来，莫知其方。”

如疔发稠密，热内炽，或倒靥黑陷，时作摇掇，用猪心龙脑膏。

呕吐 凡患疔，若吐泻者，不可妄治而多占，邪气上下皆出也。痘初热吐泻无妨，疔出后忌之。若出而吐者，宜神功散。吐泻并作，宜定中汤。寒甚腹疼取干，理中汤加丁香、木香、肉蔻。

泄泻 痘出后，最忌泄泻，起胀时尤忌。泄泻，急用保元汤加肉桂、白芍，煎服。肠滑者，肉豆蔻一个，乳香豆大，二枚，为末，糯米饮调下。疔不起发，根窠不红，或泻而渴，或气促，宜异功散煎汤吞下肉蔻丸，有热则不可用。泄泻频，津液内耗，宜木香散。木香、丁香、桂皮、陈皮、半夏、赤苓、人参、诃子、前胡、甘草、人腹皮、姜各一分，冷症可用，热症切勿用。起胀时泄泻，用固真汤。四君加芪、芍、木香、陈皮、诃子皮、肉豆蔻煨、炙草、糯米各三分，煎服。

痰喘咳逆 疔出后，痰盛喘急，宜人参清肺散，用白术、黄芪、紫菀、地骨皮、诃子各一分，石膏、桔梗、甘草各一分，人参、桑白皮、前胡、当归、白芍、知母、黄芩各一分，煎服。又宜前胡枳壳汤，用前胡、枳壳、炙草、赤苓、甘草各六分，煎服。痘疹黑陷伏而痰盛，先用抱龙丸降伏。疔痰用白附子、杏仁煎水磨服，切不可用。陈汤燥胃中津液。黑陷时咳嗽，乃胃气上越欲绝故也，以真黄土鼻边闻之，立止。痰喘的高声睡者，死。凡无痰而喘急

便秘 大小便秘结，则肠胃壅遏，清气无从发泄而变矣。凡大便二日一次者，为秘；三四日不便，为秘；一日三四便，为利矣。大便秘，宜当归丸。用当归五钱，甘草二钱，黄连、大青各一钱，各为末。先将当归煮出，入末，为丸绿豆大，米饮吞下五七丸，清加盐，以利为度。或用蜜清凉饮，或用蜜煎丸。蜜煎丸，用甘草、猪胆汁、人皂角末三钱，和匀，抄作小条子，纳谷道中，用猪胆汁和匀，效更速¹。

小便黄赤如膏，宜清心降火，不必利水，以从邪治。大便秘结，有血热宜凉，血燥宜润。当以秘之四五日，不大便者，乃气血成实，不必治之。只宜清凉清血，而便自利矣。又宜加用升麻，升提痘毒。

夹斑 正初出，皮肉红肿，甚痒，如银纹者，此夹斑也，以辛凉之药治之，其斑易退。如夹斑成块，其肉浮且坚硬者，又名丹毒。用木戒²煎比，七服，不能治。夹斑易退，荆防败毒散主之。丹毒可治，用玄参升麻汤加黄芩、归、芍。丹红易治，紫斑稍难，紫斑不治。夹斑用犀角地黄汤，又用地龙汁和犀角水煎。紫斑用犀角水煎。痛痒。

夹丹 痘甲未可，内热之极也，不宜用极寒透甲之

1 连：兼得，如南朝梁·刘孝威《结客少年场行》：“近发连双兔，高弯落九乌。”

2 戒：原脱，据《幼科证治准绳·心脾部·痘疮》“夹斑”补。

刺。若标赤，目，施以化斑汤徐徐浴之。化斑汤用全枝薄荷、大水杨柳、荆芥、苍耳草四味，煎浓去渣，将头发家汤、洗去油垢，暖处浴之。内服五龙汤，用黄芩二钱，生地黄二钱，芍药二钱，紫草二钱，甘草，羌活角半和服。此方治一切斑形，其似蚊蚤咬的形者。《医方类聚》云：“臣陵王上通大条，有得无幸焉地也。是代祖一戎功去，臣在刀山走一遭。”好把化斑汤浴之，内服五龙汤。

夹丹痘 外以化斑汤浴之，内服生地、大力子、芍药、甘草、木通、黄芩煎，其毒自消。一夫面患斑，倘如痘如伊者，夹透疹，宜用珍珠散。珍珠散，地子、大力子各一钱，白芍先煎，甘草、石膏为加战，单用落枕花二钱，即月收三回。若神前，须加半回，无活、生地、芍药倍之。

夹疮疡 痘里头疮，痘起透见隙面息揭愈密，乃起气虚，风痒自作，用紫雪荆芥汤浴之。用芍药、黄芩、生地、防风、白术、甘草、黄芩、甘草、蝉蜕、红花、大力子、酒煎服。若杨梅疮，加生黄、土茯苓。尚甚加乳香，如松香、杉粉、飞丹、雄黄，皆不可涂也。凡头陀女以香马二钱煎汤，浴头疮场之毒，究得其妙。但香马药有一种，分别青白二色。根浮上红者，无佳。治用升麻、黄芩为君，芍药、生地为臣，羌活、防风为佐，甘草、蝉蜕为使，此

1 痘：指“《痘经》”。参见《幼科证治准绳》集之四《痘疹·见形证治》“五龙汤”条。

准格也。

夹损伤 一标一白目，或或鼓外，或内、有、与人参、黄芪、当归、红花、哺鸡子¹、蝉蜕、防风、白芍、甘草，以在托其内，用艾焙、和或煮、内外，以散收其外也。若托而不收者，用环皮草之，徐徐以手摩抚。若是或收或落者，不用散在表之药，以凝其内也。一于参、归、芍、甘草内，加地骨皮、白芍、白术、甘草、身带不子，加茯苓、桂心。若其者，少加乳香、木香，以和散之。若伤重者，勿用散药，用白皮、白芍、白术皮掺之。

白痘 有一色白而似粉，或大如小豆，有里有空而空者，用艾或艾叶煎散之。一似粉，大如小豆者，用甘草、人参、茯苓、黄芪、白术、芍药、川芎、当归、甘草、糯米各等分，白散五钱，水煎服。一有里有空而无点，名空痘，快散之。又一方用甘草、白术、防风、黄芪四圣散，治表里俱虚。

黑痘 黑而有光，此贵品也，人所不识。

补元汤 治身虚无气，白根微不赤，色不红赤，乃气有余而血不足也。用当归、白芍、白术、甘草、人参、黄芪、红花各等分，水煎服。一方用当归、白芍、白术、甘草、人参、黄芪、红花各等分，水煎服。一方用当归、白芍、白术、甘草、人参、黄芪、红花各等分，水煎服。

¹ 哺鸡子：《幼科证治准绳·痘疹·夹》“夹损伤”条作“伏风雅”，可参。

² 各：原脱，据文义补。

生，糯米五十粒，枣一枚，酒水各半盏，煎服。观此可知吴氏云气愈盛而血愈干涸之旨矣。原说云：初见深红，失于解散，至于干枯黑陷，当以凉血退热为主，不可专用参、芪补剂云云。

厥逆 手足如指头微寒者，阳气衰也。足心冷者，阳气旺也。故头常欲凉，足常欲温。如头温足冷者，不治。如因热深而厥者，大便不通，用乙承气汤。用大黄、芒硝、厚朴、枳实各二钱，甘草一分，姜一分。色黑者，当和丸。如因阳利气虚而厥者，陈氏木香散、异功散。但手指头微冷者，用枳实、理中汤，当加桂心之一。又手足皆冷，口战咬牙，或吐而不食，用独活汤加龟附子。先用二钱，未应多加之，更不应加至四五钱，或等分亦无妨。如已脱者，不治。又二便散治伤冷体逆，肢冷腹满，口气冷，难发者，曾用丁香散和，丁香一分，姜一分，煎为末，每服五分，白汤下。当微汗时，令押肘温暖，用反折法，则当变云矣。量其大小轻重，量之。其人多多汗者，脾阳虚也，宜和牛黄散，又宜急以术作汤饮之，不可因得下谈腹中已无以致芪理中汤加防风。无汗，或四君加黄芪、桂枝、防风以发之，或以四君加黄芪、白芍、当归、桂心以补脾胃，养气血。

1 气愈盛而血愈干涸：此8字见于《冯氏锦囊秘录·痘疹全集》卷二十三“论干枯陷伏倒壅等症”，可参。

2 分：原脱，据《幼科证治准绳·痘疹·厥逆》“参附汤”条补。

3 好：原脱，据《幼科准绳·痘疹·厥逆》“参附汤”条补。

不能食 四五六日前而不食者，此毒盛于里，犹可治也。六七日后面不能食者，难治。毒已咽起而不食，宜调脾胃。其人怯弱而不食，或因犯胃气虚弱，自利而不食者，为虚，当温养之，参黄、补中、姜、附辈。身热中满而不食者，为实，当清利之，白虎汤。五苓散。如腹胀不食，口角流涎者，四君加陈皮。有欲食而不能食者，必喉舌有疮作痛也，以广犀冰饮煎与之，更以甘草、桔梗、牛蒡子、薄荷散，利咽喉。有杂症者，去其杂症，气和自能食矣。或大小便秘者，利之。

痘疗 痘疹之毒，谓之戕毒，或五六枚，或六七枚，间杂于诸毒间，其色紫暗作痛，以致不救，用仙方活命饮。如便秘少，加大黄。遍身拘急，加麻黄。有肌肉微肿，状如堆粟，不分颗者。有初出红点变黑，其硬如石者。有中心黑陷，四周突起载浆者。有中心载浆，四周干焦者。有头载白浆，白破淡红者。有如水泡者，有血泡者，有疮头针孔浆水自出者。皆于五六日时候之，但见一症，即不可治。此毒必用针挑出黑血，吮去青血。又可用隔蒜灸法。凡痘疮起发之时，但见干痒，其根焦黑者，即内服夺命丹，外用四圣散涂之。用绿豆四十九粒，豌豆四十九粒，各烧存性，珍珠一分，细头发烧过，一分，为末，胭脂水调。先以银簪拨开黑疮，以此涂之。或用二圣散，用雄黄一钱，紫草茸一钱，为末，胭脂水

涂之。

卷帘疔 疔六七日，舌望上卷，喉锁烦渴，疔结舌根。疔甚者如黑豆，次者似葡萄。急把银钩钩破患处，拭净恶血，随以苦茶漱口，尽吐其恶血。用龙宫月、冰片、硼砂、青黛、薄荷、荆芥、僵蚕、黄连为细末，吹喉内。又方用珍珠汁和玉露膏者，亦可。按：此疔人多不晓，天杀儿童，若患此者早，定心经，急宜清解。若补助之药，不宜服也。

燕窝疔 疔形五六日，而腋下使肘，两手指不能活动，烦躁面赤，眼碧赤赤，患处吐沫，乃毒结腋下，名燕窝疔。急用银针挑去其根，尽除恶血，随将燕窝打水澄清者洗净，以珍珠末和调敷患处，内服消疔饮。

消疔饮，鼠栝子、甘草、木通、茯苓、生地、红花、犀角为末，冲服，白芍、连翘、灯草，煎服。

凡详此疔，左腋潜注，则右体之疔沉伏；右腋潜注，则左体之疔叛逆，是准格也。

火珠疔 疔六七日，鼻窍中填塞喷火，气息甚难，患处糜烂，面赤眼红痰紧，饮食不餐，热烙，名火珠疔，宜详眼唇气急，手足乱撒，则是矣。外要钩破，随将药点入眼角，再服泻火汤则愈。用黄连膏和冰片点眼角。

泻火汤，栝梗、牛蒡子、白芍、甘草梢、生地、红

① 宜详……则是矣：《幼科证治准绳》集之六《痘疮·痘疔》“火珠疔”条作“慎治者允宜详验眼翻气急，手足乱撒候，则是矣……”

花、紫草茸、木通、犀角，煎服，二剂。

忘汲疔 疔六七日，两眼沿倏然结痂，赤毒封唇肿胀、热极而面色紫、烦渴，则以治鼻疔法治之。挑破处，速以瓦松捣烂掩之，盖此处不可钩穿者也。又方，专用山慈菇和蟾蜍肉捣烂掩上，取片根，亦挑法也。

豨虎疔 疔正发会脓结痂，而耳孔内结发片毒，急宜挑破，随用芩蒿石、女贞子、薄荷，共研极细末，吹于患处。再同芩蒿石、女贞子，同煎取汁。一先生曰：此方芩蒿石宜改玄精石，内还有水片。女贞子亦是女贞。

注命疔 早期甲，高足半元，形如钱样，反非圆形，或如钱样，或如大黑豆，或如胡椒，一紫筋直上透足股部处，急用银针挑破^①，尽去恶血，随用田螺水或冰片，点一次，再以槁灰草、^②、绿豆浸烂，捣烂掩于患处，内服化毒丹。

骶舍疔 疔自五六朝，身发热，恶露恶肉，两眼眵眼，肚腹膨胀，小便闭塞，恶痛叫号不止，大青紫唇挑，而于骶部高甲结毒，名骶舍疔。疔刻要死，急用银朱、冰片、牛黄、麝香、檀香，俱为细末，将黄连、黄茶浓煎，候冷，取半匙药，把细软棉花蘸药，直纳其窝中，再用韭菜子拉打其毒，内贯木通散毒散^③。一曾用细银丝挑巧

① 破：原作“碗”，据《幼科证治准绳》集之六《痘疔》“注命疔”条改。

② 舍：《幼科证治准绳》集之六《痘疔》“骶舍疔”条作“舍”，义胜。

内，随以清水漱口净，翕之，以尽其毒血，外用真珠、片脑调服，亦验。

透肠疔 疔六七朝之内，腹中饱闷绞痛，大便闭结烦渴，遂下此方，有肿硬些等，名曰透肠疔。此针作其毒，用金银花、防风煎汤，冷，洗净，然后以轻粉、真珠粉、片脑、白敛末，将心点于其上，内取黄连解毒汤。此疔有别后，用野绿豆末和红花末，托，甚妙。亦有用小根捣碎掩者。有用桑妙叶捣碎和麝香敷者，不如前方。此疔与鼠风二者，想可通治也。

痘癰 急用大补气血，古书言点之法，点与点全一名，当取回春散，昏前点目，肢体死为反人矣，用十全大补汤、当归补血散。十全大补汤为四君、四物加黄芪。肉桂也。

苦参丸 苦参、白茯苓、胡柏、牛蒡子各一两，甘草二钱半，共为末，酒调面为丸，竹叶汤下。

肿胀 凡咽喉、口舌、唇舌者，急与解毒护口，救咽喉，相兼治之，再用消毒化毒汤。升麻、柴胡、桔梗、甘草、牛蒡子、防风、羌活、独活、白芷、密陀花、淡竹叶，煎，食后服。此用神效药，凡口舌、咽喉、面颊、手足或腮颊肿胀，此名大头瘟，用羌活救苦汤。羌活、白芷、川

1 杪(miǎo 秒)：树枝的细梢。

2 偷葬老鼠：又号“号病”。

3 预：预先，事先。《广韵·御韵》：“预，先也。”《说苑·建本》：“禁于其未发之曰预。”

芍、防风、白芷、桔梗、黄芩、人参、白芍、甘草、人中黄各1等分，薄荷七片，水煎，食后服。

鼻痘 鼻中不痛者，以其气化而鼻中无气也。若鼻中黑点或高者，无气也，亦此证也。鼻中痛者，服定金汤。

定金汤 黄芩、白芍、白芷、防风、升麻、升麻、参、苓、术、草，加芫荽一握，白银一块，灯心、甘草，煎服。

王克生曰：予治痘疹，原在痘疹者，生；其不最厚者，生；其不红大者，生；其不红大者，生；其不红大者，生。犯此，以芫荽、升麻、白芍、甘草，用升麻汤洗其患处，其痘其衣最厚者，即服此方，无不效。用升麻汤洗之，其痘其衣最厚者，即服此方，无不效。用升麻汤洗之，其痘其衣最厚者，即服此方，无不效。

蛆痘 鼻中不痛，青尽发也。用升麻汤洗之，其痘其衣最厚者，即服此方，无不效。用升麻汤洗之，其痘其衣最厚者，即服此方，无不效。

治痘疹毒，一切痘毒，莫妙于仙方各散。

治痘后余毒，莫妙于人参散。

痘疹再发，或气虚体弱，坐卧不安者，白保元汤。

痘疹忽而身见青黑，口唇搐搦，此气虚或感风，宜清

① 各：原脱，据文义补。

风散。

痘后非时发搐，目窜面赤，乃心热扶热，宜抱龙丸；
举要。

痘后余毒塞鼻中，不得睡卧，宜用辛夷花为末，加麝香少许，以葱白蘸入鼻中，数次即通，名木笔花散。心痛不可忍，此余毒归心，急服乳香散。乳香一钱，煎服。

愈后失音，宜服大花散。大花粉、桔梗、白茯苓、诃子肉、菖蒲、甘草各一分，为末，用水调半匙在碗内，外以小竹七条，黄荆七条，缚作一束，点火在碗内，煎服。

痘后走马疳，牙根腐烂，用白梅肉烧存性、白矾各一钱，人中白一钱，白矾一钱半，共为末。先以韭菜根、老茶浓煎，鸡羽蘸，洗去腐烂恶肉，至见鲜血，乃敷药，日三次。烂至喉中者，用小竹筒吹药入，虽牙根烂落，口舌穿破，敷药皆愈。但鼻梁发红点，则不可治。

痘后咽喉肿胀，宜七味甘桔汤。甘草、桔梗各五分，防风、大力子、玄参、升麻、射干各三分，煎服。

痘牙著疳，即用菜子油，时时不住润之，可揭则揭。若不及时揭，则牙硬必成瘰癧。

痘痂虽落，其斑犹黯，或凸凹肉，韶粉散涂之。韶粉、轻粉各一分，研末，猪骨髓熬熟，调成膏，薄涂斑上。

① 各：原脱，据文义补。

② 各：原脱，据文义补。

一名减班散，日三次。

痘后取活蛭子，以水养之，五日取此水，洗面无班痕。

痘后收靥时，取稀豆汤洗面，则无班。洗半白，半面无班，神效。稀豆汤，六月十伏日，採蒟蒻数蔓，刮上，只此一味，并无别药。

痘后下利脓血，或下肠垢，宜犀角地黄汤、黄连阿胶丸。

下痢 血黄赤，宜薤白、豆豉、山栀、老葱白煎，去渣服，名薤白汤。

孕妇出痘 孕妇出痘，宜覃胎散。热甚，宜参苏饮稠密，宜内托散。上二散倍白芍、当归，去桂加香附、乌药。胎动，宜安胎散。

覃胎散 赤苓、白术、赤芍、柴胡、白芍、人参、当归、桔梗、黄芩、防风、陈皮、荆芥、枳壳、紫草、阿胶、白芷、川芎、砂仁、甘草各一分，糯米百粒，苧根七寸，柿蒂七个，瓜蒂一个，用荷叶盖覆水，以银器入煎，空心服。

安胎散 人参、陈皮、大腹皮、白术、川芎、当归、白芍、赤茯苓、紫苏、砂仁、甘草、香附量便少，各一分，糯米百粒，灯心七茎，煎服。

痘后眼生翳膜遮睛 宜泻青丸 以竹叶汤和沙糖化下，微利，神效。但和血解毒，则疼痛自止，翳膜自去，

不宜点药。

痘毒入眼生翳膜，宜用蝉猪散 蝉蜕 一两，猪悬蹄甲 一两，入罐内，盐泥固济，烧存性，羚羊角屑二钱半，为细末，一岁儿取二分，三岁儿五分，浆水调服，日一夜一服，但半年内者，一月取效。

痘后眼肿痛突如桃者，贴护眼膏也¹。眼肿不开，黄连末调鸡子清，贴两太阳穴及两足心。食毒物睛凸出，宜二仙散。

二仙散 灵脾、威灵仙各一钱，煎服。

麻 疹¹

痲疹辨 有色黑而无颗粒者，曰痲。浮小而有颗粒者，曰疹。斑红痕如锦纹，或如蚊迹，热极则发。疹者如粟米微红，隐隐皮肤不出作痒，全无肿痛。

麻 麻子最小，隐隐如麻子，顶平软，不碍指。痲属五脏，难出难靨。麻属六腑，易出易靨。

出麻 麻青原来只肺胃，红班五六日方出，状如麻子，遍身无空处。初热二日，出发、起胀共二日。出而又没，没而又出，出没一周时许。重者遍身细胀，眼亦封闭，有赤白、微黄色不同，仍要红活，最忌黑陷。按：此可知造名为痧，实即麻之红者。

¹ 麻疹：原无，据原书目录补。

麻疹杂症，与痧大同，但始终药宜清凉，以升麻葛根汤加葱白、苏叶，乃麻疹初起之神方也。或用苏葛汤亦妙，或以加味败毒散表之，汗出身凉，红痕自灭。

苏葛汤 苏叶、升葛、甘草各一两，白芍二钱，陈皮、砂仁各五分，葱白三根^②，姜三片，煎服。

加味败毒散 柴胡、前胡、羌活、独活、防风、荆芥、薄荷、枳壳、桔梗、川芎、人参、地骨皮各一分，加紫草、蝉蜕、紫苏、麻黄夏了巴司、葱白，煎服，表证之本方除参、苓，恐助火也。

麻疹当以葱白汤饮之，其麻自出。如渴，只宜葛根汤，以散其渴，使毛窍中常微汗润泽可也。过一日不没者，内有实热也，犀角地黄汤见上解之。

葱白汤 生葱，去青叶，取白，连根须，水煎，取汁服。

痲驳 疹毒之病，是肺胃热毒，熏发于皮肤，如蚊蚤所咬，今俗谓之红疫。宜葛根麦冬散。

葛根麦冬散 石膏煨，二钱，葛根、麦冬各三分，人参、升麻、赤苓^③、赤芍、甘草各三分，煎服。

死症 麻不出而喘者，死。变成黑斑者，亦死。麻没

① 各：原脱，据文义补。

② 根：原脱，据《景岳全书》卷六十三《痘疹论古方·痘疹》“苏葛汤”条补。

③ 苓：原作“苓”，据《小儿痘疹方论·类集痘疹已效名方》“葛根麦门冬散”条改。

后，余毒内攻，寻衣摸床，谵语神昏者，亦死。

麻疹初出，全类伤风，发热咳嗽，鼻塞，其泪汗汗，或呕或利，面肿，涕唾稠黏，全是肺经之症，不可犯风寒，宜慎饮食为要。但据见症，以泻白散，桑白皮、地骨皮、甘草、知母、贝母、桔梗、枳壳、牛蒡子、牛地、荆芥、麦冬等加减，大剂投之，即至危至险之时，无不愈者。若用苦寒降火，辛温发表之药，则死矣。

麻有发热至十余日始见者，大抵主在发散肺经之热毒者，始事也；调理补养病后之元气者，终事也。其间或兼风兼痰，或伤食，并随宜加对症之药。其有变症，即随症用药，不乱投汤剂，则几无事矣。

预防出麻出痘 凡邻家出痧出麻，用赤小豆、黑大豆、绿豆各一斤，甘草一两，以二豆淘净，用河水与水无妙，煮豆熟，去甘草，将豆晒干，又入汁浸晒，令干，逐日吃豆，可免出麻、出痘。

北人谓之糠疮，南人谓之麸疮，吴人谓之痧，越人谓之疹，古所谓麻。麻发于肺，清凉为宜。目中泪出，肺热移于肝也，或手搔眉目唇鼻及面者，肺热也。凡麻初起，用泻白消毒散。桑白皮、地骨皮新鲜者在，各一钱，大力子以同、荆芥穗各一钱，桔梗、甘草各一钱，浮萍晒干，一钱，为末，每用二钱，煎服。如初起重者，用旋覆花去梗、麻黄去节水煎，去沫，前胡各七分，荆芥穗一两，炙甘草、制半夏、赤芍各一钱，大力子炒研、浮萍各七钱，每用三钱，加

姜一片，薄荷七分，煎服。若泄利，加白芷、升麻、葛根，煎服，能起死回生。即十分危急，守定此方，必济。王守泰先生创方，活人多矣。

辨症 如手足稍微冷，恶寒无汗，面色青惨，左腕有青纹者，伤寒之热也；手足稍微温，发热有汗，面赤而光者，伤风之热也，并宜醒脾散。用桔梗、细辛、人参、甘草、茯苓、白朮、花粉、薄荷、生姜、大枣。面色青红，额正中有纹，手掌有汗，时作惊惕，手络脉微动而发热者，此惊热也，用泻青丸，或牛黄丸、抱龙丸。口胞肿而右颊有青筋，发热而头微痛，腹肚最痛，或呕吐者，伤食也，问所食何物，即以其物烧灰存性，口槌、麦芽、沙糖汤调服。身热而信能食，唇红而赤，大小便秘，脐下满者，此风热也。以上诸热久而不去，麻疹亦能乘间而出，当察时令寒暑，以药发之。腹中喘促，昏闷不安者，化西河柳叶晒干为末，每服一钱，茅根汤下。

上焦多吐，宜黄芩、炙甘草、白芍加茅根、芦根、枇杷叶入七厘散。下焦多利，宜黄芩汤。芍药、芍药汤。中焦吐利俱多，以黄芩汤多加芦根、茅根，调下六一散痢甚，宜黄芩汤。芍药、白芍加黄连、滑石，血痢加地榆。凡麻疹吐利，纯是火邪，不可作别治。

麻出咽喉痛，用甘草、桔梗、大力子、连翘、射干，或牛蒡子汤等，外用玉钥匙吹之。硼砂、玄明粉各一钱，僵蚕炒、冰片，吹之。如咽喉腐烂，加牛黄、真珠末、辰

砂更妙。

麻只怕不能得出，若出尽，则毒即解。

渴喜饮水，乃肺焦胃干，心火内亢也。初发热渴者，在发散药中多加石膏、天花粉，或葛根麦冬散亦可。渴甚者，白虎合黄连解毒汤，用黄连、黄芩、知母、石膏、枳实、竹叶、麦冬、生地、甘草煎服，时入犀角少许。胃热渴甚，多服此方，免生牙疳。

麻要一齐涌出，谓之出尽。以火照之，遍身如涂朱，此将出之状。出形细密，但随出随没，粒粒成疮，色喜通红。若色淡白者，心血不足也，用养血化斑汤。归身、生地、红花、蝉蜕、人参、生姜煎服。若色太红或微紫者，血热也，或出太甚者，并用大青汤。大青、玄参、生地、石膏、知母、木通、甘草、竹叶、地骨皮、荆芥穗，煎服。如色黑者，不治。

疹子一出，随出随没，常以六时为准。假如午后出者，午时即收；午后出者，子时即收。凡此随出随没者，轻。若出三四日不收者，阳毒盛也，用大青汤解之。若逡巡不出者，乃风邪外束，皮肤闭塞也，用荆防败毒散主之。

麻疹欲出，则遍身发热，或烦躁，或头眩，或身拘急。即出，则身便凉，诸病悉解。如麻疹既出，热甚不减，此毒壅遏，急用大青汤主之。便涩者，以白虎合黄连解毒汤见上。大便不通者，四顺清凉饮。用赤芍、当归、大黄各1分，薄荷1分，煎服。如小便不通，加灯心、木

通 若呕泄者，加柴胡、橘皮、黄芩、半夏、人参、茯苓、生姜、竹茹，煎服。

疹出发热不退，饮食不进，宜加味地骨皮散 用鲜地骨皮、鲜桑白皮、麦冬、银柴胡、赤芍、甘草、石膏、牛膝角，捣入无比散 滑石水飞，六钱，甘草二钱，木砂飞，雄黄飞，各一分，为末，调服。

麻疹未出之时，当早发散，以解其毒，则无余灾 否则，必成疳病而死。

收后身有微热，比库热也，不须施治 如热太甚，或日久不减，以柴胡、麦冬、甘草、人参、玄参煎服 如发枯无泽，内消骨立，渐渐羸瘦者，柴胡四物汤主之 如热不除，忽作搐者，止用导赤散加参、麦，服安神丸，切不可作急惊风治 凡麻疹初起多泻不妨，惟愈后忌泻 若重发热，急宜大补气血，略兼疏风。

疹后牙根黑烂，肉腐血出，曰走马疳，宜马鸣散 用蚕蜕纸，四角马鸣是 火烧过，一钱半，人中白煨过白者，一钱，五倍子生用，一钱，再用五倍子一钱，同白矾一钱，煨枯，研细末 先以米泔浓汁浸洗，以此敷之，神效

疹收之后，动作如常，有忽然心腹绞痛而死者，是元气亏损也 间有用人参汤研，调苏合丸而得活者 王生云。

唇口多疮，其声哑哑者，曰狐惑疔 其人好睡，默默不欲食 上唇有疮，虫蚀其肝；下唇有疮，虫蚀其脾

嘎哑其声，上下不定也。麻疔后尤多此症，宜化蠲丸。黄连一钱，川椒炒、苦楝根白皮二者，各一钱，共为末，大乌梅七枚，艾汤浸，去皮，捣为丸，艾汤下。若更烦躁，渐成疔者，用清热除疔丸。黄连、当归各一钱，冰片、青皮、陈皮、芦荟各一钱半，川芎、土鳖头烧，各一钱，使君子肉一钱二分，共为末，神曲为丸，米饮下。

凡冬月温热，防春发疹，宜预服。豆饮方见上。服七日，可免出麻疔。乡邻出疔，取真麻油一碗，逐日饮之令尽，则永不出痘。

禁忌 麻后忌食鸡鱼、葱、盐醋、辛辣、五辛、生冷、油腻，令人惊热，忌四十九日。发热未退，不可与食，与伤寒症同。

麻初热，即戒风寒、瓜果、生冷犯之，变紫黑色而死。如极渴欲饮水，只宜少与葱白以滋其渴，须使皮窍中常微汗润泽。

麻后忌吃梅、桃、鱼、蜜。一切香鲜之物，恐惹疔虫上行。

水痘 痧

水痘 似疔而皮薄如水泡，破即易干，而出无渐次，白色或淡红色，冷冷有水浆者是。此表症发于腑也，又轻于疹子，大率无害。如无内症，不必服药，恐无事而生事也。

痧 稽古方书知，麻也、疹也、疹也、痘也、糠疮、麸疮也，肤疹也，一物而数名，各因其地而称之，不必疑痧麻有两治也。吴人谓之痧，古谓之麻，闻人民所谓肤疹是也。今人分麻痧为二者，未知何据？原书有疹字，恐人误会，故又记此。

《良方》举要¹

寒温不节，将理失宜。乍暖晚衣，甚热饮冷，坐卧当风，居处暴露，冲冒霜雪，凌晨早起，呼吸冷气；久晴暴暖，忽变阴寒；久雨积寒，致生闭塞。如此之类，皆能使人身体沉重，肢节痠痛，项背拘急，头目不清，鼻寒声重，泪出，气窒，胸膈凝滞，饮食不入，混名伤寒。不即解散，必成大病。方书千百，眩目迷心，不学数年，无从问路。举要一方，治人百病。感冒初起，劝人服之无过。一凡男妇大小，但有头项痛，骨节疼，发热恶寒，无汗等症，用

羌活汤。非独治四时之风寒，春可治温，夏可治热，秋可治湿。治杂病亦妙，而冬令尤宜。

羌活、防风各二钱半，苍术、川芎、白芷各二钱，细辛五分，甘草五分，苏叶一钱半，豆豉四钱，薄荷一钱，姜三钱，葱白二钱，水煎服，日三次。如天气和暖及春夏秋三时，加生地、熟芩各二钱，以泄邪热。有郁，加香

¹ 良方举要：原书封面作“附刻”，版心目录作“举要”，“稿本”卷二内封作“……附《良方》举要”，可参。

附 钱、木香 一分。食积，加神曲炒、山楂各一钱。若阴虚气弱之人，勿用此方。

人参败毒散 治暑湿热时行感冒

人参即元参、茯苓、枳壳、桔梗、柴胡、前胡、羌活、独活、川芎各一钱，甘草五分，薄荷六分，姜一片，河水煎服。或加荆芥、防风。如病人蕴热烦躁，在初夏及七八月间，可加栀子炒，一钱二，豆豉三钱。

藿香正气散 五六月统治，用此方，功难尽述。药店买丸，每服三五钱，藿香汤过服，日三服亦可。藿香、大腹皮、紫苏、茯苓、白芷各一钱，陈皮、白术土炒、厚朴姜汁炒、半夏曲、桔梗各一钱，甘草一钱，姜一片，枣一枚，煎服亦可。以上三方通治四时百病。

汗法 伤寒前二日，法当汗。凡发汗药，一日连服二剂，若未汗，再作热粥投之，粥内加葱白甚妙。汗出，不可更进汗药，只宜热饮。服药后，腰以上则如常覆之，腰以下则厚衣覆之，欲令手足皆周到，漉漉然。时间许，不可令如水淋漓耳！若病不解，当重发汗。凡服发汗药，中病即止，不可多服。汗之大过，必作亡阳症也。慎之！

不可汗 太阳证，非头痛项强，不可汗。非身热恶寒，不可汗。脉微弱或尺脉迟者，营血肾气不足，不可汗。衄血、自汗、风温湿温、身烦、咽喉干燥、小便淋、妇人经来，均不可汗。

孕妇伤寒，头痛寒热咳嗽，用黄芩、前胡、麦冬各

钱，川芎、陈皮、白芍、土炒、白术各八分，紫苏六分，葛根五分，甘草三分，姜三片，葱白三茎，煎服。

孕妇伤寒发热及产后发热，热入血室，用小柴胡汤，夏、白芍、人参、甘草、柴胡合四物汤，当归、白芍、生地煎服，名黄龙汤。凡服药后，切宜避风防风，能引风入骨故也。

又有一种内伤气血，外感风寒，一见风寒，即便恶之，得暖即止；身虽烦热，袒裸即凉；寒热间作而不齐，头痛时作而时止；自汗困怠，口不知味等症，是内伤也，用补中益气汤。黄芪一钱半，党参、白术土炒、甘草、归身、陈皮各一钱，升麻、柴胡各一分，煎服。如外感重者，加生地、川芎、羌活、防风各七分，细辛一分，姜一片，枣一枚，葱白三茎，煎服。名陶氏补中益气汤。

病宜早治说 手集方书五十年矣！信笔抄写，不次前后，其文杂乱而无章，只求治病而已。抄以便己，刻以便人。有以独缺伤寒问者，余曰：是当全读仲景，洞彻六经，按脉察变，随症用方，不可以方试症也。盖外感无内伤，用仲景法，固已。有挟内伤者，丹溪治以补中益气，海藏治以九味羌活，或用逍遥，或用加味益气，治之于早，又何伤寒之有？

小儿变蒸切忌推拿说 儿生之日，三十一日一变，长生脏腑意智故也。每二十二日，一变生骨。六十四日，二

之一条，生膀胱，由是生心、小肠、肝、胆、肺、大肠、脾。至二百二十日，十变五藏，生胃，然后始生齿，而能言。每变从前后，或有发热吐乳，将息自愈。粗工以为惊，妄作必死，元气推虚故也。凡周岁以内，及冬令大风久病，吐泻虚弱之儿，皆不可推，妄推则死。如春秋时令和暖，或有惊搐，以葱、姜捣汁，在儿两手心足心，两手高足高，心胸背腹，轻揉二三十遍亦可。但宜自推，不可用推拿之人也。若举目不以子，只图取利，不顾儿之死活，故不可用。

小儿四时感冒，风寒温疫，邪热烦躁，痰嗽气急，发搐，伏暑等症，用抱龙丸如黄豆大一丸，灯心汤、冬月姜汤化下，连进二服，神效之至，治初病尤妙。若久病慢惊虚症，切不可服。

抱龙丸：抱者，保也；龙者，肝也。肝为母，心为子，母安则子安，心肺肝药也。胆星、雄黄、天竺黄、辰砂、麝香。又方加入人参、琥珀、茯苓、甘草、枳实、枳实、山药、金箔、檀香，又方有牛黄、僵蚕、钩藤，又方有蜂蜜、黄蜡。

阴囊痒难忍，用牡蛎、黄丹、枯矾研末，搽之立止。妇女阴户湿痒，同治。

杂记 茉莉花不可放床上，能引蜈蚣。蜀葵枯时烧作灰，熏火，火久不熄。黄櫨槁，近糯米及酒，则烂。凡果，忌吃酒人闻其香气。

饮食 糟蟹久留则沙，见灯照亦沙。以皂角一寸，置瓶下，则不沙。酱内生虫，以草乌碎切入之，虫即死。煮鱼临熟，入川椒多，则去腥。米醋内入炒盐，则不生白衣。用盐洗猪脏，则不臭。夏月鱼肉内安香油，久不臭。铜锡器内不可盛酒过夜，有毒。晒肉须抹油，不引蝇。寸切稻草，用煮臭肉，则臭皆入草内。冬瓜切动^①，以石灰掺之则不烂。煮猪脂及血脏，不可入椒同煮，作猪粪臭。煮羊不烂，就灶边取瓦一片同煮，即烂如泥。洗猪肝用面，不气^②。洗猪脏用沙糖，不气。夏月肉，单用醋煮，可留十日。凡烧肉，忌桑柴。酒酸，用赤小豆一升炒焦，袋盛，入酒坛中，味即香美。六月六日，取井华水收藏，可治病；用作醋酱，一年不坏。凡酒坛忌见日影，若见日影照之，其酒必坏，如钱人者亦忌。欲知酒之美忌，但以手扣其坛，声清而长者，酒必佳；重而短者，其酒苦；声不响，其酒必坏。黄酒煮酒，少入烧酒，则经宿不酸。锡器藏酒，久能杀人。砒者，锡之苗也。

米 凡米，宜残年^③春好。若到春春，则米发芽，必多亏折。米囤上须多用草一尺盖好，频频取出晒干易之。

① 冬瓜切动：意为将冬瓜切开。苏轼《物类相感志·饮食》“冬瓜”条作：“冬瓜切动未吃尽者，三五日皆烂，以石灰掺之则不烂。”可参。

② 气：气味。如《聊斋志异·葛巾》：“生觉药气香冷，似非毒者。”

③ 残年：一年将尽之时。《二刻拍案惊奇》卷四：“看看残年将尽，纪老三果然来买年货，特到史家、魏家拜望。”

則不坏。預收棟樹根時，鋪米棧內，上米不蛀。稻草囤收穀白米，仍以稻草蓋之，以收水氣，踏實則不蛀。板倉藏米，必用草蓆衬板，以收水氣。若藏糯米，勿令發熱。

校注后记

《辨症良方》，清代蒋杏桥辑，成书于清咸丰八年（1858），刊行于戊午十年（1860）。全书四卷，以症类方各症详述疑似，附以简易方剂，且兼述制法、煎药法度。其辨症精确，方简而赅，精而当，方论透晰，内容详备。

一、关于作者

蒋杏桥，字锡荣，江苏常州人。初习举业，旁涉医书。他认为“方不贵于繁多，病必九于言症。治失其症，则千方不效；治得其症，则一药有余”（《辨症良方·自序》）。而“证治准绳”诸书，卷帙浩繁，不便实用，因取各方简要者抄录之。广搜博采，积多成味，编《辨症良方》四卷。时人誉其人“以名儒宿学，早著艺林。丁酉科贡举于乡，文章经术誉重一时，生平尤以济人利物为务”（《辨症良方·王景彦序》），惜“名场稍滞，未得尽展其用”（《辨症良方·王景彦序》）。赞其书“简而赅，精而当，无方不备，无症不详。症以言而其明，即方以良而受益”（《辨症良方·俞树风序》）。

二、版本及馆藏

据《中国中医古籍总目》著录：《辨症良方》现存版

本五种。一为清咸丰十年庚申（1860）刻本（简称“咸丰本”）；二为清光绪十七年辛卯（1891）晓风杨柳馆刻本（简称“晓风杨柳光绪本”）；三为清光绪刻本（简称“光绪本”）；四为清咸丰八年戊午（1858）合请稿本，名曰《稿本医书五种》（简称“稿本”）。

1. “咸丰本”为上海图书馆、上海中医药大学图书馆所藏。1上海图书馆所藏一函四册，四卷，为足本、全本、善本；但第一册（一卷）载文顺序与目录有异。2上海中医药大学图书馆所藏一函两册，内容仅相当于上海图书馆藏本卷一、卷二，为残本。

2. “晓风杨柳光绪本”为浙江中医药大学图书馆、上海中医药大学图书馆所藏。1浙江中医药大学图书馆所藏为一函四册，四卷，是足本、全本；其序跋将“叙”冒首，与他本异；各册所载文顺序与目录顺序有异、与其他诸本亦有异。2上海中医药大学图书馆所藏为一函六册，四卷，为全本、足本；但序跋顺序与“咸丰本”有异，“序”与“自叙”间混入了正文“伤寒论”“先伤寒四后”“外感内伤论”诸条文。各册所载文顺序与目录顺序有异，与其他诸本亦有较大差异。

3. “光绪本”为解放军医学图书馆所藏，一函四册，四卷。序跋顺序同上海中医药大学图书馆藏“晓风杨柳光绪本”。另据封面、册数、版式均同浙江中医药大学图书馆藏“晓风杨柳光绪本”可知，其即为“晓风杨柳光绪

本”。

4. “稿本”为浙江中医药大学图书馆所藏，名曰《稿本医书五种》，一函五册，五卷。一卷金，二卷木，三卷水，四卷火，五卷土。每册有子目，其子目为①金：救急附痰饮、咳嗽、喘急、血症并虫兽诸伤又神效急救时行痧疫立刻回生药酒；②木：便宜附良方举要；③水：诸痛：头、咽喉、目、口舌、唇齿、耳，心胃脘腹腰肩脚气小腹诸淋茎物臂膊背脊两腿两足等症；④火：妇女附保儿举要，⑤土：痘疹附麻疹。无封面总目录。序跋载“正气歌”，另有序、自叙。

总之，初有咸丰八年“稿本”，即誉清稿本《稿本医书五种》；再有“咸丰本”，即咸丰十年庚申刻本《辨症良方》；后有“晓风杨柳光绪本”，即光绪十七年辛卯晓风杨柳馆刻本《辨症良方》。稿本与刻本虽序跋稍有异，但篇卷内容、目次顺序大致一致；刻本虽序跋顺序有异但数目同，篇卷目次顺序则有异或有阙如，但版式皆同。虽诸本多出，然考其版本、版式、装帧及目录篇卷顺序，实则同出一源。

三、体例和内容

《辨症良方》为医方著作。卷一，便易方及急救方。便易方有活病八要、制药法、煎药法、服药法及乡村简便方，强调治病要分表里寒热，虚实邪正；并有治疗伤食、暑、大小便不通等多种病症的方剂及难产之故、妊娠用药

等内容。急救方有治疗霍乱、绞肠痧等急症之方及华佗救治十种危病之三十方。卷二，为诸痛方、外科方、诸伤方。卷三为血症、痰饮、咳嗽、喘急等病症之方及妇人方和以初生、脐风、脐突、急慢惊风等为主的小儿方。卷四以介绍小儿痘、麻诸方及《良方》举要为主。

原书选方多为民间验方，简而赅，精而当，辨症精确，方论透晰，内容详备。如卷一《乡村简便方》中列肚痛者：“清晨吃使君子（炒），一岁一粒，只一次便好，二次全愈。”凡伤食食积：“即以其物烧灰存性，放土地盖住，冷研末，加砂仁三分，沙糖调服，最妙。砂仁须研末，去皮用。”凡有小块红肿欲生疮者：“于初起时半夜，用津唾搽之，清晨又搽之，一日三四五次，二日即愈。”凡有病：“用白茅根鲜鲜者，掘出拣净，切碎打烂，浓煎，取其汤煮新米糊粥与食之，大妙。”皆“简便易行，适于时用者”（《王景澄序》），“庶荒僻壤中，无处延医，获此书以考证之，不啻迷津宝筏”（《孟璜序》）。

各症详辨疑似，附以简易方剂，且兼述制法、煎药法度。如“辨脉”医生不仅要注意诊脉部位、下指轻重，更要考虑病人的呼吸、脉形、正气的虚实、胃气的有无（卷一《便宜方》）。通过辨恶寒、发热，辨疾病的外感内伤（卷一《便宜方》）。更于卷一《便宜方》首列“活病八要”“制药法”“煎药法”“服药法”。

原书方后多有按语。如小便不禁，能令人卒死，用菟

丝子（酒制）、韭子（炒）、益智仁、茴香（炒）、蛇床子（炒）各一两，为末，酒糊丸，糯米汤下七十丸。后加按：“若系虚人、老人，似宜十全大补加减。”中风若安静，平日人衰弱，临症之时，气息如无，大小便自遗，手撒眼闭，浮肿，作水鸡声不十分响者，乃气虚而脱症也。加按语：“闭症宜苏合丸或紫金锭，脱症独参汤加南星、半夏。似非大剂，难于取效。”

原书医方多出自《幼幼新书》《证治准绳》《串雅》《医学入门》《石室秘录》《医学心悟》《世医得效方》《证类本草》《本草纲目》等，实乃“条分缕晰，荟萃古人之精意，而又审于考校……间出己意，别具新裁，皆本前人之准绳，神明而变通之”（《王景澄序》）。

总之，蒋氏本“曰辨症良方者，必症辨而方乃良也”之旨，病必先于辨症，证必辨其疑似；方不贵于繁多，药必取其易求。搜集前贤方论，方易便于人查，且备一时急用。使后人因症辨而甚明，方良而受益。



责任编辑 华中健
封面设计 古 骥


内容提要

《辨症良方》由清代医家蒋杏桥辑。全书分四卷：卷一列便易方、急救方，卷二列诸痛方、外科方，诸伤方，卷三列血症、痰饮、咳嗽、喘急及妇人、小儿等方，卷四列痘疹、麻疹、水痘、痧诸方及《良方》举要。后人赞其书“简而核，精而富，无方不备，无症不详，症以辨而甚明，即方以良而受益”。原书选方多为民间验方，皆“简便易行，适于时用者”，“庶荒僻壤中，无处延医，获此书以考证之，不啻迷津宝筏”。本次整理以清咸丰十年（1860）刻本为底本。



上架建议 中医古籍

ISBN 978-7-5132-3481-8



9 787513 234818 >

定价：98.00元

读中医药书，走健康之路

扫一扫 关注中国中医药出版社系列微信



服务号

(zgzyyccbs)



中医出版

(zhongyichubans)



养生正道

(yszhengdao)



悦读中医

(ydzhongyi)